



PASCHALIS JOSEPHI FERRO
MED. DOCTORIS, S. C. R. MAJ. CONSIL. PHY-
SICI PRIM. CIVIT. VIENNENSIS, ACADE-
MIAE NAT. CURIOS. MEMBRI

EPHEMERIDES MEDICAE.



VINDOBONAE,
TYPIS JOSEPHI NOBILIS DE KURZBECK,
CAES. REG. AULAE TYP. ET BIBLIOP.
MDCCXCII.





P R A E F A T I O.

Dum quas Viennae observavi, aeris morborumque vulgarium vicissitudines continuata, quantum per negotia licebit, serie describere aggredior, vix utilius rei medicae quidquam praestare me posse crediderim; vastissima enim Germaniae Metropolis nunc benigno, nunc malevolo atmosphaerae influxu latissimum observandi campum simul ac aegrotantium numerum non mediocrem suppeditat, ut, qui morbo constitutionali laborent aegri, nullo non anni tempore reperiuntur.

Quam arcte vero pleraque morborum vulgarium genera cum aeris natura connexa sint, Medicorum nemo, qui variam

morborum crasin pro varia anni tempestate vel obiter tantum animadvertit, ignorat; etenim ut non eosdem, quos in hyeme, morbos in aestate observamus, sic autumnales a vernalibus differre, quis non videt?

Insuper et annis redeuntibus, alia ex eodem fonte dimanentia deprehendimus morborum semina; aeris enim qualitates, gravitas, calor, et motus perpetuo inter se dissidentes, nec uno quidem momento consistentes eodem gradu, non possunt atmosphaerae, in qua natitamus, non mutare indolem, qua mutata corporum nostrorum status simul mutetur, necesse est.

Hinc liquet, quam diversi sint, qui ab atmosphaera, utpote primaria morborum vulgariū causa, nascuntur morbi quamque multa nova non minus ac utilia observatori supersint adnotanda.

His positis, si, continuato per plures, annos opere, et atmosphaerae et morborum vulgariū descriptionem tradidero, nec medicis ingratum, nec aegris inutilem fore laborem meum confido.

Periculosiores quidem morbos rarius, quod superis acceptum referimus, in genus mortale grassantes, paucos affero; sed ii ipsi vulgares morbi, licet inplurimis leviores videantur quam ut cura medici indigeant, in aliis tamen dubiis symptomatibus serpendo latius, medicum enii constitutionalis ignarum saepe adeo allunt, ut, quid consilii capiendum sit, indicare vix possit; imo hos eosdem in alios plerosque morbos influere, aliis eos tribuere characteribus, futurosque praesagire, audacter affirmavero.

Quae cum ita sint, ut usu quotidiano teste certo sunt, non supervacaneum esse arbitror, si, quae diligenti ad lectos aegrorum observatione indies didici, literato rbi communicem. Missas facio, quae doctiorum exerceant ingenia, obstrusas theoriae hypotheses; sed vacuum hoc da et simplex visorum observatorumque bunde compensat enarratio; veritatem nim confirmat experientia, exemplo mon- crante viam.

Vera sunt quae scribo, attente ad lectum non unum iterum iterumque observata. In hoc solo velut rei cardine anxius desudavi, de linguae flosculis parum sollicitus.

Ordinem morborum servavi nullum, nec alium servare potui, quam eum, quem continuata morborum vulgarium sine ordine ingruentium enarratio praescriberet. Iis quidem, qui recenter propullularunt, et quorum genius novis ludebat phaenomenis, paulo inhaesi diutius. Paucos alios hinc inde morbos interspersi minus frequentes, prout in decursu mensis occurrerunt.

Ut restauratio sanitatis unicus est mendendi scopus, ita methodum servavi simplicissimam, nullius rei studiosior, quam ut scopum hunc attingerem. Sic amicior naturae, certior simul ac brevior, quam pomposis pharmacopaeorum compositionibus, redditur medicina.

Denique non alienum videtur, de nosocomio, cui Ephemerides primariam suam debent originem, cujusque singulis mensibus rationem reddo, pauca commemorare.

PRAEFATIO.

7

Omnes hujus civitatis captivi, sive quaestioni adhuc subsint, sive criminum capitalium, aut politicorum, debitorumve mala fide contractorum rei, ad carcerem, laboresve publicos modo fuerint condemnati, quamprimum aegrotant, e carceribus ad proprium deportantur nosocomium, a divo Josepho II. commodissime, amplissimeque exstructum, cujus cura, atque directio mihi qua physico civitatis commissa est.

Plura hic cubilia amplā et alta, ventilabris, oppositisque fenestris instructa, balneum, horreum, hortus, aliaque, quae ad nosocomium pertinent necessaria loca, et domicilia aegrorum saluti inserviunt.

Cibatus, pro gradu morbi et convalescentiae in plures portiones non secus ac in nosocomio generali distinctus, eodem ac ibidem pretio solvitur. Cibi, potus, et medicamenta illimitato medici relinquuntur arbitrio.

Ad manum medici praesto sunt chirurgus primarius, duo assistentes, et obstetrix; cuilibet denique cubiculo proprius

in-


inservit infirmarius, ita ut vel ad commoditatem, vel ad salutem aegrotantium nihil desideraveris.

Numerus aegrorum varius est pro varia anni tempestate, sicut id ex computatione cujuslibet mensis concludere licet; interim raro quadraginta minor est, raroque major octoginta.

Observamus hic quidem proprios captivorum morbos ex propria miserorum cum animi, tum corporis conditione natos; nihilo tamen minus constitutio regnans, ut ubique locorum, ita et hic suum exercet dominium: vel minimam enim constitutionis mutationem ab aegris nostris, omni licet civium commercio prohibitis, jam ante praesentiri, saepe saepius observamus.

Compos ero votorum meorum, si quid ad historiam morborum vulgarium incendero luminis; unicum id erit suscepti laboris praemium, unicum ad continuationem incitamentum.

EPHEMERIDES
MEDICAE
ANNI 1790.



JANUARIUS

anni 1790.

Barom.			Therm. Reaum			Venti a)		
Dies.	alti.	med.	gradus medius.			mane.	meridie.	vesperi.
	dig.	10 $\frac{3}{4}$ lin.		o	1 $\frac{2}{3}$ gradus			
1	27	—	+	o	1 $\frac{2}{3}$ —	S. p.	o	o
2	28	—	+	o	2 $\frac{3}{4}$ —	N. p.	o	W. p.
3	28	—	+	o	1 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
4	28	—	+	o	1 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
5	28	—	+	o	1 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
6	28	—	—	o	2 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
7	28	—	—	o	1 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
8	28	—	+	o	2 $\frac{1}{2}$ —	W. m.	W. p.	W. p.
9	28	—	+	o	2 $\frac{2}{3}$ —	o	o	o
10	28	—	+	o	1 —	o	o	o
11	28	—	+	o	0 $\frac{1}{3}$ —	o	o	o
12	28	—	—	o	1 —	o	o	o
13	28	—	—	o	o —	o	o	o
14	27	—	+	o	1 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
15	27	—	+	o	0 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
16	28	—	+	o	0 $\frac{3}{4}$ —	o	o	N. p.
17	28	—	—	o	0 $\frac{3}{4}$ —	N. p.	N. p.	N. p.
18	28	—	—	o	3 $\frac{1}{2}$ —	N. p.	N. p.	N. p.
19	28	—	—	o	0 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
20	28	—	—	o	0 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
21	28	—	—	o	0 $\frac{1}{4}$ —	o	o	N. p.
22	28	—	—	o	0 $\frac{2}{3}$ —	N. p.	N. p.	N. p.
23	28	—	+	o	0 $\frac{1}{3}$ —	o	o	o
24	27	—	—	o	o —	NW. p.	NW. p.	NW. p.
25	28	—	+	o	2 —	o	W. p.	W. m.
26	28	—	—	o	5 —	o	o	o
27	27	—	—	o	6 $\frac{1}{4}$ —	o	SSO. p.	SSO. p.
28	27	—	—	o	6 $\frac{3}{4}$ —	o	o	o
29	27	—	—	o	3 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
30	27	—	—	o	2 —	o	o	o
31	27	—	+	o	1 $\frac{1}{4}$ —	NW. p.	NW. p.	NW. p.

Die 2 barometri altitudo maxima = 28 dig. 4 $\frac{1}{2}$ lin.

Die 25, 29, 30, 31 altitudo minima = 27 dig. 6 lin.


Diffe. = 0 dig. 10 $\frac{1}{2}$ lin.

Die 27 frigus maximum = — o 9 grad.

Die 2 calor maximus = + o 4 grad.

Summa variationis = o 13 grad.

1) Litterae O. Eurum, S. Austrum, W. Favonium, N. Aquilonem, f. ventum fortem, m. mediocrem, p. parvum, o. nullum, id est aëris malacum denotant.



Continua hyemis hujus lenitas, alias rarissima, miris per integram Europam phoenomenis, quae et hic Viennae observavimus, insignis est. Ubique plantae germinarunt: vidimus recentes rosarum surculos, pluribus pollicibus longos; rubum caesium et idaeum longis frondosisque ramusculis gaudentes, pluresque plantas aperto sole in horto botanico, alibique florescentes.

Lenitas haec aëris a prima Novembris prioris anni ad vigesimam sextam Januarii subsequentis continuavit: nix quidem aliqua vigesima tertia Januarii cecidit, quae vero vento meridionali vigesima quinta mox diffluit.

Celeberrimus noster Hell causam physicam benignae hujus hyemis unice repetendam credit a continua per tres fere men-

res durante malacia, aëris fluxui, sit venia
verbo, et refluxui contraria. Hinc coelum
continuo nubibus tectum, hinc densiores
illae nebulae, quiescentibus ventis, terrae
incumbentes, quae aëris vix moti calorem
a gradu depellere non poterant. Hic enim
Viennae omnis aëris constitutio a ventis,
id est, ab aëris motu pendet. Venti ab O
et N flantes sicci sunt, frigidique, coelum-
que reddunt serenum: Venti a NW, et SW
humidi sunt, nubibus coelum obducentes,
in aestate pluvias copiosas, in hyeme ni-
vem advehunt: Venti a S et SO spirantes
calidi sunt, humidique, in hyeme glaciem
solvunt, in aestate aërem calidum humi-
dumque reddunt, plerumque tamen absque
pluvia: et sic de reliquis. Omnes ergo aë-
ris vicissitudines non nisi a ventis depen-
dent: unde perperam non concludimus,
malaciam hujus hyemis universalem, tam-
que diuturnam, parentem esse unicam in-
solitae aëris temperiei, quam nunc per tres
menses experti sumus.

Animadversione vero dignum est, om-
nes septentrionales regiones hac hyemis
clementia gravitas esse, regionibus orien-
talibus et montosis frigore niveque rigenti-
bus.

bus. Ipso in Austriae ambitu varietas ha
 observata fuit: regiones alias frigidior
 mitiorem nunc aërem respirarunt, quam ea
 quae moderatiōres esse solent. Mercuri
 in thermometro, qui hic Viennae noc
 saepe ad punctum glaciāle, quandoque
 infra id descenderat, in regione silvestri
 frigidissima Austriae parte, plerūmque se
 gradibus supra punctum glaciēi constitui
 Nix ibi adhuc nulla, imo trigesima Decem
 bris brevi, tepidaque cadente pluvia iridi
 arcus horizontem, qua late patet, exhilaravi

In nosocomium hoc mense aegros su
 cepimus quadrāginta octo, viginti septem
 acutis, viginti et unum chronicis et chirur
 gicis morbis laborantes. Mortuus ex his
 decimus.

Omniū fere acutorum inflammatio fe
 mes fuit, adeo, ut, ubicunque acutam fe
 brim, ibi et inflammationem vix non de
 prehendisses, majorem minoremve, mod
 ex hac modo ex illa corporis parte erum
 pentem. Vidimus enteritides, hepatitides
 nephritides, omnium vero frequentissima
 peripneumonias.

Ex viginti septem aegris undecim peripneumonia, unum carditis, tres enteritis, duos nephritis, totidem hepatitis, alios febris gastrica plus minus inflammatoria corripuerat.

Pulmonum inflammatio ex classe catarrhalium erat, quae ob peculiaria sibi adjuncta symptomata, propriamque medelam fusiorem paulo descriptionem meretur.

Peripneumonia catarrhalis.

Per aliquot nimirum dies praecesserant horripilationes vagae, capitis gravitas insolita, inappetentia, os insipidum et pastaceum, tussis molesta, sicca, cum pectoris oppressione. Interim aegri sua munia adhuc obibant sat alacres.

Tandem accessit quarto, quinto, sextove die frigus intensius cum corporis debilitate febrili, ut aegri nunc lectum petere cogerentur. Successerunt calor siccus, capitis gravitas major, major pectoris oppressio, tussis simul frequentior et magis dolens. Sputum initio nullum nunc spumoso apparuit, paucum, multo labore excreatum. Medium pectus dolore gravante pressum, quandoque et unum alterum velatus.

latus, brevitamen lenitum fomentis calidis. Respiratio erat oppressa, cita et stertorosa: experimento tamen facto aegri et profunde satis inspirare, et spiritum diu retinere poterant absque incommodo. Interim solita respiratio cita erat, stertorque et sibilus tam in inspiratione, quam expiratione percipiebatur saepe magnus, et in omnibus aegris aequaliter.

Pulsus erat celer, frequens, et ad molitiam tendens, lingua humida, levi mucosobducta, oris gustus pastaceus, sitis modica; facies labiaque rubicunda, hypochondria mollia.

Sputum, cujus quantitas indies major recens quidem excreatum fluidum apparuit et spumosum, ast collectum in vase conglutinatam massam formavit, picis fluidae ad instar tenax: limpha coagulabilis, in bronchia inflammata deposita, ibique tenacior facta, stertorem illum in respiratione peperit.

Nonnulli repetita venaesectione, copiosisque diluentibus nitrosis, acescentibus tepidis adjuti morbum hunc facile superarunt.

San-

Sanguis crusta contracta phlogistica tegebatur. Cuicunque sanguinis eductioni successit respiratio faciliior, stertor minus molestus, cutis madida cum tussis et oppressionis levamine,

Quarta, quintave die urina hucusque cruda flavicansque cum sedimento albo ateritio, alvus copiosior cocta pultacea, sputa imminuta, mucosa, minus tenacia: et sic ex undecim aegris quinque septima modo die pristinae sanitati erant restituti.

Quibus vero mox ab initio debita sanguinis eductio neglecta fuerat, aut ubi morbi vis partem majorem pulmonum, eamque vehementius inflammaverat, his morbus et diuturnior fuit et periculosior.

Praeter priora symptomata cutis erat arida, facies, oculi, labiaque intensius rubra, caput obtuse dolens, somnus brevior, perturbatus insomniis terrificis, sitis major, tussis vehementior pertinaciorque, saepe et dolor in inspiratione profundiori, vel tussi majori, sputum tenacissimum aequale spumosum, stertor in respiratione major, ita ut varii quandoque sonitus variae-

riaeque modulationes singula respiratione perciperentur: pulsus fuit celer, velox, semper tamen mollis, decubitus in utrumque latus indolens: interim aegri plerumque supini jacebant ob minus oppressam respirationem: urina fuit tenuis, parum flavicans.

Si et in hac periodo antiphlogisticam medelam neglexisses, actum erat de aegri vita. Natura quidem ultimam se ipsa juvabat haemoptysi; sed triste id fuit auxilium, quod aegri vitam ad tempus servavit, ad eum tardae phthisicorum morti tradendum.

Morbus hic non tam cito desiit, nec una eademque stata critica die. Inflammatio, convenienti medela tractata, indies quidem minuebatur coagulo inflammatorio vice post vicem excreto, febris tamen continuo adfuit indies imminuta parum et lento passu in febriculam abiens, quae partitis quasi vicibus, lysique sensim decessit.

Peripneumonia haec vehementior eandem ac prior medelam requisivit, sanguini
ni-

nimirum eductiones et potum diluentem, acescentem. Sanguinis tamen eductio et frequentior esse debuit et liberalior. Septem, octo et plures librae sanguinis educendae fuerunt, antequam orgasmus sanguinis mitigari et inflammatio resolvi coeperit. Imo inclinante nunc ad finem morbo venacsectio unicum rebellis tussis, vel oppressionis aut continuantis, aut de novo accedentis fuit remedium.

Inexpertus ob stertorem muci potius in aspera arteria haerentis eductionem, quam venaesectionem debilitantem necessariam credidisset: ast vidimus sanguine educto brevi silere stertorem: is enim erat inflammatae et tumidae bronchiorum membranae sequela, qui eo major erat, quo magis tumescebat bronchiorum membrana. Hac inflammatione resoluta stertor omnis siluit.

Decoctum hordei cum oxymelle et nitro, et quemcunque alium potum acescentem antiphlogisticum hoc in morbo prestantiorem esse didici, quam decocta emollientia, et mucilaginoso, aliaque passim in peripneumonia laudata. Continuato enim horum

rum usu morbus nullo modo minuebatur, stertor idem, eadem tussis, oppressio, febrisque: nec ullum natura lenimen sentire videbatur. In longum protrahebatur morbus, aut sero finiens viribus aegri fractis, aut in phthisin abiens cum vita cessaturam. Acescentia vero et nitrosa medicamenta instantaneam ferebant opem: expuitio brevi facilior reddebatur, stertor minus molestus et tussis rarior.

In civitate peripneumonia haec currente mense aequae ac praecedenti morbus fuit frequentissimus.

Reconvalescentia sera fuit et diuturna, aegro etiam e lecto surgente et appetente cibum, morbus nondum cesserat. Tussis et febricula diu adhuc afflixere aegros, qui tractu temporis non absque periculo vires quidem acquisiverunt ad obambulandum, quandoque etiam ad exeundum foras, attamen non ea, qua alii reconvalescentes membrorum levitate gravisi sunt: vires erant fractae alia prae alia die debiliores: oculi tristes, facies pallida, genae per vires quandoque rubentes, lingua ut plurimum humida et pura, gustus etiam purus, sitis

sitis praesertim post prandium continua, pectus semper oppressum, etsi absque dolore spiritum profunde trahere et in alterutrum latus decumbere possent.

Dolor quidem lateris in inspiratione profundiori, sed momentaneus tantum; ut plurimum tamen pressorium dolorem in medio sterni senserunt aegri. Mane in expectatione observabatur sibilus, usque dum largior mucī quantitas tussi rejecta foret.

Hucusque sputum semper mucus tenax erat, vera lymp̃ha coagulata: in vas aliud immissum tota massa conglutinata fundum petebat, priore vase remanente sicco, quasi fluidum non continuisset.

Sputum hoc in vasis vitreis detentum post aliquot dies ad fundum deposuit sedimentum album crassum puri cocto similimum, supernatante reliqua parte aquosa clara, limpidaque: sedimentum hoc et in aqua fundum petebat, et cum oleo tartari gelatinam formabat. An inde ex lymp̃ha coagulabili puris origo derivari possit?

Varia tentavi ad tenacitatem horum sputorum incidendam. In plura vasa separata, sputorum aequalem quantitatem continentia, indidi nitrum, salem ammoniacum, acetum, mel; oximel, oximelsquillae, kermetem mineralem, alcali vegetabile fixum, succum citri, etc. ast tenax mansit lymphae coagulum, usque dum post tres quatuorve dies sponte separaretur in pus et aquam limpidam: sputum tamen cum aceto prae aliis multo plus tenacitatis amiserat.

Interim cum casu aquam sputo commiscuissem et vas agitare fortius, video, simplicissima me via id nunc obtinuisse, quod mille experimentis frustra quaesiveram. Sputum enim dilutissimum nunc erat et penitus aquosum. Haec fluiditas aut aquae aut agitationi aut utrique debebatur. Tentabam, an agitatio sola in causa esset: Sumpsi tenacissimum sputi coagulum, idque in vas colli angustioris coactum agitavi per septem circiter minuta secunda. Ecce sputum tenacissimum simplici hac, brevissimaque agitatione in aquam limpidam conversum, quod facillime ex inclinato vase effluxit, fluidumque mansit!

Patet hic, tussim ipsam, molestissimum
saepe morborum symptoma, minus opinio-
ne vulgi noxiam, sed potius salutare for-
tan esse naturae opus, ad lymphae coa-
gululum, pulmonum bronchia in viscans et
obstruens, subigendum et incidendum.
Immo quis hic non videt, omnia tussim so-
ciantia medicamenta maximum detrimen-
tum necessario afferre, nisi id, ob quod
tussim excitavit natura, ex pulmonibus
prius fuerit eliminatum?

Aegris his pulsus semper fuit celerior
naturali, 90—100 ictuum in uno minuto.
Morbo inducta macies aucta potius, quam
diminuta; noctes inquietae.

Si his non conveniens opponebatur me-
dela, priora recurrebant mala: appetitus
sensim minor, sudores nocturni, tussis
siccior invalescebat, celerique passum mor-
bus in phthisin pulmonalem degenerabat.

Hoc in statu immutatum antiphlogisti-
corum acescentium usum inveni longe sa-
luberrimum, adeo, ut omnes inde aegri
reconvalescerent.

Roborantia econtra et spirituosā, imo sola amara nocebant: augebant enim phlogosin, quae adhuc aderat. Eductio sanguinis nimia in hac periodo vires vitae debilitavit, nec abstulit coagulum inflammatorium, fors nec fomitem morbi; hinc retardavit sanationem, saepe et eam reddidit impossibilem.

Nil conducebat aegris melius sero lactis, pro ratione alvi vel cum cremore vel cum aceto praeparatum. Ejus usu tussis sedabatur et febris, sputa imminuebantur, et post duas tresve septimanas aegri viribus et carne recuperatis sanitati pristinae fuerunt restituti. Uni alterive aegro, quod ob corporis compagem, vel alia accidentia ad phthisin erant magis dispositi, longiori tempore serum lactis bibendum fuit. Ast et hi reconvalescere, medicamento in aetatem usque continuato.

Hac methodo omnes aegri in nosocomio febre inflammatoria laborantes sanati sunt, uno excepto, qui carditide i. e. ventriculi inflammatione laboraverat.

Erat hic vir robustus, alias semper sanus, 43 annorum. Priori aestate remittente biliosa decubuerat, emeticis, purgantibus 17^{ma} morbi die febre liberatus: ab hoc tempore sanus vixit.

Initio Januarii orthopnaeicus fieri, tussire sicce coepit: haec mala, indies licet graviora, contemnit. Die 22 mane horripilatione vehementi afficitur cum tussi, dolore lateris sinistri, oppressione et animi deliquiis. Post aliquot horas in nosocomium adfertur. Durat ad vesperum horripilatio. Dolor lateris minuitur, oppressio remanet, augeturque. Venaesectione facta sanguis crustaceus educitur, datur decoctum hordei tamarindinatum cum nitro. Nox insomnis cum continua oppressione. Die 23 caput est liberius, facies rubescit, lingua pura sicca, os purum, dolores nulli: in medio vero pectore pone os sternum conqueritur aeger de pondere continuo, quasi saxa sibi imposita jaceant. Tussit parum absque molestia: suspiria multa, respiratio anxia: in utrumque latus absque dolore, in dextrum vero et in dorso minori cum anxietate decumbit. Abdomen est molle, sitis magna, pulsus celer, velox,

loxx, mollis, parvus; manus pedesque reliquo corpore frigidiores. Reiteratur venaesectione, continuantur medicamenta antiphlogistica nitrosa: sanguis crustaceus, breve anxietatis lenimen exsiliente sanguine: vesperi iterum sanguis educitur crustaceus.

Die 24. Oppressio eadem: pulsus magis collapsus: frigus manuum, pedumque sensibile. Certus de cordis inflammatione reitro venaesectionem, continuo medicamenta antiphlogistica, applico, suris sinapismata, et omni bihorio granum camphorae cum nitri scrupulo semis supposito.

Sanguine e vena tarde effluente et sponte fluere renuente unciae vix tres emittuntur: crusta tenui tegitur cruor minus compactus. Interim aeger aliquod inde sentiebat lenimen. Urina est tenuis, flavicans, eneoremate natante: alvus bis; vesperi levissima horripilatio, dein calor paulo major, nox insomnis anxietate aucta.

Die 25. Manusque pedesque livescunt, frigidi, respiratio brevissima et maxime anxiosa cum levi stertore; tussis rarior, sicca,

sicca, vox deficiens. Aeger continuo mediam pectoris plagam digitis monstrat, indicans, hic latere anxietatis funestae causam: oculi splendent, facie, labiis, linguaque pallescentibus: pulsus nullus in carpo, in temporibus vix perceptibilis: nox terribilis inter inquietudines et anxietates: Somnus levis, brevissimus, et vigilationes violentae, terrificae.

Die 26. Frigus et livor manuum, pedumque augentur: livor ad antibrachia et malleolos, frigus ad brachia et femora extenditur: sudores frigidi, omnia instantis mortis symptomata, vi animi integerrima. Sub meridiem mors levis inter convulsiones.

Cadavere aperto cerebrum sanum, pulmones ambo sanguine turgidi, lymphae coagulabili undique cincti: cordis pars dextra et inferior auriculam et ventriculum dextrum efficiens ad apicem usque inflammata, fusca, livescens: vasa coronaria sanguine turgida; exterior cordis facies plena excrescentiis albis verrucosis, a lymphae coagulabili ortis: polyposae concretiones in vasis. Omnia alia viscera sana.

Inter-
mitten-
tes.

Praeter inflammatorios morbos febres intermittentes hoc mense non minus fuerunt frequentes, praecipue tertianae, a glutinosis primarum viarum impuritatibus ortae. Sanabantur facile salium mediorum usu, vel et tartari emetici refracta dosi. Nemo cortice indiguit. Ad recidivas avertendas et sanitatem confirmandam dedi sub finem amaricantia.

Aeger quartana per novem menses affectus attentiores exposcebat curam. In regione paludosa febre hac correptus fuerat: habitus corporis fuit cachecticus, tumidulus; abdomen plenum obstructionibus, lingua alba, oculi flavicantes, palpebrae inflatae, pulsus mollis debilis, apyrexiae tempore tardus, et inaequalis, urina modica, fusca, opaca, alvus inordinata nunc obstructa, nunc dyarrrhaeica. Dedi varia, sed frustra: deinde drachmas tres arcani duplicati et decoctum radicum graminis et taraxaci cum grano uno tartari emetici sumpsit per diem; diaetamque servavit mere vegetabilem.

Continuavi haec per tres septimanas. Alvus hoc tempore ter indies quaterve soluta,

luta, flava, saepe et fusca, nigricans, pultacea. Lingua depurata rubescere coepit: gustus amarities paulatim nulla: facies, oculique lucidiores, abdomen molle, in urina post quemlibet paroxysmum sedimentum rubrum lateritium, febris interim stata semper hora redeunte.

Corpus sufficienter depuratum credens corticem peruvianum 14^{ta} Febr. exhibui; drachmas nimirum duas pulveris corticis peruviani rubri. Paroxysmus febrilis inde non emansit: auxi dosin ad drachmas quatuor per diem, additis rheo et sale ammoniaco, cum alvus durior evasisset. Sed nec hisce cessit febris: contra et frigus et calor vehementius furere et diutius, oculi denuo flavicare, lingua sordibus infici, abdomen intumescere. Die 20. Febr. omisso cortice incidentia denuo dedi: drachmas arcani duplicati quatuor per diem in pulvere et decoctum malvae cum uncia semis cremoris tartari. Inde mox copiosa solida alvus et urina cum multo sedimento lateritio sequebatur. Die 25. paroxysmus mitior: die 28. serius adrepebat febris multo brevior, minusque vehemens. Diebus liberis aeger optime se habebat. Tertia Martii paroxysmus idem

idem mitis; hinc quarta denuo dedi corticis peruviani rubri drachmas duas per diem: quinta eandem dosin: sexta nulla febris, oscitatio tantum frequens tempore febris consueto: septima, octava, nona continuo datus cortex: nona disparuit febris penitus.

Haec laetitia minus nobis fuit diuturna: viso corporis statu hydoprico, praecipue faciei; abdomen adstrictum erat, pedes oedematosi, aeger anxius ac orthopnoeicus tussiebat sicce: urina modica, crassa, fusca. Omisso mox cortice dedi decoctum malvae cum cremore tartari. Undecima et duodecima urina copiosior, nulla febris amplius. Sic hydrops brevi evanuit, urina nunc continuo largius effluente. Decima quinta Martii aeger integre sanus nullum amplius sensit incommodum.

Nihilominus illum sine omni medicamento ad decimam tertiam Aprilis in nosocomio retinui, partim ut viderem, num febris rediret, partim ut penitus vires recuperaret diuturna febre valde exhaustas: hucusque sanus mansit.

Casus hic clare edocet, quam arcte febres intermittentes cum suis causis, unde ortum traxere, connexae sint, et quam saepe impuritates ac obstructions in secretis corporis partibus, omnibus licet signis depurationem optime factam indicantibus, latere, febrimque continuare possint. Rarissimae certo febres sunt, quarum hic dictus character febrilis unica continuationis causa est. Ut plurimum adsunt impuritates, quas excoquere natura tentat et febre continuata expellere.

Si huic aegro initio corticem ulterius porrexissem, febris certissime, ut et morbo apparebat, in continuam transiisset, morbo maligniorem, cum occulta viscerum abdominalium inflammatio ejusdem fuisset causa, quae vel in gangraenam, vel in suppurationem immedicabilem abiisset, praecipue cum corticis duplicata dosi inflammatio indies magis fuisset propagata.

Excoctis vero et eductis penitus impuritatibus cortex et constanti effectum, et cito juvit, febrimque extirpavit, quam ne repetitae quidem salium sumptiones resuscitare poterant: imo salia ipsa febris recidivam

divam felicissime impediabant, resistendo obstructionibus, statibusque humorum in partibus exterioribus, quae corticis adstringente vi rursus erant inductae.

Leprosus. Hoc mense aegrum in nosocomio habui, cujus morbus ad historiam leprae aliquid conferre potest.

Vir triginta duorum annorum valde macilentus, qui multos annos rerum omnium inopia conflictatus, non habuit,
Frigus quo duramque famem depellere possit,
in nosocomium intravit.

Fuerat hic antea mercenarius: antea tres annos peripneumonia laboraverat, a qua sanatus siccam retinuit tussim: hyeme sequenti tussis vehementior cum febris: sanatus inde debilis mansit, et per aestatem ad labores minus firmus, unde victum mendicando quaerere coactus. His in miseriis tussis aucta fuit, corpusque magis debilitatum. Tecta omnis generis impuritatibus superficies corporis versus hyemem multis ulceribus scabiosis siccis valde prurientibus affecta. Ille interim continuo famelicus obvia quaeque avide voravit.

Sub finem Decembris 1789 tumor phlegmonodes in utroque femore prope trochanteres majores nascitur: super lignum continuo cubanti tumores hi cito in abscessus ebeunt. Secunda Jan. in nosocomium ducitur. Super trochanteres majores tumor pallido ruber, mollis surrexerat, octo pollices longus et tres latus. Fluctuatio fluidi cujusdam hic facile detecta est. Aperto utroque tumore pus bene coctum effluxit uncularum quinque. Deligavimus abscessus digestivis, leviterque roborantibus. Aegro medi decoctum malti hordei et lac, atque praeterea corticem peruvianum tum in substantia, tum in decocto, nutrimento vero coopepta, sed incassum.

Primis decem diebus ulcera multum deherere puris, cujus dein copia minor fuit quidem, sed sine ullo consolidationis signo. Caro recens flaccida, pallidaque. Optimis licet roborantibus adhibitis, nullus fuit horum effectus. Tussis continua, venemens, sputum copiosum, purulentum, corpus quotidie magis macilentum.

Versus decimam Febr. alium induit colorem, exaruit cutis corporis. In facie infra

fra oculum dextrum in gena descendendo ad mentum usque, in medio pectoris dextrorsum usque ad regionem epigastriacam dextram, in brachio denique et femore utroque apparuit maculis distinctum exanthema siccum, album, squamosum, simul ac squamarum instar et furfurei pulveris decidens, cute inferiori insensibili, vera impetigo. Hae maculae et striae indies auctae, indies novae propullularum adeo ut intra octiduum paucae cutis sanas regiones superessent. Integra facies a fronte ad mentum usque, abdomen integrum maxima pars dorsi, brachium utrumque et femora pedesque ad digitos usque quodammodo latebant sub albo siccoque exanthemate leproso. Levissimo contactu frictive exuebatur tophacea cutis superficies, squamis in pulverem tenuem furfuraceum abeuntibus, cutis integra pruriebatur. In parte cappillata exanthema idem supercilia, barba, capillique arescebant canescentes, defluebantque.

Aeger erat valde debilis: oculi inflammati, dolentes, nec lucem ferentes: lingua munda, nulla nec in cute, nec in abdomine durities: tussis nunc minor, respiratio paulo

culo faciliior, sputum solito minus: alvus
ara, sitis major, fames maxima, sudor
nullus, lintea vero scatentia pulvere albo
furaceo exanthematis, subinde lancinans
olor artuum, ulcera vero femorum semper
perta, sine pure, sine coalitione.

Nondum legeram hoc tempore classi-
um Hensleri opus de lepra. Interim clarum
st, aegritudinem hanc ad classem leprae
 pertinere. Summam humorum corruptionem
de quidem perspexi; nihilo tamen minus
xanthema hoc considerandum fuit tanquam
effectus naturae operantis, cujus nutui obe-
diendum censui.

Cum acrimonia herpetica fors basis to-
tus morbi existeret, in hanc solam credidi
cogitationem omnem esse dirigendam. Qua-
propter flores sulphuris porrexi, aucta do-
si decocti corticis peruviani cum lacte; con-
tinuavi simul decoctum malti pro potu,
praescriptis continuo optimis nutrimentis.
Cum aeger nimium debilis ad balnea usur-
panda fuerat, continui eum in lecto bene
calidum, et potus praebui calidos.

His non obstantibus febricula contin
illum affligere non destitit, indies au
Tussis initio mitior recrudit, sputum d
color evasit, et foetidum; respiratio ind
magis oppressa, laboriosa, tumore oed
matoso pedes occupante, viribusque co
labentibus; aeger tandem 22 Febr. exanim
tus est. Notandum exanthema binis an
mortem diebus multum imminutum fuiss
item, aegrum nunquam venerea lue lab
ravisse.

In cadavere pulmones ambo erant di
colores, gangraenosi. Cavum pectoris se
flavicante plenum, internatantibus hinc in
caseosis particulis. Viscera abdominis s
na: In ulceribus femorum caro pallida,
sinus non profundi. Cutis, praecipue ea
quam obsederant primae impetiginum ma
culae, durior, et tunica cellulosa subjace
sero flavicanti redundans.

Mortui hoc mense in civitate 1170.

F E B R U A R I U S.

Barom.			Therm. Reaum.			Venti.		
ies.	alti.	med.	gradus medius.			mane.	meridie.	vesperi.
	27 dig.	9 $\frac{1}{2}$ lin.	—	o	0 $\frac{1}{2}$ gradus	o	o	o
1	28 —	1 $\frac{1}{2}$ —	+	o	0 $\frac{2}{3}$ —	o	o	o
2	28 —	2 —	+	o	3 —	W. f.	W. m.	W. m.
3	28 —	3 $\frac{1}{4}$ —	+	o	4 $\frac{1}{4}$ —	W. m.	W. p.	W. p.
4	28 —	2 $\frac{3}{4}$ —	+	o	4 $\frac{2}{3}$ —	W. p.	W. p.	W. f.
5	28 —	1 —	+	o	3 $\frac{2}{5}$ —	W. f.	W. f.	W. f.
6	28 —	1 —	+	o	4 $\frac{1}{2}$ —	o	W. f.	W. f.
7	27 —	9 $\frac{3}{4}$ —	+	o	5 —	W. f.	W. f.	W. f.
8	27 —	8 $\frac{1}{2}$ —	+	o	3 $\frac{1}{4}$ —	W. f.	W. f.	W. f.
9	27 —	7 —	+	o	1 $\frac{1}{4}$ —	W. f.	W. f.	W. f.
10	27 —	1 $\frac{1}{2}$ —	—	o	1 —	W. p.	W. p.	o
11	27 —	10 $\frac{2}{3}$ —	+	o	2 $\frac{1}{4}$ —	W. m.	W. m.	W. m.
12	27 —	11 $\frac{1}{3}$ —	+	o	5 —	W. f.	W. f.	W. f.
13	28 —	1 —	+	o	4 $\frac{1}{2}$ —	W. p.	W. p.	o
14	28 —	0 $\frac{1}{2}$ —	+	o	3 $\frac{1}{3}$ —	o	W. p.	W. p.
15	28 —	1 —	+	o	4 $\frac{1}{2}$ —	W. p.	W. p.	o
16	28 —	0 $\frac{3}{4}$ —	+	o	3 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
17	28 —	3 —	+	o	4 $\frac{1}{2}$ —	N. p.	o	W. p.
18	28 —	5 —	+	o	4 —	o	o	o
19	28 —	4 $\frac{2}{3}$ —	+	o	5 —	o	o	o
20	28 —	3 $\frac{1}{3}$ —	+	o	1 $\frac{2}{3}$ —	o	o	o
21	28 —	2 $\frac{1}{2}$ —	+	o	5 —	o	o	o
22	28 —	1 —	+	o	4 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
23	28 —	1 —	+	o	4 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
24	28 —	2 —	+	o	4 $\frac{3}{5}$ —	o	o	o
25	28 —	2 $\frac{1}{4}$ —	+	o	4 $\frac{3}{4}$ —	NW. p.	NW. p.	o
26	28 —	1 $\frac{1}{3}$ —	+	o	5 —	W. p.	W. p.	W. p.
27	27 —	8 $\frac{2}{3}$ —	+	o	5 —	W. f.	W. f.	W. f.

Die 19 et 20 altitudo barom. max. = 28 dig. 5 lin.

Die 10 altitudo minima = 27 dig. 5 $\frac{1}{4}$ lin.

Die 2 et decima frigus max. = — o 2 grad.

Die 16. 23. 24. calor maximus = + o 7 grad.

Fri-

Frigus ineunte mense remisit subitum, nix, glaciesque solutae sunt, coelum nubibus obductum, pluvia alternatim cadente ad duodecimam usque: aquae intumescunt a duadecima ad finem mensis usque aer serenus fuit et vernalis: multi dies calidi, tristes ultimis nubes, quandoque pluviae.

In nosocomium per hunc mensem missi sunt aegri 42. Viginti quinque ac febri affecti: ex reliquis septemdecim 4. 1 bri hectica, 2 crysipelate, 1 dyarrhaea, 1 scabie, 1 scorbuto, 3 fluore albo, 1 cancro venereo. Mortuus est ex omnibus quadragesimus secundus.

Febris
mesen-
terica.

Acutae febres omnes remittentes fuerunt inflammatoriae, gastricae, biliosae, tuitosaeque colluvie simul praesentibus.

Continuavit quidem febris prioris mensis: pectus tamen erat liberius, sed eo magis tota vis morbi in abdominis viscera desae-

Aegri alternis plerumque diebus majorem et diutius durantem calorem experiebantur, sequenti nocte magis inquieta. Primum tribus quatuorve diebus vesperi accedebat horri-

horripilatio: calor paulatim erat intensior,
versus matutinum tempus iterum remissus.
Pulsus semper celer, parvus, contractus,
vesperi celerior, major: caput pectusque
erat libera, tussicula rara, respiratio in exa-
gerbatione magna, celeris, alias naturalis;
lingua muco albotenui obducta, os pasta-
ceum, amarum; saepe conamen vomendi
cum flavicante muco linguam obducente,
hypochondria tensa, saepe tumidula; do-
lores obscuri abdominis, tactu etiam rudio-
ri nequidem aucti, alvus rara et fluida.

Progrediente febris lingua indies evasit
impurior, muco magis flavo tecta: hypo-
chondria magis tensa, calor continuus;
septimaque die post nulla amplius remissio,
pulsus parvus, celer, frequens, tremulus;
collapsa facies, alia vultus forma rugis
distincta, oculi tristes, inquieti: aeger
se inquietus et anxius; urina semper lim-
bida, alvus fluida, quandoque frequens,
semper tamen fluida modicaque.

Morbus sibi relictus tertia septimana
plerumque morte terminabatur. Paucissimi
vixere, qui nona, undecima, decima tertia die,
per universali crisi per alvum per urinam et
suo-

sudorem morbo liberarentur. Mors eo ceterior erat, citiorque, quo infeliciori omni morbus in initio pro intermittente, post putrida febris habitus, cortice peruvian aliisque medicamentis adstringentibus tractabatur. Ex purgantibus continuo datis idem vidi malum.

Manifesta erat febris mesenterica Babilivii, a colluvie impuritatum in abdomine et inflammatione viscerum abdominalium nata.

Hac ratione venae sectiones saepe bis ter, quaterve repetitae non tantum saluberrimae, sed et maxime erant necessariae cum his conjugenda erant diluentia, leviter incidentia, eccoprotica. In nosocomio decoctum hordei copiose sumptum, cunciam semis vel integram mannae, aut unam duasve arcani duplicati drachmas, fibra scilicet irritabili mannam, in humorum vero tenacitate arcanum admiscueram scopulo huic optime respondebat: nec erat, cum per integrum morbi decursum aliud medicamentum porrigerem.

Continuavi hoc medicamentum quotidie, imminui vero saepe, imo quandoque penitus omisi additam mannae, vel salis rosini, aegro scilicet alioquin alvum frequentem habente. Quodsi vero alvus bis, r, quaterve pernichiemerum cum euphoria responderet, reliqui medicamenta laxativa ad finem morbi usque.

Sanguis extractus semper crusta tenui, lba, dura et contracta tectus erat, cruore limbo, sero copioso.

Saepe aeger post primam venaesectionem nullum dedit levaminis signum: pulsus erat continuo parvus, aeger magis anxius, invalescens febris. Inquietudo vero, dolor ille abdominis obscurus, manifestissimo vero argumento crusta sanguinis phlogistica medicum de latente inflammatione certum reddere poterant, et audacem ad secundam et tertiam venaesectionem repetendam. Lucrum sufficiens, cum morbus tertiduum non accresceret. Multis tunc sextamodo, septimave die, aliis nona, undecima et decima quarta criticus erumpebat sudor, asmi feliciter soluti nuncius. Alvus nunc tecta, viridis, copiosa sequebatur, urina

tenuem prius nubeculam in medio vehementer largum nunc et flavicans deponebat sedimentum, febris penitus remittente.

Nullus sic tractatus aeger mortuus est. In quadam aegra morbi vis cerebrum sine occupaverat: Erat ea caelebs viginti sex annorum. Mense Junio prioris anni febre biliosa inflammatoria laboraverat a qua venaesectionibus et medicamentis diluentibus et incidentibus decima septima die liberata fuerat. Ab illo tempore huc usque, uti et antea, sana mansit, menstruis bene, ordinateque fluentibus.

Secunda Febr. horrore absque ulla causa praecedente agitabatur et calor noctu sudabat.

Tertia Febr. per diem alacris fuit, solum pastaceo. Vesperis eadem, quandoque, hora rediit horripilatio, calor sudorque cum vehementi cephalalgia in regione frontis et temporum.

Quarta: Mane os pastaceum, cephalalgia per diem continuans; hodie auxilium quaerit aegra. Conqueritur de lassitudine oris pastaceo gustu et cephalalgia. Pul-

parvus est, celer, et contractus; lingua muco albo obducta, abdomen tensum, facies pallida, oculi subinflammati, lucem non ferentes. Dedi ipsi unciam unam et semis salis amari in aqua soluti, et decoctum hordei cum aceto: alvus inde trina. Sub vesperum rediit calor, sed absque horripilatione et paulo remissior hesterno: sitis durante calore magna, noctuque parum sudoris.

Quinta: Cephalalgia manē adhuc major, quam hieri; abdomen adhuc tensum, pulsus parvus, contractus, frequens; urina aquosa, loquela volubilis: labium Superius saepe mordebat aegra, utrumque novum id et insolitum. Venaesectione uncias duodecim eduxi sanguinis, crusta contracta tenaci alba tecti: porrexi decoctum hordei cum uncia mannae: vesperi exacerbata sunt omnia, calor major absque sudore, alvus quaterna fluida.

Sexta. Eadem: oculi rubri fixi, delirium, stupor; pulsus parvus, minus celer, 90. ictuum uno minuto; lingua alba, in cuius fundo flavicans haerebat mucus, de siti nulla querela; aegra tamen potum quemcunque sibi oblatum nunquam respuit. Ve-

naesectio iterum unciarum octo: sanguis idem. Delirium per aliquot horas inde minus: jacuit tamen adhuc continuo stupida. Vesperi cephalaea a vertice ad tempora descendens: delirium dein ferox, calor siccus. Continuatum fuit decoctum hordei cum manna; alvus ter per nichthemera.

Septima. Eadem. Pulsus mane vix non erat naturalis, tardus, sed contractus, parvus; continuavi medicamenta: alvo nec noctu nec mane respondente enema dedi salinum, unde ter alvus fluida, pauca: vesperi omnia exacerbata; delirium continuum, ferocitas, furor, facies pallida, albugo oculorum ignea, pulsus velox, inordinatus, parvus. Sinapismos ad plantas pedum applicavi.

Octava. Delirium continuum, tussis sicca cum respiratione celeri, lingua mucosa albo dense obducta, sicca; hypochondria tensa, elata; pulsus ut heri irregularis, quandoque intermittens. Continuatum fuit decoctum hordei additis drachmis duabus arcani: Vesperi omnia adhuc magis exacerbata: tussis noctu frequens sicca.

Nona.

Nona. Sudor parvus, eneorema in urina: vesperi levior exacerbatio.

Decima. Delirium minus, tussis eo major, semper sicca, noctu sudor levis.

Undecima. Delirium continuo minus: alvus ter cocta biliosa. Decoctum hordei cum areano indesinentere continuatum: vesperi brevis horripilatio sequenti calore sicco.

Duodecima. Calor siccus continuat, respiratio cita, tussis vehementior sicca, pulsus parvus, celer, mollis, minus irregularis: facies exhilarata, oculi naturales, delirium fere nullum amplius, stupor immixtus. Vesperi sudor et urina cum denso eneoremate: alvus per diem septies biliosa cum levamine, hypochondria inde mollescunt.

Decima tertia. Per diem iterum calor siccus, tussis vehemens sicca, cephalalgia, alvus bis fluida: cataplasmata emollientia calida pectori applicantur. Seposito sale additur uncia mannae decocto hordei, quod tepidum exhibebatur: nox inquieta.

De-

Decima quarta. Calor vehemens siccus, pulsus celer, parvus, inaequalis; lingua sicca, flavo mucro obducta; sitis, horripilatio cum calore, abdomen iterum tensum. Continuavi hesternae medicamenta. Vespere sudor et quies per integram noctem,

Decima quinta. Sudor continuus largus per integram diem: tussis minor, caput omnino liberum, abdomen molle; ter alvus copiosa, pultacea, biliosa; urina jumentosa, posito mox sedimento flavicante copioso; pulsus mollis, tardus, 60. ictuum in uno minuto. Prodierunt hinc inde e corpore et brachiis pustulae rubrae prurientes omni momento numerosiores.

Decima sexta. Sudor calidus continuatur, tussis nulla, nulla cephalalgia, appetitus nulla querela, nisi de magno exanthematis verae scabiei pruritu; in brachiis enim digitorumque interstitiis innumerae propullulant prurientes scabiosae vesiculae: pustulae pectori insidentes et abdomini incrementum apice albo.

Decima septima. Sudor adhuc largus, urina sedimentum largum deponit, alvus

ter,

ter, lingua pura, abdomen molle, pulsus naturalis, corpus integrum pustulis scabiosis pro parte suppurantibus tectum. Hinc manna seposita aegrae nil dedi, nisi potum tepidum ex decocto malvae, et drachmas duas florum sulphuris per diem. Vires cito reffectae sunt, manus vero brachiaque copiosissimis tumuerunt pustulis scabiosis.

An critica fuit scabiei eruptio, an potius recentis contagii progenies, nulla licet, quantum scio, occasione praesente?

Post vigesimam primam viribus sufficienter recuperatis aegra balneo sulphureo per aliquot dies immissa reconvaluit citissime. Nulla ulterior scabiei eruptio, praesentium pustularum brevis sanatio, sic ut sanissima sub finem mensis enosocomio dimitti posset.

Historiam hujus aegrae paulo fusius narravi, propterea quod inde morbi grassantis ingenius optime perspicui possit; licet phrengesis mox ab initio, pectoris item affectio indecurso morbi obortae anomaliam quandam effecerint.

Hepa-
titis.

Foemina hepatitide laborans in nosocomium adfertur. Laboraverat priori anno biliosa, a qua sanata optime valuit.

14. Febr. absque causa sensibili horripilationes experiebatur et subsequentem calorem, dolebat simul ex hypochondrio dextro: nox inquieta fuit et insomnis, cum magno hypochondrii dolore.

15. Calor erat intensus, siccus, oculi flavi, dolor hypochondrii enormis, tactu auctus; pulsus frequens, celer, durus, lingua mucosa albo tenui obducta, os amarum pastaceum. Venaesectione sanguinis unciae duodecim educuntur: exhibetur vasculatim uncia salis sedlizensis in libra aquae singulis horis sumenda; praeterea decoctum hordei cum oximelle pro potu. Sanguis crusta densa phlogistica tectus fuit: quatenus alvus copiosa sequebatur: nox erat insomnis.

16. Eadem. Color ictericus totius corporis vera hepatitis. Aegra haec videbatur mihi praebere occasionem experiendi inunctiones unguenti mercurialis. A die hodierna bis indies drachma hujus unguenti inungi-

coep-

coepta est in hypochondrio dextro, ubi dolore sentiebat. Interne dedi decoctum radicis salep.

17. Noctu somnus septem horarum tranquillus cum multo sudore; alvus quater biliosa pultacea. Color ictericus, et dolor hypochondrii omnino disparuerant. Pulsus mollis, elatus, paulo celerior naturali: inunctio ut heri.

20. Integre sana est, et appetit. Febris omnino cessante, agram biduo adhuc unguento neopolitano inungi jussi.

En hepatitidis sanationem unguento neapolitano peractam, nec leve argumentum ad confirmandam hujus medicamenti in hepatitide virtutem, a multis nunc medicis affirmatam. Hinc sane videtur, ut ulteriora illius experimenta capiamus, dignissimum.

Sic cogitavi, dum hanc observationem finieram. Altero mox mense ea ipsa aegra novam mihi praebeuit experiendi occasionem, experimento vero minus felici.

Afferebatur in nosocomium secunda morbi die, iterum laborans hepatitide cum dolore vehementi hypochondrii dextri, pulsu celeri, duro; colore ictérico, aestu.

Sanguine per binas venaesectiones educito, et alvo decocto mannato purgato, locum dolentem mox inungi curavi unguento mercuriali.

Altera die post noctem inquietam auctus fuit morbi furor. Cutis intensius flava et sicca; lingua arida, et dolor hypochondrii vehementissimus cum pulsu celerrimo duro. Inunctiones tamen continuavi ad vesperam usque, exhibito simul decocto emolliente nitroso.

Omni momento malum serpebat latius et vesperi inflammatio summum attigisse gradum videbatur, jamjam abitura in suppurationem, vel gangraenam, nisi evacuante et diluente methodo eam compescerem.

Seposita ergo ulteriori inunctione mercuriali, sanguinem ad uncias quatuordecim eduxi, cataplasmata calida emollientia loco dolenti applicui, omni bihorio clysmata emol-

molliens injici curavi, usu interno decocti
mollientis nitrosi continuato.

Aegra brevi levamen sensit a mutata
edendi methodo; nox fuit paulo pacatior.
Alterà die cutis satis madida, lingua hu-
ida, dolor vero hypochondrii adhuc mag-
is. Iteratur venaesectio, crusta larga,
prius, sanguinem tegebat; Levamen a
venaesectioe. Binis adhuc vicibus san-
guis educendus erat, continuatur usus emol-
lientium.

Quinta morbi die sudor copiosus erupit
continuans. Sexta mane urina largum de-
posuit sedimentum flavicans, et alvus qua-
r pultacea biliosa excreta est. Dolor ma-
gis omnis abiit, cute pallidiori.

Septima die aegra feбри omni caruit,
anaque mansit absque recidiva.

Si hanc morbi historiam cum priori con-
ferimus, justum oritur dubium, sitne prio-
ris morbi sanatio inunctioni mercuriali tri-
buenda, an potius morbi ipsius levitas san-
guinis educatione et medicamento emollienti
cesserit, nullo respectu ad inunctionem ha-
bito.

Altera sane observatio inunctionis mercurialis inefficiam clare demonstrat, ceteroque certius hepatitis in suppurationem vergentem abierat, si ejus usum ulterius continuassem.

Edocemur inde, inflammationem cujuscunque partis omnium optime sanari methodo usitata antiphlogistica et evacuantem quam ratio docet, et experientia confirmat.

Mortui hoc mense in Civitate 1153.

Barom.		Therm.		Venti		
alti.	med.	gradus medius.		mane.	meridie.	vesperi.
27 dig. 8 $\frac{2}{3}$ lin.		+	0 2 gradus	W.p.	W.p.	W.p.
27 — 11 $\frac{1}{4}$ —		+	0 0 $\frac{1}{4}$ —	N.p.	N.p.	N.p.
28 — 0 $\frac{2}{3}$ —		+	0 0 $\frac{2}{3}$ —	N.m.	N.p.	N.p.
27 — 9 $\frac{1}{3}$ —		+	0 3 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
28 — 1 $\frac{1}{2}$ —		+	0 0 $\frac{3}{4}$ —	N.p.	N.p.	N.p.
28 — 2 $\frac{1}{2}$ —		—	0 0 $\frac{1}{2}$ —	N.p.	o	N.f.
28 — 1 $\frac{1}{4}$ —		+	0 3 —	o	W.m.	W.m.
28 — 2 $\frac{3}{4}$ —		+	0 2 $\frac{1}{4}$ —	N.p.	N.m.	N.p.
28 — 1 $\frac{1}{3}$ —		+	0 4 $\frac{2}{3}$ —	o	W.p.	W.p.
27 — 10 —		+	0 5 $\frac{1}{3}$ —	o	o	o
28 — 0 —		+	0 6 —	o	N.p.	o
28 — 4 —		+	0 5 $\frac{2}{3}$ —	o	N.p.	o
28 — 4 —		+	0 5 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
28 — 0 $\frac{1}{3}$ —		+	0 5 $\frac{1}{2}$ —	o	W.p.	W.m.
27 — 11 $\frac{1}{2}$ —		+	0 4 —	o	NW.p	N.p.
28 — 3 $\frac{1}{4}$ —		+	0 3 —	N.p.	N.p.	o
28 — 3 $\frac{1}{2}$ —		+	0 3 $\frac{1}{2}$ —	N.p.	N.p.	N.p.
28 — 1 —		+	0 4 —	N.p.	o	W.p.
28 — 1 $\frac{1}{4}$ —		+	0 5 —	o	o	o
28 — 3 —		+	0 5 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
28 — 3 $\frac{1}{4}$ —		+	0 7 $\frac{1}{4}$ —	o	o	W.p.
28 — 3 —		+	0 7 $\frac{3}{4}$ —	S.p.	S.p.	S.p.
28 — 1 $\frac{1}{3}$ —		+	0 8 $\frac{1}{3}$ —	S.m.	S.m.	o
27 — 11 $\frac{1}{4}$ —		+	0 8 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
27 — 11 —		+	0 9 $\frac{1}{3}$ —	o	o	o
27 — 10 $\frac{1}{4}$ —		+	0 8 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
27 — 10 —		+	0 10 $\frac{1}{2}$ —	o	SSO.p.	S.S.O.p.
28 — 0 $\frac{3}{4}$ —		+	0 7 $\frac{2}{3}$ —	SS.O.p.	SSO.p.	S.S.O.p.
28 — 1 —		+	0 3 $\frac{1}{2}$ —	SS.O.p.	SSO.p.	o
27 — 11 —		+	0 4 —	o	o	o
27 — 9 $\frac{1}{4}$ —		—	0 0 $\frac{2}{3}$ —	o	N.m.	N.p.

Die 12 et 13 barometri altitudo maxima = 28 dig. 5 lin.

Die 1 altitudo minima = 27 dig. 7 $\frac{1}{2}$ lin.

Diffe. = — dig. 9 $\frac{1}{2}$ lin.

31 frigus maximum = — 0 3 grad.

27 calor maximus = + 0 14 grad.

Summa = — 0 17 grad.

Primi dies ad quintum usque frigidi midiquè erant nive et pluvia copiose dentibus. A quinto vero per integrum mensem non interrupta risit serenitas, nulla bula, nulla nube apparentibus.

In nosocomium hoc mense 48 aegri cepti sunt. Media eorum pars acute labora. Ex aliis quinque febre hectica, sex scorbi sex scabie, duo lue venerea, una erysipel ophtalmia altera, duae gravidae, et una graena pedum affecti fuerunt. Mortuū his vigesimus quartus.

Febri-
um me-
senteri-
carum
conti-
nuatio,

Morbi hujus mensis acuti perrexerunt esse inflammatorii generis cum bil cruditatibus; rheumata mitiora, qui etiam morbi pituitosi, et biliosi puri. A se vero adulto vernaes quotidianae mit indolis febres, paucorum dierum e sola diluente methodo absolutae.

Videbantur hyemales febres coni cum aestivalibus; unde inflammatio bilis moniae juncta erat: haec enim non desiit mas infestare vias, acri bile et pituita gentes.

Fefellit morbi initium remissione, ro gustu, lingua impura: ast latuit in matio tanto vehementior, quanto m

initio monstraverat symptomata, durante morbo in nervum erumpentia.

Nulla vero sine primarum viarum cruditatibus aderat phlogosis: unde duplex medicationis scopus instituendus erat.

Venaesectione extractus sanguis crassa densa et compacta semper tectus erat; ideo principem sibi postulavit locum venaesectio, saepe ter, quaterve repetenda. Haec enim neglecta, morbus invaluit, gangraena vitae finem cito faciente.

Mera emollientia morbum in longum protrahebant, nec biliosam infrangebant acrimoniam, pituitam vero augebant: unde phlogosis perstitit, in putridam saepe diathesin degenerans.

Emetica parum vel nihil praestiterunt: nil enim inde excretum est praeter aquam, vel singesta. Materies in intestinis haerebat profundius, unde tormina et meteorismus. A fortioribus purgantibus augebatur inflammatio.

Diluentia copiose sumpta tamarindis, mannave, et parva salis quantitate acicurata, plerosque restituerunt.

Bi

Biliosa colluvies per alvum educenda his in febris primarius morbi exitus fuit non vero simul, nec semel, sed paulatim et repetitis vicibus expellenda, cum novum indies continuata coctione nasceretur excrementum.

Nulla initio educebatur materies, cum adhuc existente morbo, spasmusque inflammatorio vasorum ora constringente. Inflammationem vero cum venae sectionibus continuatisque sedasem diluentibus, septima, nona et sequentibus diebus alvus aperiebatur; et quae prioribus diebus fere nihil effecerant medicamenta, nunc octies et pluries per diem purgarunt, exeunte per alvum foetida viridique pulte.

Frequentes in his febris cephalalgiae, tusses siccae dolentes, laterumque dolores simul et abdominis intumescencia.

Vir quinquagenarius a decima octava ad vigesimam primam Martii continuas per pressus horripilationes et calores, caput obtusum sentit et pectus anxium. Sudat vigesima secunda cum levamine, unde absolutam febriculam rheumaticam credit: se-

noctu insomnia terrifica: vigesima tertia
caput magis obtusum est: accedit tussis sicca,
dolens; dolor abdominis nunc magis intum-
escentis, lingua impura est, rubent oculi
aciesque, et pulsus celeriter et compresse
tribrat. Crustaceus sanguis venaesectione
ductus aliquantum affert levaminis, sed
quatuor horis post omnia, ut prius.

A purgante salino alvus copiosa, et
major hypochondriorum inflatio. Iterata
venaesectione, abdominis subsidentia et
anxietas minor.

Vigesima quarta vesperi exarcerbatio;
abdomen tumens, inflatum: venaesectione fit
anciarum decem crustaceo sanguine; noctu
insomnia terrifica, et post somnum

25 Martii Dolor capitis pulsans per trac-
tum ductus falciformis: tussis sicca, pul-
sus subdurus, celer: sanguinis crustacei un-
ciarum decem educuntur.

26. Dolor capitis maximus praecipue
post somnum: vesperi alvus ter cum flatibus;
dolor levis, noctu minor anxietas.

27. Eadem. Oppressio, tussis, et cephalaea cum meridiana febris exarcerbatione: iteratur venaesectio: sudor post, alvus laxa.

28. Cephalaea post momentaneum somnum vehementissima, cedens venaesectio in pede administratae: nox pacata cum sudore; alvus bis; hypochondria mollia.

29. Pulsus mollior, celeriter adhuc vibrans: meridie cephalaea maxima, sudor vesperi oborto fugata: sudor integra nocte cum alvo cocta biliosa ter excreta.

30. Apyrexia: meridie febris cum cephalalgia, alvo cruda dyarrrhaeica.

31. Mane horripilatio, dein calor sudorque levans cum alvo cocta: vesperorum exarcerbatio, calor siccus, alvus tunc cruda.

I. Aprilis. Mane horripilatio, dein calor et sudor levans, meridie iterum horripilatio, vesperi sudor largus, nox tranquilla, alvus quater cocta.

Apyrexia.

3. Meridie horror, vesperi calor, noctis sudor, alvus quinquies cocta biliosa.

4.—8. Continui adhuc febriles motus, alvus frequens cocta biliosa, et urina hucusque semper tenuis sedimentum deponit laticitium.

Depurationem numeris omnibus absolutam probavit ex integro restituta sanitas.

Aeger hic per totum morbi decursum cotidie absumpsit libras duas decocti granis, in quo uncia una et dimidia pulpae marindorum fuerat soluta, atque decoctum hordei cum aceto rubi idaei copiosum in potu. A trigesima Martii vero febris non manifestius remittente, decocto granis admiscui unciam semis salis mirabilis auberi, ut cocta nunc et soluta morbi materies per alvum eo facilius excerneretur.

Non omnibus vero eadem fuit morbi malignitas: multorum enim vires quarta quintave die, mutata rerum facie, colla-

bebantur, et morbus putridae febris indolem induebat, dolore omni evanescenti.

Aegri hi vultum rubescentem perdebat subito, facie tristi plumbeaque moerente vigor pulsus collabebatur, ad continuu delirium accedebant tremulae manus, succulientesque muscoli.

An acre morbificum intimius resorptum nervorum conditionem immutavit sanguinemque dissolvit? an potius acri non cooperante, ordinarius hic fuit morbi decursus.

Vidimus medios inter sopores, nervorumque tremorem, cum natura arte adjuvaretur, crisin praeparari, et diebus aliquot post tenacem hucusque massam per alvum, sudorem, urinamque excerni, nitate restituta.

Adjuvanda vero natura fuit. Arte deficiente, vel perversa, morbus morte terminabatur. Stimulo opus fuit ad excitandas vires; Saepe et robore, ad flaccidos solidorum compagem firmandam.

Interim transitus nimis praeceps a remediis antiphlogisticis ad roborantia noxius est. Percepta morbi mutatione, salina remedia extemplo seponenda erant, et leniter stimulantia diluentibus addenda. Quae-
dam camphorae grana optime huic scopo respondebant.

Sub horum usu, si vires continuo minus adhuc collaberentur, si gangraenosus corporis habitus appareret, stimulantium visus augeri, hisque adjungi roborantia fortiora conveniebat, nullo nunc amplius ad colluviem primarum viarum respectu.

Ipso enim sub usu roborantium vidimus subito juvari interruptam morbi coctionem, cruditates in abdomine cumulatim collectas expelli, crisi perfecta per alvum, sudorem, et urinam morbum feliciter terminante.

Duae puellae eodem tempore hac febre laboraverunt, initio peripneumoniaca, quarta dein die in putridam transeunte.

Altera viginti annorum florens puella sex modo mensibus menstrua sponte remanentia desiderans.

Vi-

Vigesima octava coepit febricitare praecedente horrore, duabus horis duranter paulo post tussis dolens, punctorius dolor lateris, cephalalgia vehemens, pulsus celer, durus, vibrans: venae sectione facta sanguis educitur crustaceus, cum levamine: exhibitum contenuatumque decoctum hordei cum nitro et manna, unctus alvus quotidie bis terve biliosa: pectus sensim liberum, sed cephalalgia non destitit aegram affligere.

1. Aprilis. Vires deficere coeptae, faciem mutari in turbidam torvamque, colorque roseus genarum in fuscum abire limitatur querela de malo quodam nulla amplius, de cephalalgia quidem; delirium mutatur somnus comatosus, subsultus tenditur pulsusque celer, mollis, undulosus; lingua pura. Ilico exhibita fuit camphora et grana duo omni bihorio cum nitri granis quatuor, et pro potu decoctum hordei cum aceto datum.

2. Noctu sudor: pulsus tardior, mollis vacuus; alvus bis: cetera ut heri.

3. Sudor continuat nunc copiosior, pulsus elevatur parum, facies coloratur dulcendius, subdelirium, subsultus nulli, somnus minor.

4. Continuus sudor cum levamine omnium symptomatum: alvus bis per diem: continuatur camphora et decoctum hordei.

5. Vires eriguntur: appetitus redit, sudor noctu,isque in quiete levans, pulsus ardior, elatus, urina lateritia.

Per duos adhuc dies urina sedimentum habet lateritium cum sudore continuo levante: vires cito increscunt.

Nona Aprilis medicamentis abstinens, carnem comedere coepit. Decima tertia a nosocomio veledicit.

Altera erat viginti duorum annorum.

26. Martii inopinato concutitur horrore, dolet e latere dextro, affligitur tussi sicca frequente: calor subsequitur venemens cum cephalalgia et dolore lateris, adeo invalescente, ut vix inspirare

rare posset: pulsus creber, vibrans, durus: venaesectione facta cum levamine sanguis educitur crustaceus: vena iterum iterumque secta, sanguis semper idem exhibita sunt diluentia eccoprotica nitrosa cataplasma emolliens pectori applicatum,

30. Doloris imminutio, respiratio faciliior, tussis minor, pulmonum subsidencia sed aucta quovis momento virium dejectione facies sensim pallida, turbida, gangraenosorum; delirium, subsultus tendinum, abdominis tumescentia, pulsus flaccidus, minus, inordinatus,

In hoc rerum statu mutata in gangraenam phlogosi, sepositis diluentibus hucusque datis dedi decoctum corticis peruviani et camphoram, ut omni bihorio uncias duas decocti corticis in libris duabus aquae infunderet, atque camphorae grana duo absumeret.

31. — 1. et 2. Apr. perduravit putri morbi furor, delirium continuum, sopor subsultus totius corporis, facies collapsa, pulsus mollis, flaccidus, inordinatus, pectus nunc sanum, nulla tussis amplius

lius, sed lingua indies copiosiori albo
 avicante muco obducebatur; continuatis
 interim largiore quidem dosi antisepticiis
 excitantibus remediis, ita ut a prima Aprilis
 scrupulos duos camphorae et uncias qua-
 nor corticis in decocto per nichemerum
 absumeret.

Nona morbi die sudor erupit copiosus
 um alvo dyrrhaeica biliosa, quarta, quin-
 aequae Aprilis continua, imo per hos dies
 rigesies et ultra seposita. Reconvalescens
 cito vires recuperavit. Decima nona Aprilis
 ad consuetos labores abiit.

Quid excitata febris natura possit, casus
 sequens edocet:

Vir 47 annorum scorbuto per medium
 nunc annum paulatim aucto infectus, rigi- Scorbu-
 lis artubus laxisque gingivis sanguinem fun- tus fe-
 dentibus, lividis latisque maculis toto cor- bre sa-
 pore dispersis, circa medium Martium febr- natus
 afficitur continua, cum tussi, dolore pec-
 toris in respiratione aucto, respiratione
 ipsa celeri, difficili, pulsuque frequenti
 celeri, molli,

Cum

Cum aeger hic de dissolutione scorbutica nullum relinqueret dubium atque hinc generosiorem antiphlogisticam methodum non solum fore inutilem, sed certe nocivam constaret, dedi solum decoctum mali cum pulveris calami aromatici drachma per diem.

Altera die malum non auctum: quarta sudor tepidus, respiratio facilior, tussis minor, artus mobiliores: quinta, sexta et septima continuavit transpiratio major cum perfecta febris et peripneumoniae abolitione: rediit appetitus, atque continuato per tres septimanas decocti mali et calami aromatici usu, aeger scorbutico omnino liberatus est, gingivis firmatis, artubus sanis, maculis evanescentibus.

In alio peripneumoniaco mirum vidi-
mus phenomenon. Erat homo 32 anno-
rum corporis athletici, nunc vero continuo
leguminum usu et ceteris squalore pallidus
et cachecticus, initio Martii vehementer
febricitat peripneumonia affectus: Pulsus
celer, durus, elatus; venaesectione in
brachio dextro instituta exsilit sanguis crus-
taceus, medio in cursu consistens subito

Quid

Quid rei impediat cursum respiciens, dis-
traho parum vulnusculum, et ecce globulus
iso minori similis exsilit, sanguine iterum
ffluente. Erat globulus cruor sanguinis com-
pactus, sat durus. Aeger hic sanitati resti-
tuebatur continuato decocto hordei cum
oximelle simplici et cremore tartari.

Interim per aestatem invadunt illum
frequentes catarrhi, subitaneae vocis rauce-
lines, pedum oedema, anasarca, et mense
julio hydrothorax.

Ex omnibus, quae ipsi exhibebantur,
remediis, optime tulit cremorem tartari cum
extracto lactucae virosae, imo saepius in-
tegra sanitate frui videbatur. Ast rediit
continuo malum remedio pertinacius, tan-
demque lethale. Mors undecima Augusti.

Cadavere aperto cavum pectoris utrum-
que libras quinque seri flavi continuit; pul-
mones ambo in tota sua substantia scyrrho-
si fuerunt, pluribus in locis vomicas con-
tinentes: pericardium seri libra una semis
turgidum; cor dextrum, auricula dextra,
et vena cava plures habuerunt compactos
sanguinis grumos, quorum unus non minor

juglande fuit: sinistrum cor vacuum; abdominis viscera sana, liene et hepate minus solito consistentibus.

An globulosus cruor hic in vena natus?

Phthisis scorbutica

Felicior evasit alius phthisi affectus. Hujus gingivae fuerunt flaccidae, sanguinolentae, artusa multo nunc tempore rigidi, et pallor faciei terreus cum pustulis rubris, fuscis, lividis. Sensim tussitare anhelare, expuere pus foetidum, et sanguinem congruatum coepit: pulsus micuit celeriter, vix perceptibilis prae molitie, febris hectica pomeridionalis cum rubore genarum limitato, fugaci. Praeter decoctum malti, quod copiose sumpsit camphora fuit exhibita a granis 2 ad 20 lenimen inde in respiratione et tussi, faciliore expectoratio et copiosior, atque immixtum scorbuti incrementum: ast febris substitit, vires solidorum dejectae. Cortex peruvianus 2. Apr. exhibitus anxietatem quidem et sputa cohibuit, sed febrim auxit.

Hinc sexta Aprilis ad priora remedia recursus, addito kermete. A 12 Apr. ad 20 urina cum sedimento lateritio copiosa:

fe-

febris immiutio, cessatio; tussis nulla,
 commoda respiratio, sputa minora, sen-
 tim puriora mucosa. Decoctum malti con-
 tinuatum cum pulvere calami aromatici æ-
 grotum pristinae sanitati restituit. Mense
 Augusto sanus nosocomio exivit.

Memorabilis a perfrigeratione ortus
 et aqua gelida pro maxima parte sanatus
 hic locum meretur sphacelus.

Spha-
 celus a
 perfri-
 gerio

Undecima deportatur ad nos puella
 sphacelo pedis sinistri orto a congelatione
 sexta Martii affecta.

A malleolis ad digitos usque tarsus et
 metatarsus una cum planta pedis nigerrimi
 sunt: cutis caroque frigidissimae, ac
 etiam punctae non dolent. Calidiori nunc
 coelo nivem frustra quaero: hinc immitto
 pedem in aquam frigidam, cui glaciem e
 cella glaciali receptam indideram, et eam
 diu noctuque in hac aqua retineri jussam,
 saepe saepius aqua frigida, glacieque,
 quotiescunque aqua prima tepesceret, re-
 center affusis, balneo.

Alter die nigredinem malleolorum in
 rubrum mutatam colorem invenio: Die

quarta tarsus rubet albescentibus malleolis modo sanis: sexta metatarsus rubet ad digitos usque: septima separationis ac supurationis linea circum omnes apparet digitos hac usque nigerrimos, laetius interius rubente metatarso et albo sanoque tarso. Continuatur igitur pediluvium aquae glacialis pertinaciter: duodecima nigra utriusque minoris digiti epidermis sponte separatur, dum cutis inferior sana est, et rubicunda. Ast superior digiti medii phalanx separatus os nudum monstrat, digitique dolent in frigida.

Medelam permuto invitus: deligantur nunc partes gengraenosae unguento de styrace, fomentanturque decocto corticis. Tres digiti reliqui suppurant, phalanges superiores suppuratione soluti decidunt, et sanatio in longum protrahitur. Tarsus vero et metatarsus, digitique duo minores perstiterunt sanissimi.

Mortui hoc mense in civitate 1322.

Barom.			Therm.			V e n t i.		
Dies.	alti.	med.	gradus medius			mane.	meridie.	vesperi.
1	27 dig. 11 $\frac{1}{4}$ lin.		+	0	0 gradus	N. p.	N. p.	N. p.
2	27 -- 10 $\frac{1}{2}$ --		+	0	0 $\frac{3}{4}$ --	--	--	--
3	27 -- 9 $\frac{3}{4}$ --		+	0	0 $\frac{1}{3}$ --	--	--	o
4	27 -- 9 $\frac{1}{3}$ --		+	0	5 $\frac{2}{3}$ --	o	--	N. p.
5	27 -- 11 --		+	0	0 $\frac{1}{2}$ --	N. p.	--	--
6	27 -- 11 --		+	0	1 $\frac{3}{4}$ --	o	o	o
7	27 -- 9 $\frac{3}{4}$ --		+	0	2 $\frac{1}{2}$ --	N. p.	N. p.	o
8	27 -- 8 --		+	0	3 --	o	o	o
9	27 -- 7 --		+	0	6 $\frac{1}{2}$ --	o	S. p.	S. p.
10	27 -- 4 $\frac{2}{3}$ --		+	0	10 $\frac{1}{4}$ --	o	o	S. f.
11	27 -- 3 --		+	0	13 --	S. m.	S. m.	o
12	27 -- 4 $\frac{1}{2}$ --		+	0	13 $\frac{1}{3}$ --	o	S. p.	S. m.
13	27 -- 7 --		+	0	12 $\frac{1}{4}$ --	o	W. p.	o
14	27 -- 8 $\frac{1}{2}$ --		+	0	12 $\frac{2}{3}$ --	o	S. m.	o
15	27 -- 8 $\frac{2}{3}$ --		+	0	11 $\frac{1}{3}$ --	o	S. p.	o
16	27 -- 6 $\frac{3}{4}$ --		+	0	13 --	o	--	W. p.
17	27 -- 7 $\frac{1}{2}$ --		+	0	10 $\frac{1}{4}$ --	W. p.	NW. p.	--
18	27 -- 7 $\frac{1}{2}$ --		+	0	6 --	--	o	o
19	27 -- 8 $\frac{1}{3}$ --		+	0	3 $\frac{1}{4}$ --	N. W. p.	N. p.	N. p.
20	27 -- 10 $\frac{3}{4}$ --		+	0	2 --	N. p.	N. p.	N. p.
21	27 -- 11 $\frac{3}{4}$ --		+	0	3 $\frac{1}{3}$ --	--	--	--
22	27 -- 11 $\frac{1}{3}$ --		+	0	5 --	--	--	o
23	27 -- 10 --		+	0	8 --	o	o	o
24	27 -- 8 --		+	0	11 $\frac{1}{4}$ --	o	o	o
25	27 -- 7 --		+	0	11 $\frac{1}{4}$ --	S. O. p.	o	o
26	27 -- 6 $\frac{1}{3}$ --		+	0	12 --	--	o	o
27	27 -- 7 --		+	0	12 $\frac{2}{3}$ --	o	o	N. p.
28	27 -- 8 $\frac{1}{4}$ --		+	0	12 --	N. p.	o	o
29	27 -- 8 $\frac{1}{2}$ --		+	0	13 $\frac{1}{3}$ --	o	o	o
30	27 -- 7 $\frac{3}{4}$ --		+	0	12 $\frac{3}{4}$ --	o	o	o

Die 21 altitudo baromet. max. = 28 dig. 0 lin.

Die 11 altitudo minima = 27 dig. 3 lin.

Diffe. = 0 dig. 9 lin.

Die prima frigus maximum = -- 0 2 grad.

Die 12 calor maximus = + 0 17 $\frac{1}{2}$ grad.

Summa = 19 $\frac{1}{2}$ grad.

Siccitas continua per integrum mensem primum diem si exceperis, quo multa r cecidit.

Grassatae sunt hoc mense febres intermittentes varii generis et ordinis, tertianae simplices et duplicatae, quotidianae simplices anticipantes irregulares, praeter febres complicatae inflammatoriae cum gastrinosa saburra in ventriculo, intermittentiū naturam brevi adoptantes, omnes cum urinis sedimentum lateritium cito deponentibus.

Intermittentes

Intermittentes solventibus et salinis facillime cedebant post quintum, sextumque paroxysmum et ultra, rarissime terminum vidi nonum.

Ex omnibus intermittente affectis unus isque adolescens cortice indiguerat. Antelaboraverat colica rheumatica; sanatus inde, subito vehementissimis cruciatur doloribus colicis, delirat, ardet totum corpus, riget, stupetque: pulsus celer durus post duas horas adrepat somnus cum sudore largo: surgit post somnum octo horarum sat alacer; urina largum deponit sedimentum.

dimentum lateritium: cum lingua esset crusta alba obducta, oculique parum flaverent, suspicatus, hesternum morbum fuisse paroxysmum intermittentem, dedi ipsi extractum graminis cum sale polychresto, et rheo, ut primas purgarem vias a fomite frequentissimo intermittentium: alvus inde copiosa: hilaris mansit aeger integra die: nox quoque pacata erat: sed tertia die mane priora redeunt mala, vehementissimi denuo dolores colici, delirium, furor, oculi scintillantes, sanguine suffossi, dein rigor totius corporis, quem denique somnus et sudor copiosus exceperunt.

Altera die aeger, praeterquam quod valde debilis esset, bene se habuit, pulsu pacato, tardo, molli. Metuere coepi aegro, ne novus eum tolleretur insultus, ad cuius vim coercendam extemplo porrexi corticem peruvianum ad unciam unam cum drachma rhei et salis polychresti drachmis duabus apyrexiae tempore absumendum:

Ingruit tertia nocte anticipans paroxysmus multo nunc lenior: frigus leve, dein aliqui dolores colici, brevi sudor cum som-

no, nullum delirium, nullus corporis rigor, nulla nervorum affectio praeter colicos dolores. Brevi pacatus paroxismus. Nulla amplius febris: idem datur medicamentum per 8. adhuc dies, dosi sensim minori. Liber omni morbo hucusque vivi sanissimus.

Febres
remit-
tentes

In plurimis remittentibus cephalalgia vehemens aderat cum pulsuum duritie, quae simul inordinate celeriterque subsiliebat etiam remissionis tempore: quidam eorum de laterum doloribus coquerebantur tussientes cum sputo pituitoso, tenaci, sanguineis quandoque striis intersperso.

In hujuscemodi aegris venaesectio una vel altera mitigavit morbi vehementiam continuato deinde salinorum et eccopropticorum usu febris magis magisque remisit apyrexiam fecit plenior, tandemque intermitem abiit intermittentem, urina a septima die modo lateritia. Die plerumque undecima febris extirpata penitus, gaudente nunc aegro meliori, quam unquam prius sanitate.

Eadem verò febris minus caute tractata exacerbabatur vehementius, haemorrhagiis variis, pulsu viribusque collabentibus, delirio feroci cum dissolutione gangraenosa, et petechiis, atque mors paulo post ut plurimum pulsabat ad fores.

Praeter has febres inflammatorio sabur-^{Febris}rales vera febris putrida plurimos corripuit ^{putrida}et in civitate et ruri, ita ut consilium auli-^{epide-}cum facultatem medicam hac super epide-^{mica}mia consuleret.

Quos ego sanandos habui, per aliquot dies dedolationem patiebantur, nullius cibi appetentes, ore non amaro, cum pulsu molli, celeri, facie livida, oculis tristibus caliginosis, per 3. 4. pluresve dies lassi circumeuntes, consueto tamen labore fungentes: tandem dedolatio indies accrescens aegros lecto affixit. Horripilationem per aliquot dies senserunt fugacem, horror dein major per tres quatuorve horas et ultra duravit, quem calor excepit minus vehemens: imo prima integra die, etsi naturaliter se calere sentirent, attamen manum non nudabant tegmine, quin frigescere reinciperent; nulla querela, nisi de dedolatione maxima:

caput erat obtusum; dormituriens vigilabant continuo, oculis magis magisque caliginantibus aequae ac facie contracta, ita ut tristes, morosi, imo profunde meditari viderentur, animo interim ad stupiditatem usque tranquillo: Sitiebant ore sicco, non multum amaro, lingua erat pura, in medio flavo griseo muco obducta, pectus liberum, quandoque anxiosa respiratio per aliquot horas durans, dein sponte liberior, hypochondria mollia, alvus naturalis, pulsus celeres, molles, flaccidi: cutis tangentem urebat eo acrius, quo diutius attingebatur.

Petechiae copiosae latae livescentes toto corpore secunda, tertia, quarta die erumpebant: oculi rubicundiores, caput obtusum magis, delirium leve, mutum, pulsus celeres, molles, flaccidi. Tertia, quarta, quinta die plurimos haemorrhagia narium consolabatur, unde caput liberius, oculi magis naturales.

Die quinta, sexta, et septima alvus fiebat dyarrrhaeica cum levamine: die denique septima urina hucusque cruda et limpida turbari coepta, tandem deposuit sedimentum albo rubrum, madebat arida huc-

usque cutis, ingensque illius humide nunc et aequaliter perspirantis ardor erat remissior.

Petechiae a quinta die rubicundiores, jam pallidiores, minores volumine, numeroque pauciores, posteaquam cutis coepisset madescere, tandem evanuerunt omnino, alvo adhuc manente dyarrrhaeica.

Durarunt criticae hae evacuationes ad nonam usque diem: cum febris a septima magis mitigata, omnino abiret: pulsus nunc elati aequaliter, tarde micabant, caput erat liberum, hilaris animus ob elongatam mortem, appetitus rediit.

Morbus hic tam atrox tamque periculosus tum felicissime crisin perfectam attingebat, cum sibi fere soli relictus, nullis a medico adjumentis perturbaretur; e contra in horrenda erupit symptomata, in deliria, furores, subsultus, meteorismum, gangraenamque lethalem, cum medela sic dicta antiseptica, adstringente et stimulante febris orgasmo sanguinis excitato augeretur.

Cum primae viae ab initio sat purae essent, et acrimonia febrim hanc excitans

po-

potius in sanguine latere videretur, dedi statim ab initio decoctum lenè diluens cum acido grato vegetabili. Plurimis dedi decoctum hordei cum aceto rubi idæi: isthoc decoctum continuavi indies abdomine molli, pulsu molli, nec nimium celeri, nec omnino vacuo. Hinc nil credidi mutandum esse; cephalalgiam, dedolationem, anxietatem febrili motui, qui hac ratione acre morbosum subigeret, tribui; adstantibus, qui aegrum neglectum existimabant, ad unum quodque symptoma proprium remedium frustra petentibus.

Orta vel narium vel alia hæmorrhagia, prioribus acquievi; nec poenituit: cephalalgiam enim, somnolentiam, et delirium inde mitescere, et oculos hucusque tortuosos in naturalem redire statum, cum gaudio vidi.

Accedente dyarrhaea, nil iterum in medicamentis novi; quâmdiu vires sufficientes, febris ordinata, moderate procedens, pulsusque aequalis regularis id mihi suadere videbantur.

Post septimam vero diem, cum urina turbidior, alvus dyarrhaeica, mador cutis,

ejusque minor aestus imminensem crisin indicarent, vitaeque vires post tot dierum turbas vacillare viderem, pulsu jam debiliore, celeriori, saepe et inaequali, dedi ad vires refocillandas mixturam ex drachmis duabus extracti corticis cum granis quatuor, sex, vel decem camphorae. Hoc medio criticae evacuationes per alvum, urinam et cutis poros tam abunde, tam subito exonerabantur, ut circa nonam diem morbus perfectae sanitati locum faceret; et, quod mireris, reconvalescentium vires mea ipsius opinione celerius recuperarentur.

Morbushic petechialis nil commune habuit cum febre stationaria; nec ab aëris constitutione sicca et aquilonari putrida dissolutio repeti potest: tantum enim abest, ut eam producat, ut potius infringat praesentem: inde forsitan fluit benignus ipsius decursus, cum sibi relictus adjutrice manu vix indigeret. Unde ergo hoc tempore febris illa petechialis?

Pars exercitus imperialis e bello turcico jam redit in Austriam: milites morbis putridis castrensibus affecti in angustis rusticorum tuguriis decumbunt; occumbunt.

Su-

Subito corrumpitur atmosphaera ab exhalationibus, quae in cubiculis alioquin clausis calidis, humidisque nascentes, germen suum in corpora ad contagium disposita circumvehunt.

Accedit, quod aër frigidior complures etiam civium non sineret domo egredi; hinc ubi res angusta domi, et quorum cubicula sordida exhalationibus fornacis, coctionis, ciborum, hominum, liberorumque perpetuo inficiuntur, facillime febris utut benigna in putridam declinabat, nec rara erat in adstantes contagii propagatio.

Sola vero fenestrarum apertura, sola corporis procurata munditie, febris haec extemplo mitigabatur, et e corpore, licet horrido petechiis, paucorum dierum decursu feliciter nondicam pellebatur, sed quasi sponte discedebat, modo arssinistra naturae conatum non cohiberet.

In nosocomium admiseramus 30. focminas, viros 18. Morbis acutis laborarunt 18 foeminae, viri 14. Mortui sunt inde tres, hinc obiit decimus sextus.

Genius morborum acutorum acre bilio- Genius acuto- rum in nosoco- mio.
 pituitosum fuit, phlogosi levi junctum:
 iculosius decumbentes persaepe et pete-
 is corripiebantur.

Cephalalgia multos, tussis et pectoris
 pressionem afflixerunt plures: hos exan-
 tema et sputum glutinosum, illos libera-
 haemorrhagia narium.

Quidam e capite simul et pectore dole-
 ant, phlogosi cum petechiis simul prae-
 sentibus, ut, quid ageres primo, aut quod-
 am malorum urgentius medelam posceret,
 scires.

Adolescentulus 13. annorum 11 Apr.
 calore et calore alternantibus affectus de
 cephalalgia vehementi conqueritur; adest
 simul tussis et pectoris oppressio, pulsus
 terim celer, mollis, elatus.

12. Apr. Perdurant haec omnia cum
 incremento.

13. — In nosocomium adducitur: ce-
 phalalgia vehemens, debilitas virium magna,
 petechiae hinc inde in corpore, oculi ru-
 ben-

bentes, oppressio pectoris, respiratio difficillima, pulsus celer, vibrans, elatus, lingua humida, laevi muco obducta, oris sa-
por pastaceus, hypochondria mollia.

Instituatur venaesectio unciarum 8. ad conciliandam aliquam vasorum depletionem: cruor laete rubicundustenuis, serum a levissima cruoris agitatione rubellum. Cephalalgia statim minor, faciliorque respiratio. Juxta Baglivium initio purgare nonnulla urgente primarum viarum impuritate hinc nonnisi decoctum hordei cum acetate dedi.

14. Calor, obtusus capitis dolor, tinnitus aurium, oppressio: pulsus frequens, celer, vibrans. Do ipsi libras duas infusum ex drachma florum arnicae, et simul pro potu decoctum hordei: nocte sudat: alvum bis habet per diem, urina cruda est, petechiae livescunt.

15. Tinnitus aurium aliquanto major, res, tussis sicca frequens dolens; oppressio pectoris continua; pulsus mollis, undosus, celer; sudor ad meridiem usque abdomen molle, indolensque: idem, quod heri medicamentum. ab-

16. Cephalagia magna cum tinnitu, aurium mutum, oppressio pectoris et tussis minor, pulsus et alvus ut heri. Sumit die infusum ex drachmis duabus florum cae paratum, simulque camphorae drachmen dimidiam in mucilagine gummi arabici. Vesperi et noctu sudor, nox cum somno.

17. Sudor et alvus bis deposita coe, delirium minutum, pulsus tardior.

18. Delirium nullum, urina biliosa, caecula, sopor.

19. Cephalalgia vehemens, tinnitus aurium, delirium, tussis rara, alvus semel, praeter medicamenta vesicans ad catharam applicatur.

20. Cephalagia eadem, etsi vesicans bene operatum esset: oppressio simul pectoris magna, vox rauca, tussis, laxitas universalis, pallida labia, oculi concavi, lingua flavicans clara, alvus semel: interim pulsus elatus, tardus, mollis.

Die nunc critica imminente, certus, quod materia morbosa caput praeprimis atque

que pectus occuparet, fors naturae viri
non facile amovenda, cum febris aestus
ferbuisset, dedi vigesima aquam laxativam
ex sale medio et manna paratam, seponi
ulterioem camphorae usum: alvus inde
xior orta, cum capitis pectorisque levami

21. Alvus noctu ter copiosa,
cta; urina sedimentum albo flavum depoi
pulsus naturalis est, raucedo minor, pe
chiaie dilabuntur.

Sanitas nunc indies confirmatur magis
debilitasque virium, morbi furore va
fractarum, decocto corticis restauratur. I
28 integre restitutus aeger e nosocomio
missus est.

Eadem die eodem fere morbo affligi
vir quadragenarius. Cephalalgia maxim
oppressio, sitis, pulsus celer, mollis
brans: lingua albo muco copioso obduct
os amarum. Dedi ipsi purgans; alvus
de laxa decies quater et ultra absque lev
mine cephalalgiae, gustu tamen emenda
Quarta die febris, oppressio, cephalalg
sine intermissione desaeviunt, dolore cap
tis profundiores frontis partes jam occupa
te

pulsus celer accelerans, undulatorius: tu in somno perturbato orta haemorrhagia, exstillantibus e nare sinistra libris duabus sanguinis cum magno levamine, nox tranquilla. Vigesima quinta mane ex eadem iterum haemorrhagia ad libram unam: pulsus deinde tardus, mollis, nulla amplius compressio pectoris, caputque liberrimum.

Decima sexta. Quam primum aeger amillum morbi fomitem una cum sanguine narem ejecisset, citissime sanitati restitutus abiit.

Id vero, quod morbum constitutionalem huius mensis in nosocomio genuit, peculiare genus febris inflammatorio putridae cum exanthemate morbilloso cognitum est. Febris inflammatorio putrida cum exanthemate morbilloso
 Huius sequior huic morbo praeprimis obnoxius fuit, seniores autem minus juniores.

Non dissimilem illi: I. B. de Störck eodem mense observavit anno 1760. multo tantum praesenti mitiorem. Eundemque Huxhamus mense Aprili anni 1734 observatum descripsitque reliquit: unicum inter eos videtur discrimen, quod hic noster an-

tequam finem attingeret plenarium, d
ret diutius.

Loco descriptionis generalis quasc
adducam historias.

Puella sana alias, beneque menstrua
15. annorum ab initio Aprilis minus bene
luit: a quarta nunc horripilatione nunc
lore indies coepit affligi eum dolore fa
um, laterisque punctorio. Per tres ad
dies domi manet nil praeter infusum aliq
theatum usurpans.

7. Apr. 3tia. nimirum morbi die mede
rogat: febris erat vehemens dolor lat
dextri cum tussi sicca dolente, partes orig
terioris inflammatae, lingua simul albo
vo muco defaedata: extrahuntur unciae
sanguinis, brevi crustam phlogisticam d
sam efformantes: purgatur octies alvo.

8 — 4, Nullum levamen: repetitur
nae sectio: sanguis vero non amplius p
gisticus est, laete rubens facilis dissec
levamen inde doloris lateris, facilior
glutitio, minor tussis.

9 — 5. Post noctem tranquillam sudor,
angina eadem, auditus difficilis, tussis mi-
s dolens, alvus fluida,

10 — 6. Facies rubet, oculi rubri, hu-
di, mador cutis continuus, auditus ves-
ri difficilior, sopor.

11 — 7. Maculae rubelae, latae pertor-
m corpus diffusae, vox rauca, ardet cu-
, alvus manet fluida. Sumpserat hucusque
coctum hordei cum oximelle: hodie do-
busum florum arnicae, qui virtute resol-
nte, leniterque antiseptica in omni feбри-
bilioso putridarum et exanthematica-
n genere medicamentis omnibus ante-
lunt.

12. — 8. Angina nulla amplius, sed
x rauca, cutis erysipelatoze rubens cum
stulis morbillosis latis livescentibus: so-
r, caput vertiginosum, respiratio bona,
gua flavo muco in medio inquinata.

13. — 9. Subdelirium, pulsus celer,
illis, elatus digitos feriens, citoque se
mtrahens media in diastole. Ad depel-
ndam funestam e cerebro depositionem,
ap-

applicata fuere synapismata pedibus, v
cansque nuchae: camphorae drachma se
simul exhibita.

14.—10. Virium major dejectio: h
dedi decoctum corticis una cum infuso
rum arnicae, atque camphorae drachm
semis.

15.—11. Sicca cutis, marmorea, color
densque; lingua arida, petechiae hinc in
foetidum corpus, respiratio cita abdom
lis: eadem medicamenta: alvus hucus
quotidie bis, terve.

16.—12. Sudor levans, pulsus
tior, cutis aequalius rubicunda.

17.—13. Sudor idem foetidus, leva
sopor minor, delirium nullum, oculi
vidiores.

18.—14. Pulsus tardior, elevatis
mollis; sibilus in respiratione, tussis den

19.—15. Mentis integre compos aeg
ast debilis de siti, de respiratione diffi
de cephalalgia conqueritur: urina cru

venus semper aperta, pulsus elatus, minus
celer. Continuatis medicamentis madet
continuo cutis, et minus rubet.

20.—16. Eadem, quae heri; petechiae
tranescunt.

21.—17. Nox tranquilla cum sudore,
pulsus fere naturalis, mollis, elatus, tardus;
color cutis in naturalem vergens: urina
mane cum sedimento largo ex albo flaves-
cente,

22.—18. Si raucedinem et debilitatem
ceperis, bene se habet aegra: urina albo
vescens: nec datur nisi decoctum corticis.

23.—19. Urina mane cum eneoremate:
empto purgante salino purgavit octies:
pulsus mane tardus, vesperi celerior, pa-
m strictus: tussis sicca, vox rauca: idem
decoctum corticis.

25.—21. Sputa nunc commode pro-
unt purulenta, facili et rariore tussi: su-
per lac cum decocto corticis, et ad facili-
tudinem puris exitum vapores aquae calidae
exhalat.

27 — 23. Copiosus facilisque puris e-
tus adminiculo tussis, vox minus rau-
Appetit valde aegra, nunc bene valens: v-
peri nulla febris.

Sic in sputis ejiciendis ad primam usq-
Maji assidua, et vires et pristinam sani-
tem recuperavit, eamque adeo florentem,
sexta Maji perfecte sana nosocomio va-
diceret.

En in una eademque aegra scarlatina
morbillosum exanthema, et petechias,
phalitidem, anginam, peripneumonia
mala certe, quorum alia multa ab aliis alie
videntur, nisi acre quoddam putridum
culiare, sanguini immixtum admittas, qu-
irritando vasa cutis, encephali, fauciu-
pulmonumque singulas has inflammave-
partes, pustulisque sui generis imbuer-
cum petechiae simul ab imminuta sangui-
densitate oborirentur. Veram in pulmo-
bus et faucibus fuisse inflammationem,
monstravit pus, quod per excreatione
et ope tussis exivit. An ulcus formatum
erit, latet: quid si lymphæ coagulabilis,
bronchiis quiete restitans in pus dege-
rasset?

Ejus

Ejusdem generis, at decursus diversi notabilis alius fuit foeminae morbus.

Puella 18 annorum, succosa, at duobus mensibus non menstruata, tussi corripitur sicca, et pectoris oppressione: venae sectione crustaceus educitur sanguis. Altera die 18. Apr. mox horripilare coepit, mox calere; tussis continua, dolens, sicca; respiratio difficilis, vox rauca. Durant haec per septem dies continuos, ore simul amaro, lingua in fundo flava, urina fusca, vehementique dolore sincipitis. Pulsus primis 5 diebus celer, durus, tensus: sexta die mollior, celeritate et magnitudine inaequaiter remittens. A binis venae sectionibus cruor minus spissus cum crusta tenaci corrugata: ab aqua emetica vomitus glutinosus aeruginosus.

Post septimam diem horripilatio hucusque durans cessat: manifestiores sunt febris remissiones, sed tussis continua, sicca, dolentissima; respiratio difficilissima, orthopnaeica, vox nulla, inordinati viscerum tumultus, subsultus, crampi, tensiones.

Decocto hordei cum cremore tartari e manna indies exhibito alvus bis vel ter per nitchemerum promota, sitisque fuit extincta. Ab octava die camphora simul datur largiori dosi, pro majori nervorum spasmo. a granis quatuor ad drachmam dimidiam vesicantium item inter scapulas et ad suras applicatio, atque ulcerum suppuratio.

Decima sexta sudor et somnus cum levamine: 17^{ma} morbillosum cum sudore pertectum corpus erumpens exanthema; cephalalgia cum nervorum distensionibus imminuta.

Perdurat sudor ad 24^{ta} una cum exanthemate fere continuus, calore moderatiori, pulsu aequali, elato, tardo: urina promissudoris diebus cum eneoremate, 21^{ma} sedimentum copiosum lateritium deponit. Eadem die tussis hucusque sicca et doletissima humido temperatur sputo tenaciglutinoso: 22^{da} vomituritione, adjuta emetico, glutinosa ejicitur pituita; sputum incoherenter liberius. compiosius, verum pus igne et immersione probatum: vox tamen continuerauca: 23^{tia} exanthema sensim minus: 24^{ta} effluxit integre cum desquamatione cutis.

Expuitio puruleta durat adhuc per 14 dies, vox deinde paulatim evadit clarior, decubitus in sinistrum latus hucusque impossibilis jam facilis; vires et caro, violentia morbi valde consumptae, brevi restituuntur, appetitu ad nutrimenta indesinenter invitante, ita ut medio Majo optime valens et colorata ad suos rediret.

Medicamentorum inde ab eruptione morbillosa nulla fuit facta mutatio; continuavi lenia eccoprotica diluentia salina: lecoctum nempe hordei cum arcano, nanna, vel cremore tartari. Composito nervorum tumultu, et erectis naturae viribus, amphoram seposui. Ad expectorationem ero promovendam, et ventriculum a puere deglutito purgandum, granum tartari emetici copiosa dilutum aqua per diem exhibui, unde purulentum tenaxque gluten citius expuebatur, quo magis facilitabatur concussio. Curam clausit serum lactis, quod ad duas usque mensuras per diem strepue potatum fuit.

Nemo est, qui summam hujus aegrae pulmonum inflammationem in suppurationem abiisse non perspiciat; Verum ad peculiare

liare quoddam genus systematum hunc morbum referre difficile est.

Febris erat continua remittens: inflammatoria diathesis praecipuam quidem merebatur attentionem; sed conjunctum ipsi venenum acre erat ejusmodi, ut cura non nisi ad inflammationem directa certo certius aegram abripuisset. Idem acre pulmones, idem laryngem, idem et cutem inflammaverat, idem et nervos summo cum vitae periculo constrinxerat, idem denique continuata per 20 dies naturae opera per purulenta sputorum involucra, per vomitus, et copiosissimam sudoris excretionem e corpore penitus fuit eliminatum.

Miranda sane et inperscrutabilis natura legis circa dies criticos semel statutae observantissima! dies 4. 7. 17. 21. hujus morbi vere judicatorii fuerunt, et critici.

Hinc non possum ex scriptis non adducere quasdam aegrotorum historias, qui eodem hoc mense, eodem morbo laborantes, ad unum omnes eandem naturae operam eandemque legis observantiam attestantur.

Puella 23 annorum florida hucusque sana.

22 Apr. mane inhorruit, incaluit, febricitavit tota die, noctu sudavit.

23 Apr. 2. morbi die: Iterum mane horror, calor per diem, noctu sudor: sumit decoctum hordei cum arcani duplicati rachmis duabus.

24 — 3. Eadem: simul oppressio pectoris, tussis, cephalalgia, lingua impura, flavo muco defoedata, pulsus celer, constrictus.

25 — 4. Febris iterum ut heri, rubor faciei, magna pectoris oppressio; venae-ectio: continuantur priora medicamenta; urina mane sedimentum lateritium deponit.

26 — 5. Eadem; alvus quinquies.

27 — 6. Eadem: pulsus hodie mollis, indulosus celer, sputa globulosa, duriuscula, sanguine striata, alvus bis, urina mane cum sedimento rubello.

28 — 7. Febris eadem, haemorrhagia arium copiosa cum levamine cephalalgiae,
et

et febris, sputum glutinosum cum intermixto sanguine, urina cum denso eneorematu in fundo.

29 — 8. Nullus horror amplius, febris continua, cutis continuo transpirans, urina straminea, os pastaceum, pulsus celer, mollis, elatus.

30 — 9. Pustulae morbillosae in facie, pectore, brachiis, et toto corpore prurientes; sudor, pulsus minus celer, calor minor, dolor abdominis.

1. Maji, 10. Pustulae augentur, pruritus est molestior, lingua purior et humida; pulsus fere naturalis, mollis, calor sitisque minor, alvus et hodie bis. Continuat decoctum hordei cum oxymelle, arcano duplicato seposito.

2. — 11 Exanthema minuitur; lingua impura est.

3. — 12. Alvus per duos dies constipata, lingua impura, et flavo albo muco obducta, pulsus celer mollis: sumit unciam salis anglicani in libra semis aquae fontanae

ae, unde decies quinquies alvum deponit
aliosam coctam; urina intense rubet.

4.—13. Pulsus pacatus, naturalis; exan-
thema nullum amplius, sed tussis iterum
magna; sicca: lingua eadem, uteri, mu-
co obsessa, urina intense rubra, alvus ad
esperum ter cocta.

5.—14. Sudor levis, lingua pura, tus-
is pauca, pulsus minus celer, mollis, uri-
a jamentosa cum sedimento lateritio.

6.—15. Pulsus naturalis, nulla febris,
urina mane cum sedimento copioso, appe-
tus redit.

7.—16. Pulsus naturalis, urina ut he-
i, pustulae nullae amplius.

8.—17. Nulla febris, urina iterum cum
sedimento lateritio, sudor noctu.

9.—18. Sal anglicanum ad unciam
nam in aqua fontana, unde decies alvus
um optimo levamine.

10.—19. Urina naturalis, sanitas integra, appetitus magnus.— Mansit sanis viribusque brevi restitutus sana dimissa est

Primis 7 diebus febris quotidiana intermittens subcontinua, tussis non multo oppressio, et cephalalgia: die quarta rubor faciei cum sedimentosa urina, nullum tamen iudicium; sexta sputum striatum septima haemorrhagia narium levans, nullum tamen iudicium, imo inde ab eadem die febris continua: Nona pustulae morbillosae, levantes malum, ast incerti adhuc iudicii, quae 11^{ma} imminutae, 13^{ta} disparuerunt. 14^{ta} vera crisis, urina inde per 4 dies continuos lateritia cum levi sudore, et febris integri pacata.

Medicina huic aegrae data, ut ut speciosa pauca, re tamen fuit egregia, etsi tumultuariae nihil actum sit. Pituita enim tenax cum acri exanthematico febris causa salinis medicamentis incisa, per alvumeducta fuit.

Salinis medicamentis initio natura ad pituitam tenacem incidendam, evacuandamque adjuncta, diluenti deinde saponaceo

po-

tu acre involutum fuit, et dissolutum; gente orgasmo quarta morbi die sanguis tractus est, spontanea deinde naturae opera ulteriorem venaesectionem reddidit pervacuam. Eruptione exanthematis factus suspensus est salinorum usus, ne irrita ventriculo et intestinorum tractu eruptio spontanea turbaretur. Ast vix biduo interruptus eorum usus repetendus erat, lingua pura, ore fatuo, alvo constipata id praeribentibus. Eadem haec salia copiose exhibebantur ad alvum purgandam. Die plenni 17^{ma} exantlata, omnis nunc cocta morbi materies per vias quacunque apertas excreta erat: tussis, ferox utique et molestum symptoma, proprium sibi non poscebat remedium: salina, saponacea et diluentia hic optima fuere beehica.

Puella 22 annorum 20 Apr. oppressio pectoris dolore cum horrore et calore alternantibus afficitur simul et dedolatoria artuum lassitudine.

21 Apr. 2^{da} nimirum morbi die secatur vena, sanguis est crustaceus, oppressio minuitur; febris vero continuat, os sinuul pastaceum est, noctu sudat.

22.—3. Eadem ut heri: horror iterum et calor alternantur; cephalaea, os pastaceum, tussis et oppressio molesta sunt: venaesectio fit, iterum sanguis est crustaceus, noctu sudat.

23.—4. Nullum levamen, febris eadem sumit hodie aquam laxativam, unde septies alvus; calor, sudorque noctu.

24.—5. In nosocomium deducitur: febris remittens, horror idem cum calore, dolor pectoris in inspiratione major, lingua muco flavo spurca, pulsus celer, compressus: iteratur venaesectio, sanguis crustaceus; cataplasma pectori applicatur, decoctum hordei cum oxymelle.

25.—6. Horrori cessanti calor succedit continuus, humidus; respiratio dolens, tussis: venaesectio iterum, et aqua laxativa.

26.—7. Dolor minor, pulsus celer elatus mollis, febris continua. Decoctum hordei cum aceto.

27.—8. Respiratio anxiosa, cephalaea, febris remittens: mane pulsus tardior, ves-

pe-

ri celer cum febris, tussi et dolore pectoris. Decoctum hordei cum aceto.

28.—9. Eadem.

29.—10. Pervigilium, anxietas permanens, pallor faciei, oculi tristes, cephalaea.

30.—11. Eadem: noctu sudor.

1. Maji 12. Facies et oculi lucidiores: spiratio, tussis, cephalaea eadem, uti pervigilium.

2.—13. Eadem.

3.—14. Pulsus celer, inaequalis, inordinatus, sed sat elatus; oculi turbidi, tristes, tussis rarior, anxietas magna: noctu exanthema erumpit morbilliosum cum sudore.

4.—15. Pulsus mollis, parum elatus, elerrimus 124 ictuum in uno minuto: eruptio adhuc copiosior, cephalaea nulla, nec anxietas, nec tussis, sed oculus dexter san-

sanguine suffusus, urina fusca, sudor continuus, facies hilarior.

5.—16. Sudor continuus, exanthema minus, pulsus tardior, mollis, elatus, na fusca cum eneoremate.

6.—17. Exanthema nullum amplius, pulsus et oculi naturales.

7.—18. Eadem: urina ruberrima.

8.—19. Bene est: pulsus 86. ictus mollis, naturalis, os pastaceum.

9.—20. Aqua laxativa, unde alvus octies.

10.—21. Urina cum sedimento lateritio densissimo, febris nulla: optime se habet aegra, appetit: post 8 dies dimittitur.

Hujus aegrae morbus erat peripneumonia febris remittenti juncta: unde facile erit concludere, non esse inflammationem puram sed tum cruditatem primarum viarum, tum aliud simul adesse peculiare quoddam acutius, fors praecipuam hujus morbi causam. U

gens

ens quidem pulmonum inflammatio pro-
iam certe sibi poscebat medelam anti-
alogisticam. Sanguinem educere oport-
bat crustaceum, ne suppuratio, vel lethas
pulmonum gangraena oriretur.

Sed et ad alia simul respectus mihi ha-
endus, et naturae viribus, quantum po-
ui parcendum fuit. Sexta die initium fe-
bris continuae; ad decimam quartam us-
que varia naturae molimina spem inter et
metum circa exitum: interim naturales
unctiones continuo bonae. Decima quar-
ta maximus timor mali exitus: oculi tristes,
pulsusque vacillans infelicitate certe erant au-
rarii: ast et in ipsa vacillatione pulsus ela-
to aegram viribus adhuc valentem affirma-
bat, ita, ut nervorum tumultum ad omnia
symptomata maxime contulisse crediderim.

Hinc etiam nihil dedi ex stimulantium
classe, sed solum decoctum hordei conti-
nuavi, nimirum: ne operam naturae tur-
barem. Nocte decima quarta dein critica
morbillosum exanthema et cum eo sudor,
faciei hilaritas, pulsum naturalis decur-
sus, febris abactio iudicium meum confir-
marunt.

In-

Interim morbus nondum integre subatus fuit. Vigesima demum nocte urinae sordimento lateritio cardinalis sanguinis depuratio, et integra perfecta ultimaque crisis et hanc voloci pedē subsequebatur sanatio.

Mortui hoc mense in civitate 1542.

Barom.			Therm.		Venti.		
series.	alti.	med.	gradus medius.		mane.	meridie.	vesperi.
	dig.	lin.	+	o			
1	27	9	+	13 ² ₃	o	o	o
2	27	8 ¹ ₂	+	14 ² ₄	O. p.	o	o
3	27	8 ¹ ₃	+	14 ³ ₄	S.S.O.p	S.S.O.p.	o
4	27	8 ¹ ₂	+	16	o	o	o
5	27	8 ¹ ₂	+	15 ¹ ₂	o	o	W. p.
6	27	6 ¹ ₂	+	14 ¹ ₂	o	o	o
7	27	5 ¹ ₂	+	12 ¹ ₂	o	S. p.	o
8	27	6 ¹ ₂	+	10 ¹ ₂	o	o	o
9	27	8	+	11 ¹ ₂	o	W. p.	W. m.
10	27	10	+	12	o	o	o
11	27	9 ¹ ₂	+	10 ¹ ₂	o	o	N. p.
12	27	9 ¹ ₂	+	12 ¹ ₂	o	N. p.	N. p.
13	27	9 ¹ ₂	+	13	o	o	o
14	27	9 ¹ ₂	+	13 ¹ ₂	o	o	o
15	27	9 ¹ ₂	+	12 ¹ ₂	o	o	o
16	27	9	+	14 ¹ ₂	N.O.p.	N.O. p.	N.O.p.
17	27	9	+	15 ¹ ₂	o	o	o
18	27	8 ¹ ₂	+	16	o	o	o
19	27	8 ¹ ₂	+	14 ¹ ₂	o	o	o
20	27	8	+	12 ¹ ₂	o	o	o
21	27	9 ¹ ₂	+	14 ¹ ₂	o	o	W. f.
22	27	10 ¹ ₂	+	17 ¹ ₂	N. p.	N. p.	o
23	27	10 ¹ ₂	+	10 ¹ ₂	o	o	o
24	27	10 ¹ ₂	+	11 ¹ ₂	o	o	o
25	27	10 ¹ ₂	+	17 ¹ ₂	o	o	o
26	27	10 ¹ ₂	+	19	o	S. m.	S. p.
27	27	10 ¹ ₂	+	18	S. p.	S. p.	—
28	27	10	+	20	—	—	o
29	27	10	+	17	o	o	N. p.
30	27	10	+	16 ¹ ₂	N. p.	o	o
31	27	10 ¹ ₂	+	16 ¹ ₂	o	o	N. p.

Die 27 altitudo max. = 27 dig. 14¹₂ lin.

Die 7 altitudo minima = 27 dig. 5¹₂ lin."

Differ. = 0 — 5¹₂ lin.

Die 28 calor max. = + 0 22 grad.

Die 11 calor minimus = + 0 8 grad.

Differ. = + 0 14 grad.

G

In

In nosocomium suscepti sunt 45 aegri.
Ex his reconvalescerunt 42, mortui sunt
obiit ergo decimusquintus.

Ex susceptis aegris 30 acutis, reliqui
aut chronicis aut chirurgicis morbis labora-
rarunt.

Acutorum 10 pleuritide affecti fuerunt
8 nimirum foeminae, et vir pleuritide
pura inflammatoria, unica vero foemina pleu-
ritide pituitosa.

Febri remittente laborarunt 19: foeminae
videlicet 4, et vir inflammatorio bilioso
2 foeminae et vir bilioso pituitosa;
viri 4 et 2 foeminae quotidiana simplici
febri denique pituitosa 4 foeminae et vir.

Ex reliquis phthisi scrophulosa foeminae
phthisi pulmonali vir et foemina, abscessus
mesenterii vir unus, sorbuto duo, scorbuto
et scabie foemina, erysipelate foeminae
vir arthritide, foemina fluore albuginis
foeminae et vir scabie, vir alius quatuor
tana, alius febri depascente atrophica labora-
rarunt. Sic viri 19 et foeminae 26 huius
mense nosocomium salutarunt.

Pleu-

Pleuriticorum plerique e latere dextro do-^{Pleuris}
 uere: pulsus erat durus, contractus, celer, ^{tis}
 et sanguinem venae sectione extractum crusta
 agebat contracta; respiratio erat difficilis
 colens, dolor lateris ut plurimum exten-
 sior, externo tactu auctus, ita ut latentis
 rheumatici cujusdam acris suspicio mihi ve-
 niret in mentem, nec sine ratione in multis,
 uorum scilicet morbus a refrigerio traher-
 at originem: in aliis pituitosum acre et il-
 lisit medico, simul et totum non raro mor-
 bum peperit.

A venae sectione optimum et efficacis-
 simum levamen oriebatur: hac rite adminis-
 trata et reiterata pro virium morbique con-
 ditione, reliqua medela facilis erat. Imo
 versaepe ne ullis quidem praeterea pharma-
 cis indiguerunt aegri, modo strenue bibe-
 rent potum tepidum emollientem.

In nosocomio decoctum salep generale
 ejus morbi fuit antidoton, sub ejus usu
 morbus paulatim imminuebatur, sputo coc-
 co et copioso excreto.

In binis aegris febris in remittentem, ter-
 tiaeque die in intermittentem tertianam abi-

vit. Inflammatione sedata, acre pituitosus
incidentibus salinis solvi et evacuavi, qu
facto morbus omnis sponte sanitati locu
fecit.

Puella a bimestri menstruis carens no
gravida, diuque valetudinaria, tussitans,
macilenta 1. Maji dolet e latere dextro cui
tussi continua, sicca, dolente, et pector
oppressione; pulsu celeri duro: statim v
na secatur, et decoctum salep exhibetur t
pidum; superficies sanguinis corio simil
est, inde levamen, ast tussis continua
reiteratur venae sectio, dolor abit, tuss
permanet sicca; continuo sumit magnam d
cocti salep copiam ad libras 4 et ultra p
diem; dolor et respirationis difficulta
imo febris evanescunt absque visibili cris
tussis per plures dies durat adhuc, tande
tamen decocto salep pertinaciter contin
ato penitus cessat, ita ut post 17 di
aegra multo quam ante morbum vale
tior ad suos redierit.

Adolescens 23 annorum scabie ant
infectus, qua evanida tussitavit, pector
dolente, sputis primo nullis, dein purule
tis, febricula continua. Quarta Maji sub
ta-

aneae horripilationes, dolor simul pectoris dextrum latus occupat, respiratio nem impedit, manente simul irritamento adussim, quam aeger prae dolore conatur suspendere: potu calido paululum minuitur dolor, sed febris continua. Per 4 dies domi manet aeger, morbi incuriosus; nona Maji in hosocomium adducitur. Pulsus celer, durus, constrictus; facies pallida florentibus genis. Dolor lateris maximus, tussis continua, respiratio cita, dolens: extemplo fit venae sectio: calida emollientia cataplasmata lateri applicantur, interne vasculum calidum decocti salep, cum drachma una nitri proſicthemero, omni hora datur. Sanguis corio ductus est.

10 Maji dolor adhuc, licet minor, talia ut heri; reiteratur venae sectio, lymphae coagulata supra cruorem contracta; melioratio, noctu levis sudor.

11. Nullus amplius dolor, sed non cessat tussis: sputa puriformia; repetuntur edicamenta.

12. Diu noctuque tussis molesta, saepe manans, gena dextra rubet; respiratio difficilis.

cilis, continuantur cataplasmata, et decoctum salep, exhibetur eodem tempore linctus ex gummi arabico,

13. Eadem: oppressio simul in respiratione: rubor genae dextrae; hinc venae sectio adhuc; crusta nulla, sed venae sectione vix facta oppressio omnis evanescit continuatur decoctum salep cum nitro,

Sequentibus diebus indies propior spe salutis, tussis multo minus molesta, rubor genae naturalis.

16. Urina flavicans cum eneoremate,

17. Nulla fere tussis amplius; appetitus valde, hinc carnes datae.

20. Optime se habet aeger.

27. Sanus discedit macie multum minuta

Idem morbi decursus et eadem sanatio reliquorum pleuriticorum fuit. In binis vero phlogosi, laterisque dolore per venae sectiones et emollientia sedatis, sexta morbi die propullularunt remittentis gastricae symptomata.

Lingua albo et flavicante mucō faeda,
 a pastaceum, febris post accessum remit-
 tens, quae in altero aegro in intermittentem
 tertianam degeneravit; urina lateritia, pul-
 sus celer, mollis.

His in aegris pituitam bilemque primas
 manifestare vias palam fuit, quae morbo inflam-
 matorio sedato proprium sibi et consuetum
 febris genus progenuerunt. Facillima hic
 sanitatio. Seposito enim emollientium
 apparatu, mox drachmas duas arcani dupli-
 cati, et salis ammoniaci drachmam unam
 exhibui per diem, dedique pro potu deco-
 ctum hordei. Alvus inde aliquoties soluta
 est: urina per aliquot adhuc dies sedimen-
 tum lateritium deposuit, febris impetus sen-
 tim debilitatus, octava die non rediit am-
 pliùs, sanitate integre restituta.

Febres remittentes omnes pituitoso bili-
 si generis erant, adjuncta in quibusdam
 inflammatoria diathesi. Quotidianarum re-
 mittentium mitior decursus, nec sinistri omi-
 nis fuerunt symptomata, cephalagiam si
 exceperis, quae omnes hujus mensis remit-
 tentium ordines comitabatur.

Febris
 remit-
 tens pi-
 tuitoso
 biliosa

Lingua in hujusmodi febribus alba
 conspurcata muco, oculi rubicundi, frontis
 et tempora pressorio dolore affecta, neque
 minus cervix: gustus pastaceus, membrum
 fracta; ordinarius febris accessus vespertinus
 saepe et bis per diem; noctu sudor.

Febrim sibi relictam versus septimam
 vel octavam diem sponte sequebatur dysenteria,
 rhaea levans; urina sedimentum deponebat.

Sic sola naturae opera aegri restituebantur;
 Vidique plures per hunc mensem sequebatur
 la medicante natura optime sanatos, ubi nihil
 hil omnino medelae attuleram; nec, praeter
 ter potum theatum, quem sitis aegrorum
 expetierat, quidquam exhibui.

Quosdam vero nec tam mitis nec tam ce-
 ler morbi decursus dimisit. Pro varia enim
 acrimoniae qualitate, et situ, fors et ejus
 quantitate, pro propria demum aegrotantis
 conditione morbi vis, velut aperta Par-
 doriae pîxis, varia graviaque mala evomuit.

Adolescentulus 14. annorum co-
 pit febris remittente affici cum vehementi
 dolore capitis; os erat pastaceum, lingua
 sub-

labalbida: pulsus celer, magnus, calor
vehemens, facies florida, alvus naturalis
per diem, inquietudo, sitis.

Otiosus hic fui spectator, nec exhibui ni-
si decoctum hordei cum oxymelle pro potu.
Tertia die corpus sudore madet cum immi-
nutione caloris; alvus ter nunc dyarrrhaei-
ca, levans; cephalalgia adhuc.

Sexta die haemorrhagia narium copi-
osa cum cephalalgiae imminutione. Vapores
quae tepidae ad emollienda vasorum orifi-
cia, exitumque sanguinis facilitandum nari-
bus admoventur. Inde quotidie per tres dies
haemorrhagia narium, et cephalalgia penitus
minuta. Vigesima quinta Maji sanissi-
mus abiit.

Alter triginta annorum febricitaverat a
decima Maji. Per quatuor dies rediit hor-
ripilatio mane et vesperi; accessit postea
calor, noctu sudor. Post quartam diem
calor continuus, mane remittens: cepha-
lalgia circa frontem et tempora premens,
oculi rubri, lingua albo muco tenuiter ob-
ducta, os pastaceum, pulsus celer, magnus,
alvus naturalis.

Sumit decoctum hordei cum oxymelle primisque diebus arcani duplicati drachmas duas, quo alvus ter exorta dyarrrhaeica, quapropter ulterius ab arcano abstinui. Septima morbi die copiosa narium haemorrhagia cephalalgiam sedavit subito nocte subsequente sudor copiosus cum alvo pultacea copiosa, in urina sedimentum largum lateritium. Octava nulla febris amplius. Citissima sanitatis restitutio.

Febris
prior
cum in-
flam-
matio-
ne.

In aliis quidem febris remittentis character idem, eademque observabantur symptomata, sed vehementius progrediebatur febris, gravioraque sanguinis inflammatio apparebant symptomata.

In his sanguinis detractio summe erat necessaria, adeo ut ea posthabita ob fasum ad acrimoniam biliosam respectum inevitabili aegri fato intricarentur. Phlogosis hic aderat, quae antiphlogistica medela praecipue sanguinis detractioe imminuenda erat, quo facto febris genuinae simplicis remittentis decursum absque ulteriori impedimento persolvebat; et salinis adjunctis remediis, bilem et pituitam et immixturam acrem statis criseos diebus per alvum, urinam,

am, sudoremquē, saepe et per salivam
xpulsabat.

Torosa puella, quae adhuc priori men-
e menstruis gavisa fuerat, per decem dies
omi aegrotavit, horripilatione et calore
lternantibus, tandem morbo succumbens
n nosocomium allata est tertia Maji.

Quotidie horripilatio mane levis, dein
calor continuus per diem, noctu sudor,
mane maximus, quem horror denuo exci-
tit. Facies illi lurida, tristis, auditus
difficilis, magna virium dedolatio, cepha-
lalgia vehemens, pectus anxium dolore op-
pressum, tuſsis sicca, respiratio difficilis,
anxia, abdomen molle, lingua pura, pul-
sus celer, mollis.

Do illi statim infusum florum arnicae
um aceto ac melle, ad resolvendum acre
orbosum, viresque erigendas.

4. Maji. Eadem ut heri, pulsus elatus,
icans, celer. Inflammationem subodora-
ns, venam seco: prosilit sanguis, crustam
evi faciens, cum levamine. Continua-
ur infusum florum arnicae.

5. Dolor capitis minor, sed auditu gravis, susurrus magnus, pectus minus dolens, pulsus celer, elatus, vibrans, durus alvus bis, urina cruda alba. Venam pedis secari jubeo, repeto hesternum medicamentum.

6. Auditus faciliior, caput et pectus libera, nulla tussis: remissiores febris paroxysmi; pulsus elatus, mollis, minus celer: abdomen vero elatum hodie, lingua flavo muco obducta. — Addo infuso florum arnicae drachmas tres arcani duplicati inde per diem alvum quinquies habet biliosam, noctu sudat.

7. Alacris est, nulla febris: cephalalgia noctu vix incommoda. Continuatur infusum florum arnicae.

8. Edomita febris bene se habet: alvus dyarrrhaeica. Hinc do ipsi aquam laxativam ad naturam adjuvandam: Purgatur decies biliosa.

9. Optime se habet, ita ut decima nocte socomio valediceret.

Altera quotidiana duplici laboravit cum cephalalgia, dolore lateris, lingua alba, urina limpida: pulsus durus, compressus, eler. Venaesectione capitis ac lateris dolor lenitur. Continuatur decoctum hordei.

Septima die sudor cum urina lateritia, alvo frequenti pultacea.

Octava: sanitas.

Eodem morbo bini alii laboraverunt, quibus eadem medela exhibita fuit. Nona die, decima septima alter morbo liberatur.

Juvenis 23 annorum eodem morbo multo ^{Febris prior gravior.} gravius conflictatus fuit, nulla vero phlogosi praesente. Hic saepe haemophthysis effectus, et diu tussitans, quarta Maji dolore corripitur, calet, capite obtuso cum edolatione membrorum.

5. Aliquantulo melius se habet.

6. Rursus friget, caletque,

7. Iterum paroxysmus.

9. Febris continua.

10. Vires valde fractae: nullus horror, sed calor vehemens, et caput obtuse dolens. Suscipitur in nosocomium: datur ipsi decoctum hordei.

11. Os pastaceum, lingua alba, facies lurida, oculi rubri, turbidi; cephalalgia, dolor frontis pressorius, pectus anxium, inspiratio difficilis, tussis sicca, abdomen molle, pulsus celer, mollis, elatus. Datur ipsi arcani duplicati drachmas quatuor in decocto hordei; alvus inde ter.

12. Frigus mane leve dein calor vehemens, et sudor: caetera ut heri: alvus bis continuantur medicamenta hesterna.

13. Calor continuus, cephalalgia magna: facies rubicunda, sudor; vesperi frigus, dein iterum calor et sudor: noctu delirium, alvus ter cruda biliosa. Continuantur medicamenta.

14. Maji, II morbi die: Os continuum amarum, subsultus, calor vehemens; cephalalgia, pectorisque oppressorius dolor, respiratio

iratio cita difficilis: alvus ter aquosa: sudor levis: eadem medicamenta: nox innoxia.

15. — 12 Mane frigus leve, deinsudor levis: abdomen elatum, dolens, os amaram: ad mala hesterna accedit delirium: medicamenta priora.

16. 17. 18. 19. Continuo febricitat ager: horripilatione, quae alternis diebus eodem tempore accessionis servat, affligitur mane et vesperi, subsequuntur calor et sudor, a meridie vehementiores: alvus innoxia ter, quater aquosa, biliosa. Symptomata eadem quae prius. A decima octava pulsus vacillat, datur infusum florum camphorae, et decoctum hordei cum arcano replicato.

20 — 17. Febris minuitur: alvus compositior ter, tussis, cephalalgia, pectoris oppressio minus infesta, continuantur medicamenta.

22 — 19. Febris minor, pulsus elatus, durus, vix non aequalis, nil in medicamentis novi.

24 — 21. Urina cum sedimento rubro copioso: alvus quater cocta: sudor mane febris fere nulla.

25 — 22. Urina cum sedimento rubro alvus bis cocta; sudat mane. Abstinet a ulteriori medela.

26 et 27. Idem urinae sedimentum mane, cum sudore continuo et alvo frequentiter pultacea.

28 — Febris omnino deseruit aegrum melius posthac quam antea, valentem nulla tussis, nulla pectoris affectio eundem deinceps vexavit.

Periculosissime vero eodem malo decubuit foemina triginta annorum.

Haec decima Maji incipit aegrotare febris quotidiana, duplicatum habente typum cum tussi; dolor pectoris oppressorius, cephalalgia, dedolatio crescunt in dies, os amarum est, lingua flavet.

Decima octava Maji, octava morbi die in nosocomium allata. Dabam ipsi primam die

non nisi mixturam salinam; unde alvus ater aquosa absque levamine. Altera die uam emeticam sumit, unde quater vultus aeruginosus et alvuster, cum aliquo ramine. Vigesima: idem status: febris continua remittens, calor vehemens, et sicca, aegra valde infirma; pulsus debilis molundulosus, lingua in fundo flava, os aricans, tussis, cephalalgia, oppressio. Mit infusum florum arnicae, cum arcano plicato, et decoctum hordei pro potu.

21 M. 12 morbi die. Omnia ruunt in us: respiratio stertorosa, anxietas, moritas, delirium, pulsus undulosus, alvus dyrrhaeica, urina aquosa. Seponis salium usus: datur solum infusum florum arnicae et decoctum hordei.

22 — 13. delirium; alvus involuntaria, dyrrhaeica, pulsus celer, tremulus; stertor. Dantur grana decem camphorae cum infuso florum arnicae.

23. 24. In eodem: augetur camphorae dos ad scrupulum unum per diem: Applicantur siccantia ad suras. Duplicatur infusum florum arnicae dosis. — Vires indies magis allabuntur. H 25.

25 — 16. In eodem: stertor magnus dentes sordidi, mucus tenax fuscus os, glanque conglutinans, facies turbida, oculi semiclausi, delirium continuum. Dabam drachmam semis camphorae per die continuato infuso florum arnicae.

26 — 17. stertor videtur minui: caetera eadem.

27 — 18. Gena dextra rubet, pulsus sepe tremulus, cutis sicca, tussis, sputa difficilia, tenacissima, fusca; meteorismus alvus involuntaria, stertor minor: in intervallis lucidis conqueritur aegra de aures susurro: auditus gravis.

28 — 19. Anxietas, inquietudo, non insomnis cum magno delirio, alvus involuntaria semel.

30. — 21. Vomitus iterum spontaneus aeruginosus: post vomitum per momentum ad se redit; pulsus regularior, os purius hinc aquam emeticam propino suspensa non nu, dosique parcissima. Vomitus in quinque aeruginosi prorsus et glutinosus alvus simul ter cocta, semel involuntaria

hodie in utrumque latus: pulsus a me-
debilis undulosus. Continuato infu-
orum arnicae cum decocto herbae mal-
latur reliqua parte diei scrupulus unus
horae: noctu sudor ac somnus tranquil-
in urina sedimentum lateritium.

1 — 22. Respiratio melior: stertor
s amplius, minus delirat per diem, dor-
ro maxima parte, pulsus minus celer,
s: a meridie vomitus tres aeruginosi,
nosi, et alvus ter cocta: nox bona,
urina magnum sedimentum lateritium
n deponit.

.Iunii 23. Facies purior, laetior, ge-
on amplius rubicunda, lingua pura,
ratio bona, tussis fere nulla, venter
psus, alvus bis cocta: vesperi anxie-
inquietudo, nox insomnis cum de-

. — 24. Facies lurida rursus cum ge-
extra rubente: pulsus flaccidus, celer,
is: vesicantiæ gangraenescunt: mane
ltus iterum spontaneus, aeruginosus.
sitis omnibus medicamentis do ipsi rur-
rtarum emeticum in aqua solutum. Vo-

mitus inde ter aeruginosus cum multate
ci materia. Post vomitum libera ac ser
cibos appetit aegra medicamentorum
rumcunque abstemia; pulsus minus ce
elator, urina noctu lateritia.

3. — 25. Vomitus mane adhuc aer
nosus : per diem bene se habet: nulla
sis, anxietas nulla: caput, venter,
tus libera: appetit.

4. — 26. Pulsus tardus elatus, fa
bona: ad vires erigendas sumit deco
corticis.

5. — 27. Vesicantium ulcera con
dantur; reviviscit aegra, indies nunc
liorata, vires acquirit.

14 — Ab ulteriori corticis usu abstin

26 — Integre restituta nosocomio
ivit.

En vehementissimum et funestissim
statum morbi constitutionalis, qui in
rimis adeo mitem habuit decursum.

Sed et haec vehementia id habebat ter-
a inter symptomata benignitatis, ut na-
, licet undique suppressa, luctuansque,
os tamen servaret dies, queis perfectam
lveret crisin, initiumque ejectionum
epararet.

Omnia viscera nobiliora morbi gravi-
affecta languebant, nec ullus erat me-
mentis subveniendi locus toto coctio-
empore. Lethalem enim inani dyarr-
reddidissem virium deperditionem;
in adstringentibus fortioribus salus erat,
te materiam morbificam magis adhuc
cientibus.

Una supererat stimulans solensque virtus
horae, florum arnicae, et vesicantium.

Alia stimulantia fors idem effecissent;
lura congerere nolui, simplicibus as-
s. Sic camphora praeplacuit et in-
n florum arnicae, quorum miram vir-
i tot in periculis grata recolo memoria.

ast peculiaris in hoc morbo vomitus
post 20^{mum} morbi diem prorumpens,
jam initio morbi ventriculum vomitivo
per

perpurgassem, et inedia, potuque d
enti per viginti dies servassem nitidum

Seposita ibi erat materies morbifica
liosa, morbi vi coctrice ad expellend
disposita. Prima die potu aquae tepi
officio meo satis fieri credebam, ast al
die redeunte vomitu, certior de anamn
audacius dedi emeticum, quod, qua
porta, coctam materiam expelleret.

Quiescente morbo, et expulsa omni
teria tempus aderat roborandi. Tum
tex exhibitus mirabili pollens virtute ro
randi, vires restituit.

Tres adhuc alii in eodem haerentes
crimine eadem methodo consanuerē. Q
ta mortua est, morbo nimis diuturno,
partim senio, partim praecedentibus
bis exhausta.

Senicula haec valetudinaria octi
domi aegrotaverat: debilis valde ad no
comium affertur. Manibus pedibusque
gescentibus, delirans, pulsu debili ur
lante: decubitus brevi gangraenosus,
sis iners, ebulliente in bronchiis glutin
liu

lingua fusca, os tenaci fusco glutine plenum, alvus involuntaria, foetens. De-
 ilior indies, nullo criseos molimine fac-
 to, sexta die moritur.

Ad gangraenam imminuendam, vires
 rigendas, naturamque succumbentem ad-
 vivandam cortex, camphora, flores arnicae,
 desicantia, omnisque roborantium stimu-
 lantiumque apparatus frustra fuit exhibitus.

Cadaver habebat pulmones gangraeno-
 sos, cor vacuum, sanguinem ubique dissolu-
 tum, foetidum, intestina pluribus in par-
 tibus livida gangraenosa; viscera omnia
 molliora livescentia; vesiculam felleam bile
 nigra turgentem.

Vir triginta annorum quartana per men-
 sem afficitur, lingua alba pastacea, et ab-
 dominalibus visceribus obstructis. Dedi ip-
 si per quatuordecim dies arcanum cum flo-
 ribus salis ammoniaci. Inde quotidie ter,
 quater, quinquiesve alvus compacta. Eva-
 luata cruditate et febris vacillante dedi pulve-
 rem radicis gentianae drachmas duas per diem.
 Post duos abhinc paroxysmos febris non re-
 iiit amplius. Continuavit aeger per octo dies
 -pul

Quarta-
 na radi-
 cae gen-
 tianae
 sanata.

pulveris gentianae drachmam per diem
Hucusque bene valet.

phthi-
sis.

Phthisici pulmonali labe affecti hoc
mense plures convaluerunt antiphlogisticis
nutriente medela, sero lactis et decocto Sassa-
lepis. Ubi scrophulosum virus, glandu-
las obstruens, phthiseos causam autumavi-
dedi succum hederæ terrestris et decoctum
malti optimo cum effecto, ita ut assererem
possim, me duobus hisce remediis quam-
plurimos phthisi scrophulosa affectos integ-
re restituisse, de quorum reconvalescen-
tia non pauci desperaverant.

Non inutile credo, historiam breviter
percurrere phthiseos ab abscessibus mesen-
terii ortæ, quam hoc mense in nosocomio
observavimus.

Mesen-
terii le-
genera-
ti et
suppu-
rati his-
toria.

Adolescens erat viginti quatuor anno-
rum. A prima infantia, sexto nimirum
ætatis anno, febribus intermittentibus om-
nis generis laboraverat continuo, ita ut ne-
mense quidem uno febris illum dimitteret in-
columem; idque duravit toto sequenti vitæ
tempore. Variolas, morbillosque ut ipse
ajebat feliciter perpeßus erat antea, scro-
phu-

maulosae acrimoniae indicia non habuerat:
ec plica se, suosve (Polonus enim
at) affectos fuisse asserebat. Humidum
ero locum natalem fuisse, et intermitten-
as ibi non infrequentes esse, hydropemque
Sa citem.

Emaciatius, procero alias corpore, ad
osocomium accessit tertia Maji tertiana la-
orans. Venter erat durus valde, et ela-
s, quem statum jam diu sic esse affir-
abat.

Do ipsi decoctum solvens ex taraxaci,
aminis et cichorei radice, atque arca-
m duplicatum cum floribus salis ammo-
aci. Alvus indies quater, quinquiesve
mia.

Post septimam febris quiescit, et aeger
ne se habet. Interim amarus oris gustus,
li antea affuerat, adhuc adest cum ven-
e duro. Continuatur ideo prior medela
si imminuta.

Decima tertia Maji subito absque cau-
friget, caletque, febris quotidiana,
ae nunc quotidie recurrit, correptus.

Con

Continuantur priora remedia , adduntur extracta solventia.

Vigesima: Noctu cruciatur vehementissimis ventris doloribus cum pulsu cele constricto , lingua sicca. Salinis extemplo sepositis , venam parce seco , et exhibeo decoctum Salep liberalius ore , et per enemata , crusta livescens coriacea cruore tegit. Dolor mitigatur ; ast ascitis fit fluctuatione manifestior. Do nunc iterum decoctum solvens cum oxymelle colchico incassum , cum squilla incassum. Saepe inter eorum usum dolores colici vehementes. Febris interim irregulariter quotidie redit. decocto solvente cum cremore tartari omnium se habet optime ; febris imminuitur , urina manat copiosa ; evanescit aquae fluctuatio in abdomene et abdomen ipsum minuitur sua mole , ast antiquam servat duritiem.

Ad infarctus abdominis reserando clysmata ex carduo benedicto , furfuribus floribusque arnicae quater per diem injiciuntur. Alvus inde ter , quater per dies copiosa cocta stercoracea , sensim et glutinosa , viridis , fusa , copiosissima : emollescere etiam videtur abdominis durities.

Ast

Ast aeger indies magis magisque emaciatur : augetur febricula , appetitus perditur : Mors tandem vigesima prima Augusti.

Dissecto cadavere inveni pulmones undique accretos minus voluminosos, sanguine dissoluto in fundo.

Cor vacuum, flaccidum, lymphæ coagulabili auriculas ambiente pericardio agglutinatum.

Dissectis integumentis abdominis peritoneum valde deformatum, medio pollice crassius, durum, ut discindi vix posset, totum interiori superficie madidum,

Viscera omnia abdominalia unam in massam conglutinata: lymphæ coagulabilis toto in cavo extravasata membranacea coriacea, omnia conglutinans, incrassans, ita ut ad partium sejunctionem ubique cultro opus foret,

Intestina digito crassiora, pluribus in partibus externis exulcerata:

Mesenterium in massam difformem crassam transmutatum, intestinis accretum, plures in variis abdominis regionibus formans abscessus, quorum maximus in regione erat sinistra infra lienem fundo steotomatoso mesenterii, partes glandulosae omnes induratae, hepar tandem sanguine dissoluto redundans.

Eundem fere morbum nuper observavit Lentin, eundemque a Bonneto, et Morgagni descriptum legimus.

Mortui hoc mense in Civitate 1549.

Barom.			Therm.			Venti				
Dies.	alti.	med.	gradus medius.			mane.	meridie.	vesperi.		
1	27	dig. 10 $\frac{1}{4}$	lin.	+	o	15 $\frac{1}{4}$	gradus	o	o	o
2	—	—	—	+	o	15	—	o	o	o
3	—	—	—	+	o	16 $\frac{1}{3}$	—	o	o	o
4	—	—	—	+	o	18 $\frac{1}{3}$	—	o	S. p.	o
5	—	—	—	+	o	14 $\frac{1}{4}$	—	o	W. m.	W. m.
6	—	—	—	+	o	13 $\frac{1}{2}$	—	N. p.	N. p.	o
7	—	—	—	+	o	14 $\frac{1}{3}$	—	o	o	o
8	—	—	—	+	o	16 $\frac{2}{3}$	—	o	o	o
9	—	—	—	+	o	18	—	o	S. p.	S. p.
10	—	—	—	+	o	18 $\frac{2}{3}$	—	S. m.	S. m.	S. m.
11	—	—	—	+	o	20 $\frac{1}{5}$	—	S. m.	S. m.	S. m.
12	—	—	—	+	o	15 $\frac{2}{3}$	—	o	o	o
13	—	—	—	+	o	18 $\frac{2}{3}$	—	N. p.	W. p.	W. p.
14	—	—	—	+	o	14	—	W. p.	N. p.	N. p.
15	28	—	—	+	o	14 $\frac{1}{3}$	—	o	N. p.	o
16	27	—	—	+	o	17	—	N. p.	o	N. p.
17	—	—	—	+	o	71 $\frac{1}{4}$	—	o	o	o
18	—	—	—	+	o	18	—	o	o	W. p.
19	—	—	—	+	o	17	—	W. p.	W. p.	W. p.
20	28	—	—	+	o	20	—	N. p.	N. p.	N. p.
21	—	—	—	+	o	19	—	N. p.	W. p.	o
22	—	—	—	+	o	21 $\frac{3}{4}$	—	o	o	o
23	27	—	—	+	o	23 $\frac{1}{2}$	—	o	o	o
24	—	—	—	+	o	22	—	o	W. p.	W. p.
25	—	—	—	+	o	22 $\frac{2}{3}$	—	o	o	W. f.
26	—	—	—	+	o	14 $\frac{1}{3}$	—	N. p.	W. m.	W. m.
27	—	—	—	+	o	11 $\frac{1}{2}$	—	W. p.	W. p.	W. m.
28	—	—	—	+	o	13	—	W. p.	W. p.	W. m.
29	28	—	—	+	o	16	—	W. p.	W. p.	W. p.
30	—	—	—	+	o	17 $\frac{2}{3}$	—	W. p.	W. p.	W. p.

Die 21, 13 altitudo maxima = 28 dig. 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Die 10, 11, 26 altitudo minima = 27 dig. 8 lin.

Diffe. = o dig. 6 $\frac{1}{3}$ lin.

Die 24 calor maximus. = o + 25 grad.

Die 6 26 27 calor minima = o + 11 grad.

Diffe. = o + 14 grad.

Serenitas siccitasque continua vix non integrum hunc mensem notarunt, calorque ad nonam usque mitior sensim auctus est ad maximum gradum. A vigesima quinta tempestas pluviosa, minusque amoena in alterum mensem perduravit.

Numerus aëgrotantium hoc mense fuit exiguus, nec periculosi erant morbi acuti, genio eodem ac prioris mensis cogniti.

Bilis et intestinorum succus paulo aciores pepererunt remittentes quotidianas, dyarrrhaeas, et colicas. Non defuere tamen et rheumata, et inflammationes, praecipue cephalacae, anginae, et pleuritides, haemorrhagiae quoque variae, sputum sanguineum, vomitus cruenti, menorrhagiae, haemorrhoides, haemorrhagiae denique internae cum morte subitanea.

Febres
remittentes
entericae.

Remittentes continuae se manifestarunt cum horripilationibus vagis et dedolatione, quas excepit calor cum cephalalgia in regione frontis, et sudore.

Mane os erat pastaceum lingua albo mucro obducta. Haec cum diebus aliquot

arassent, dyarrhaea sequebatur spontanea, alvo copiosa viridi, febris deinde siluit, aegri plerumque medicamentis non indigentes, sponte restituebantur.

Quibus vero haec evacuatio opem non ferat, hi per aliquot adhuc dies vagarum orripilationum et calorum vicissitudine conflicti, febris dein manifestius cognita, cuncto fuerunt affixi. His febris quotidiana remittens cum exacerbatione vespertina, pulsus mollis, celer, lingua flavo mucosae inquinata, caeteraque biliosae colluviei indicia: cephalalgia vero vix unquam deerat, semper dolor circa frontem et ossa frontalis, persaepe etiam accedebant dolores colici, et alvus tenesmoidea.

Communis medela desumpta est ex classe solventium et salinorum: raro conducebant vomitoria, aegris non nisi pituitum et mucum stomachalem absque fructu expectantibus; ventriculo enim libero materia peccans non poterat non latere profundius.

Exigua quantitate rhei salibus mediis admista ter quaterve per diem alvum movebat, vere

vere conatus sum, diluentibus magna quantitate simul exhibitis, nec frustra. Simpliciter enim hac methodo continuata, febris, modo graviore symptomate non irritaretur sanata est. Quinta, ad summum septimae die alvus cocta educebatur cum sudore et urina hipostatica.

Cum
cephalalgia.

Nonnullos vero aegros, eadem hac febre laborantes, cephalalgia afflixit vehementior, eosque oculis rubentibus, pulsū fortissimo, celeri, somno perturbato, insomniisque terrificis ab aliis distinxit.

His venasectione nil magis erat necessarium; sanguinem enim crusta tegebat tenax phlogistica. Hac vero neglecta tertio saepe quartave die haemorrhagia narium copiosa aegro veniebat subsidio: nonnulli etiam aegris erysipelatosum exanthema erupit in faciem, aut pustulae circa labia naresque, cum catarrhali narium defluxione. Eruptione hac facta cephalalgia coepit mitescere: largior dein sudor morbum breviter sanavit, diutius alias perduraturum.

Quibus vero nec haemorrhagia narium nec exanthematica succurrit eruptio hoc mor-

morbus manebat periculosior. Febris enim
hunc continens, caput obtusum, dolor ver-
tebralis, tinnitus aurium, morositas, me-
lancholia, delirium triste, oculi rubri
et sic impatientes, lingua paulatim siccior,
albescens, pura quandoque et in fundo flavo
rufo conspurcata, sitis continua, os ama-
riscans, conamen vomendi, et vomitus
sepe aeruginosus nunquam levans, pul-
sus tensus, durus sensim compressior, sub
tremulus; varia dein eruptionum
specimina, miliaria alba, et rubra, pustule
circa labia, aphtae, omnia haec parva
solumine, morbo non respondentia, et abs-
que levamine. Post multas denique aerum-
inis vigesima quarta, trigesima imo et tar-
dus mors miserandam hanc claudebat Ca-
strophem. Sunt qui conamine vomendi
vomitu aeruginoso decepti, bilem edu-
cere et corrigere tentarunt; sed frustra. In
encephalo residebat morbi causa, et vomit-
us a concensu oriebatur, quemadmodum
a omni capitis laesione id fieri consuevit.
In encephalo inflammatoria erat sanguinis
stasis, aut a spasmu intestinali, aut a va-
porum laxitate, impetui humorum cedente,
aut ab ebulliente sanguinis orgasmo, aut
ab omnibus simul junctis inducta, quam

natura in aliis hamorrhagia narium, in aliis exanthematica faciei eruptione resolvebat

Huic innixus ratiocinio sanguinem audacter extraxi, tepidisque pediluviiis, et lenibus eccoproticis revulsionem a cerebro efficere studui, faustissimo id quidem eventu. Scilicet aegris diuturna etiam febri exhaustis et emaciatis exiguum sanguinis semper crustacei, quantitatem, nempe uncias quatuor vel quinque eduxi, qua evacuatione dolor brevi leniebatur; sic habitum semper virium ratione, sequentibus diebus perexiguum iterum eduxi sanguinis quantitatem, idque repetii, donec penitus cessaret inflammatio, aegrique dolore capitis se liberatos ipsi faterentur.

Interne sola dedi diluentia, addito uno alterove grano camphorae cum scrupulo dimidio nitri, bis terve per diem, ut irritatione composita viribusque vitalibus erecta resolutio redderetur facilior.

Sacrificationes nuchae et hirudines retro aures applicatae crebro cephalalgiam utinam rebellem compescuerunt opinione celerius

Colici dolores cum dyarrhaea inceptunt hoc mense invalescere. Initium faiebant tormina cum alvo adstricta, ructus, conamine vomendi, et ore amaro. Una alterave die post alvus sequebatur frequentior, tenesmoidea, cum sanguine simul excreto. Dyarrhaea.

Levis rhei dosis ad drachmam dimidiam per diem exhibita, decocto quodam rato tepido diluta, nidulantem in intestinis acrimoniam brevi eduxit, et diebus aliquot post ut plurimum sanitatem restituit.

Senibus vero et debilibus periculosior fuit hic morbus: virium enim lapsus, meteorismus, alvus involuntaria, funestaque illa paulo post ingruiebant symptomata, adeo, ut quae initio conduxerant lenia purgantia, his brevi morbus recrudesceret, nec siluentia accellerantem gangraenam retardarentur. In quibusdam saturatum radicis cinicae et corticis peruviani decoctum gangraenae progressum cohibuit viresque ad putridam materiam alvo penitus expellendam erexit.

Rheu-
ma.

Rheumata multos, multos item arthritidis et podagra renovatis afflixerunt doloribus. Odontalgiae, clavi, hystericae affectiones a rheumate nascentes, lumbagines, varii denique generis Dyarrrhaeae a rheumate solo ortae non paucos invaserunt. Haec vero malorum agmina in neminem desaevierunt pertinaciter; sed transierunt citomodo potu copioso tepido sudor prolicetur largior, nec sudor erat prolectu difficilis. Multas enim dyarrrhaeas, a rheumate ortas, solo potu tepido generose haustusanavi.

Coelo sudo motu aëris vehementiori locis umbrosis agitati transpiratio saepe interruptitur. Id quod hac in civitate minus rarum est: aedium enim moles solit altiores continuam multis in plateis umbram efficiunt: multae praeterea domus e plateis umbrosis transitum offerunt cameratum passuum saepe centum et ultra, qui in plateam ducit, fervidissimo soli expositam. Ventis vero hic loci continuo flantibus, fieri vix potest, ut, qui commorantes proprii istiusmodi aedes, sudant, transpiratione ilico perdentes, Rheumate non afficiantur.

Inflammationes quamvis hoc mense non fuerint adeo frequentes, non raro tamen partim prioribus morbis conjunctae, partim et purae irruerunt.

De cephalalgia inflammatoria modo sermo fuit.

Observavimus et pleuritides, peripneumonias, atque anginas.

Facilior fuit inflammationis diagnosis, cum pura esset, aut rheumati conjuncta. Pulsus enim durus, altus, celer, dolor, rubedo, aliaque manifesta tunc aderant inflammationis indicia.

Sanandi methodus in venaesectionibus, quibus sanguis crustaceus educeretur, et larva antiphlogisticorum potuum sumptione consistebat.

Ubi vero biliosa vel gastrica labes inflammationi erat conjuncta, binique hi morbi mixtum gignebant malum, accuratiori investigatione opus fuit, ut genius utriusque perdisceretur.

Facie hierant flavicante, vel luridescente, oculis minus splendidis: aderat constitutionalis cephalalgia; lingua mucosa albo flavescente tenuiter obducta, os pastaceum: febris typum quotidianae remittentis servabat quidem, sed pulsus in remissione celer erat atque compressus: Alvus vel constipata cum torminibus, vel fluida cruda viridescens: Dolor deinde vel capitis vel colli cum majori partium affectarum rubedine vel dolor lateris cum tussi sicca et oppressiva respiratione, vel doloribus abdominis puncturam aemulantibus: somnus denique rarus cum insomniis.

Diluentia et eccoprotica alvum minus moverunt, nec facilius: spasmus enim inflammatorius impediit eorum operationem. A vomitu nullum levamen. Hic una fuit in venaesectione salus. Sanguine enim pro ratione virium, morbi que gravitatis educto dolores leniebantur subito, solvebatur spasmus et quae jam exhibebantur eccoprotica ac diluentia, brevi per alvum coctam morbi materiem purgabant, ita ut vix ullus die septima post amplius aegrotaret.

Venaesectione vero neglecta, aut tumul-
tarius morbi orgasmus vehementiorem exci-
tavit inflammationem, aut morbus sensim
in phthisin abiit lethalem, nisi salutaris natu-
rae opera haemorrhagiam hoc mense alio-
quin valde frequentem excitasset.

Haemorrhagia nimirum narium, et uteri, Haem-
optysis, vomitus cruentus, haemorrhoi- mor-
rhagiae.
es, et haemorrhagiae internae.

Insuetum aeris et diuturnum calorem
aque siccitatem, orgasmo excitato, vasis
peribilitatis, sanguine fors et rarefacto prae-
quam horum malorum fuisse causam, ve-
simile est. Vix calor excessivus erat im-
mutatus, cum nulla amplius de haemorrha-
is fieret querela.

Antiphlogistica, nitrosa atque emulsa his
optima fuerunt medela cum venaesectione,
quandoque bis terve repetita, ut per exte-
rioris venae aperturam exitus pararetur san-
guini, qui alias sibi ipsi per vulnus inac-
cessibile viam faciens, id magis magisque
amplificando omnis efflueret, id quod non
cucis contigit.

Mortes
subita-
neae.

Appoplexia enim hoc mense valde frequens ab haemorrhagia plerumque interna orta fuit. In tribus, quos aperui, appoplexia mortuis vas quoddam majus ruptum inveni.

Concidebant infelices subito absque ulli praegresso incommodo in animi deliquium, non multo post pereuntes. Accedebat simul convulsiva ventriculi et intestinorum excretio per vomitum et alvum; respiratio stertorosa, omni momento debilior post quaedam minuta simul efflabatur cum anima.

Plerosque id genus subitaneae mortis vesperi post coenam prostravit.

In binis, quos excentravi, cerebrum fuit sanum, pallidum; pulmones cum cordi sani sanguine vacui, sana abdominis viscera omnia, sed abdomen ipsum plenum sanguine extravasato et congrumato. In prima arteria mesenterica rupta: in altero nullius vasis cujusdam ruptura fuit detecta.

In tertio gibboso sene cerebrum sanum erat, et pallidum: pulmo sinister pleurae

non

non secus ac pericardium cordi intime accre-
verant; cor vacuum; pulmo uterque fusco
nigricans, sanguine tumidum, cavum pec-
toris et abdominis sanguine extravasato et
congrumato scatens; ventriculus cibus in-
surgens, intestina aëre distenta. Visceri-
bus denique a cadavere separatis aortam
superiorem descendente in ipso suo transitu per
diaphragma pollicis magnitudine in longum
interruptam.

In nosocomium per hunc mensem admis-
si sunt quadraginta duo: viri nimirum vi-
genti duo, foeminae viginti. Ex his sede-
rim viri, foeminae duodecim acutis labo-
raverunt, chronicis vero et chirurgicis viri
sex, octo foeminae. Mortui sunt hoc e-
numero tres, ergo decimusquartus quisque.
Febris quotidiana remittente partim biliosa,
partim mixta inflammatoria correpti erant
viri sex, foeminae tres: pleuritide tam pu-
ta, quam biliosa mixta tres viri, duae fo-
eminae; colica et dysenteria duo viri simul
dysenteria vexati, tres foeminae; rheuma-
tis tres viri: erysipelate bilioso vir et fo-
emina, haemoptysi foemina: phthisi tres viri,
una foemina; haemorrhagia uteri foemina.
Tumorem complent morbis chronicis affecti.

De-

Decursus dictorum morborum huic mensi peculiarium idem est ac supra descriptum fuit; medela pariter eadem. Decoctum solvens paratum ex hordeo, graminis et taraxaci radice, aliisque leniter saponaceis cum aliquot drachmis salis medi, ut alvus inde aliquoties per diem purgaretur: sufficiebat morbo penitus exturbando.

Pleuri-
tis bili-
osa.

In aegrotâ quadam pleuritide biliosa affecta, metastasis ad parotides jamjam futura erat, quae tamen feliciter decocto foliorum salicis resoluta, et alvo purgante educta fuit.

Erat haec puella septendecim annorum paupercula, rerum omnium inopia, et variis aegritudinibus inde ortis emaciata et debilis. Duodecima Junii incipit dolere costam latere dextro cum horripilatione simul ac calore. 13. Junii in nosocomium admittitur: calor siccus, cutis arida, vehemens dolor lateris dextri costas veras afficiens et spurias externus, ab attactu paulo vehementior, tussis, subdelirium, pulsus celer, constrictus, lingua paucò muco griseo obducta, oris sat purus sapor.

Vena secatur, educuntur decem un-
e sanguinis, crustam brevi facientis:
nebitur ipsi decoctum radicis salep tepi-
n cum drachma nitri per diem: applican-
lateri cataplasmata calida emollientia.

Dolor lenitur statim: sed vesperi recru-
cit. Repetitur venaesectio ad uncias de-
n, sanguis iterum crustam format.
ntinuantur medicamenta.

14. Dolor adhuc, et tussis sicca do-
s, pulsus idem, omnia eadem ut heri.
petitur venaesectio; educuntur octo un-
e sanguinis iterum crustacei. Noctu-
nus cum sudore.

15. Dolor minor, sudor continuat,
irium, tussis vehemens sicca, pulsus ela-
s, celer. Continuo potum tepidum de-
ti salep cum nitro. Dolor paulatim le-
r, vesperi nullus amplius, tussis minor,
lor continuat.

16. Dejectio virium magna, pulsus
ne tardior, debilis, vesperi celer, mol-
elatus: aegra morosa, immorigera: ves-
a subdelirium, lingua pura, os purum,
ab-

abdomen molle, alvus singulis hisce diebus semel — bis fluida, noctu sudor: Accipere non subactum fors nec solis naturae viribus cessurum judicans, do infusum florum arnicae simul cum decocto salep.

17. Urina mane sedimentum flavo rubellum dejecit, tussis pauca, pulsus magnus tardus, mollis, alvus ter cocta pultace: vesperi idem febris accessus, sed moderatior. Continuatur infusum florum arnicae cum decocto salep.

18. Optime se habet aegra: pectus oratione liberum, mane plenaria apyrexia, os purum, stomachus latrat, vesperi febris accessus, per noctem continuans,

A 19. ad vigesimam secundam idem status: febris vesperi imminet, per noctem infesta: per diem bene se habet aegra famelica valde: pulsus mane tardus, mollis, vesperi celer constrictus, subinde inaequalis. Continuo infusum florum arnicae adjecta uncia mannae.

22. Noctu parotis sinistra tumet, dolet, inflammata est, omni momento incre-

is: febris secundaria. Seposita hucusque
continuata medela do ipsi decoctum folio-
rum salicis, unciam nimirum foliorum in
ris duabus aquae fervidae infusam, et
e quadrantem horae coctam. Parotidi
applico.

Vesperi sudor copiosior, alvus per
m bis.

24. Bene se habet aegra: tumor in
dem statu: continuatur Decoctum folio-
rum salicis.

25. Tumor dissipari incipit: febris
illa, ne vesperi quidem; pulsus elatus
edus, transpiratio: continuatur decoc-
tum foliorum salicis.

26. Tumor integre dissipatus est. Su-
at aegra solutionis salis amari sedlizensis
unciam; purgatur inde decies: optime se
bet. Nulla ab hoc tempore incomoda,
mitas indies magis confirmata: continuat
huc per octiduum decoctum salicis, ab-
inet deinceps ab omni medicamento. Man-
in nosocomio ad decimam nonam Julii
que, cum torosa decesserit.

Amau-
rosis ab
arthri-
tide.

Foemina triginta sex annorum ante
duos annos menstruis caruerat, et sanguinem exspuit. Venaesectionibus et antiphlogisticis sanatur, menstruis restituti. Anno medio post scabie afficitur, corpore pleno ulceribus saniem fundentibus, sulphure et balneis sanatur. Ante medium annum hepatide vehementi laboraverat venaesectionibus, emollientibus in- et externe applicatis sanata est.

Excipit hunc morbum vix superatus ischias, pulsu non duro, nulla praesente inflammatione. Decocta bardanae et florum sambuci tepida non sufficiunt, summesuper extractum aconiti ad grana sexdecem per diem. Usu per 37 dies omnino mane continuato integre restituitur.

Nunc prima Iunii febricitans in nosocomium adducitur. Per quatuor dies quotidianam remittente laborat biliosa: simul sunt arthritici pedum dolores, oculi flavescunt, lingua mucosum flavo obducitur, os patet, at caput liberum, pectus leviter oppressum, hypochondrium dextrum vix non tumidum est, alvus constricta, dolores lacinians artuum inferiorum.

Ex-

Exhibetur decoctum solvens: dantur si-
al arcani drachmae tres per diem, unde
rgatur. Septima Iunii nulla amplius feb-
, nullaue symptomata eam comitantia,
pochondrium liberatur: appetitus redit.

Ast dolores arthritici iidem: Pedum de-
ilitas tanta, ut aegra pedibus quin conci-
t stare nequaquam pos sit, simul oculorum
pilla dilatata est. Ecce nunc amaurosis.
Illa licet praecedente aut praesente cepha-
gia, nullo doloris aut pressionis cujus-
in in capite sensu.

Metastasin in cerebro circa nervorum
ticorum originem suspicatus, do repe-
que purgantia salina, applico ad nucham
sicans, pediluvia adhibeo calida, do in-
sum florum arnicae, aliaque potentiora
cidentia, repetitis omni biduo vel triduo
rgantibus. Nullum inde amauroseos leva-
en: eadem pedum debilitas, iidem do-
res.

A vigesima Iunii exhibeo extractum
oniti ascendendo a granis quatuor per
em ad scrupulum, continuoque infusum
orum arnicae, quorum excellentem in sa-
nan-

nanda amaurosi virtutem saepissime miratus sum. Insisto his remediis per intermedium mensem: arthritici dolores sensim minuantur et abeunt, roboris aliquid pedibus accedit quidem: ast diu iis insistenda re aegra impar est. Febris interim toto hoc tempore nulla, fames magna, macie licet incrementum, omnes functiones naturales bonae.

A vigesima Julii abstineo ab aconiti usu continuans solum infusum florum arnicae aliaque potentiora solventia: fonticulos in brachia applico: vesicans in nucha per tertium repetitur, pediluvia calida quotidie recedantur.

Mense Augusto de doloribus arthriticis nulla amplius querela: functiones omnes bonae manent: amaurosis eadem.

Circa initium Septembris aegra subemaciatur, nulla licet praesente causa. Sexta lethargica fit, leves oriuntur convulsiones, oculi convelluntur continuo, corpus in eodem situ jacet paralyticum: pulsus tardus est et debilis. Nona moritur.

Cadavere dissecto viscera pectoris et
dominis sana erant, hepar parvum,
num: partes vesiculae felleae viciniore
lito magis flavae, vesicula fellea bile fla-
re. redundans: omentum consumptum, ve-
lica urinaria gangraenosa, fusca.

Capite aperto cerebri vasa jacent san-
guine turgida: in ventriculis cerebri ante-
rioribus serum ad uncias sex: in sinistro
cerebri haemisphaerio prope corpus callo-
sum pars ipsius medularis substantiae polli-
cem longa lataque in mucum et gluten
converserat. Thalami nervorum opticorum et
procedentes inde nervi optici in ortu, con-
junctione, et toto suo tractu usque in introi-
tum in orbitam obducti cinctique lympham
coagulabili. Cerebri nervi omnes minus
cohaerentes, perfrictu faciles, vasa omnia
sanguine dissoluto plena.

Mortui hoc mense in civitate 1516.

Dies.	Barom.		Therm.	gradus medius	Venti.		
	alti.	med.			mane.	meridie.	vespe
1	27 dig.	10 $\frac{1}{3}$ lin.	+	o 19 $\frac{1}{8}$ gradus	o	W.m.	o
2	---	8	+	o 17 $\frac{1}{2}$ ---	o	S. f.	o
3	---	7 $\frac{2}{3}$ ---	+	o 14 $\frac{2}{3}$ ---	W. p.	W. p.	o
4	---	6 $\frac{2}{3}$ ---	+	o 14 $\frac{1}{2}$ ---	S. p.	W. p.	W. p.
5	---	7	+	o 16	N. p.	S. p.	N. p.
6	---	7	+	o 13 $\frac{1}{4}$ ---	W.m.	W. m.	o
7	---	7 $\frac{1}{2}$ ---	+	o 15	o	W. p.	o
8	---	10	+	o 12 $\frac{2}{3}$ ---	o	o	W. p.
9	---	11	+	o 14 $\frac{1}{3}$ ---	o	o	W. p.
10	---	10	+	o 15 $\frac{1}{2}$ ---	o	o	W. p.
11	---	5 $\frac{3}{4}$ ---	+	o 18	o	W. p.	W. p.
12	---	5 $\frac{2}{3}$ ---	+	o 11	W. p.	W. p.	W. p.
13	---	7 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 14	W. p.	o	o
14	---	7	+	o 14 $\frac{2}{3}$ ---	S. p.	W. p.	W. p.
15	---	8 $\frac{1}{2}$ ---	+	o 13 $\frac{2}{3}$ ---	S. p.	W. p.	W. p.
16	---	9 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 12	W. p.	W. p.	W. p.
17	---	11	+	o 12 $\frac{2}{3}$ ---	W. p.	o	W. p.
18	---	10 $\frac{3}{4}$ ---	+	o 13	W. p.	o	W. p.
19	---	11 $\frac{2}{3}$ ---	+	o 17 $\frac{2}{3}$ ---	W. p.	o	o
20	---	11 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 18	S. p.	o	o
21	---	9 $\frac{1}{4}$ ---	+	o 20	N. p.	S. p.	o
22	---	11 $\frac{1}{2}$ ---	+	o 14 $\frac{1}{4}$ ---	o	o	o
23	---	11 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 17 $\frac{1}{2}$ ---	o	o	o
24	---	10 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 18 $\frac{2}{3}$ ---	o	O. p.	W. p.
25	---	10 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 18 $\frac{1}{2}$ ---	o	o	o
26	28	0 $\frac{1}{2}$ ---	+	o 16 $\frac{1}{2}$ ---	W. p.	o	W. p.
27	---	0 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 17	N. p.	o	o
28	27	10 $\frac{1}{2}$ ---	+	o 15 $\frac{1}{3}$ ---	o	o	o
29	---	7 $\frac{1}{3}$ ---	+	o 20	o	o	o
30	---	7	+	o 20	o	S. f.	S. p.
31	---	10	+	o 17 $\frac{1}{4}$ ---	S. p.	N. f.	o

Die 26 altitudo max. = 28 dig. 1 $\frac{1}{2}$
 Die 12 altitudo minima = 27 dig. 5 $\frac{1}{2}$

Diffe. = o dig. 7 $\frac{1}{4}$

Die 21, 30 calor maximus = o + 24 grad.

Die 8, 15, 16 calor minimus = o + 11 grad.

Summa = o + 19 grad.

Mensis hic in genere solito fuit frigidior, nec correspondens calori prioris mensis. Primi novem dies sereni quidem, sed indies minus calidi: nona coelum nubibus tegi coeptum, pluvia deinde vix non indies ad decimam nonam usque continuante: amoenius postea ridebat coelum, et calor quandoque satis intensus mensem ad finem usque comitatus est.

Febres biliosae sensim irruere brevique ^{Febrea bilio- sac.} insolenter dominari coeperunt. Plurima febrium pars aut pura fuit biliosa, aut saltem de genere biliosarum participavit.

Regnarunt biliosae purae, cephalalgicae, et bilioso inflammatoriae, rheumatismi inflammatorii, erysipelata, dyarrhaeae et dysenteriae, intermittentes tertianae, vomitus cruenti, variolae denique confluentes funestae.

In biliosis puris praeter communiora biliosarum symptomata: anorexiam scilicet, vomituritionem, linguam muco flavo obductam, typum remittentem, urinam fuscam singularis etiam adfuit capitis dolor pressorius ad maximam quandoque vehe-

mentiam auctus circa frontem et tempora, aliquando et supra verticem ad occiput extensus: in aliis cephalalgia minor quidem, sed dolor lateris acutissimus cum tussi pauca, sicca: pulsus, quo majores erant dolores, eo tardior, ita ut naturali esset tardior in vehementissimo paroxysmo. Aegri extra paroxysmum in somnum quidem proclives, ad minimum vero motum, imo sponte evigilabant perterriti.

Dolebant ad unum omnes e ventriculo, quem sine irritamento non licebat attingere, in multis praecesserat, vel et comitabatur morbum colica cum vel sine dyarrhaea. Foeminas, et delicatiores cephalaea praecipue vexabat.

Qui curam a venaesectionibus inhaerant, ubi non urgeret inflammatio, peiorem reddiderunt aegrorum conditionem; necessarias enim ademerunt vires, febrimque putridam nervosam cum ferocibus elicuere deliriis. Plerorumque sanguis laete rubens fuit, et cruor discissu facillimus. Antispastica nervosaeque stimulantia cum febris incremento omnium simul inducebant malorum iliadem.

In ventriculo latitabat acre morbosum, bilis corrupta, forsan et ipse succus gastricus acrior. Hoc acri, qua data porta, rejecto, et febris et mala quaevis eam committantia abigebantur. Erat vero talis naturae, ut se non una eademque vice avellere poteretur, incidi debebat, et resolvi sentimur et excoqui, usque dum radicitus exterminari posset.

Vomitoria remedium erant unum instar omnium, et inter haec longe antecellebat tartarus emeticus in aqua, quo commodius partitis vicibus sumeretur, solutus, quo sumpto bilis aeruginosa amarissima cum vitissimo ejiciebatur levamine.

Interim non una vice febris cedebat locum: redibant dolores, etsi minus acuti, remanebat pulsum tarditas cum biliosorum apparatus. Continuanda hinc erant per unum alterumve diem salina solventia; ex quibus granum unum vel alterum tartari emetici, in aqua pura vel mannata solutum, et cochleatim datum, erat caeteris longe efficacius. Potentissime enim acre morbosum, nuco immixtum, et in villis ventriculi et intestinorum implicitum incidebat, solvebat, et

et per alvum educebat. Post duos tresve dies repetendum erat emeticum, quo omnes istius acris reliquiae penitus eliminarentur. Post et febris et omnia febris incommoda fugerunt.

Nonnullorum malum exacerbaverat inflammatio, eorum nempe, qui musculari robore majori, vel crasi humorum compactiori pollebant. Febris, qua laborabant, eadem quidem remittens, et apparatus biliosus idem, dolores quoque capitis, sed magis erant pulsatorii cum pulsu forti, tenso, duro, celeri.

His vena secanda erat, quandoque repetita vice, crusta scilicet tegente sanguinem. Dein vero vomitorium dandum. Eadem nimirum causa, saltem aggravans morbi sodalis, latitabat in ventriculo. Ejiciebant et hi non parum aeruginosae bilis, eamque purgabant alvo cum levamine; propterea continuatis incidentibus eccopropticis, repetitis etiam pro re nata emeticis spatio septem vel novem dierum integre convalescebant.

Febris decrescens manifestiores faciebat remissiones, in multis etiam intermis-

ones, quotidie minores, usque dum prorsus evanesceret. Ter eam in tertianam iisse vidi, continuato solventium usu est tres quatuorve paroxysmos emanentem.

Ad hanc biliosarum classem et intermitteutes tertianae, et erysipelata, faciem, crus, variasque corporis partes occupantes, dyarrhae quoque, et dysenteriae refectur oportet, siquidem jam dicta mala eisdem symptomatibus distincta, iisdemque salinis incidentibus et vomitoriis citissime et integre sanabantur.

Dysenteriae infantibus erant infestiores: collabebantur cito vires, et qui debiles erant, vel scrophulosi, aut alia acrimonia laborantes, aut qui tenerrimo non vivebantur servitio, brevi moriebantur.

Rheum ad grana aliquot omni bihorio syrupo quodam datum, et clysmata mucilaginosa simul cum diaeta mucilaginosa, non farinacea brevi restituebant tenellos, vomitorio rarius indigentes; Opiata, theacalia, aliaque ejusdem furfuris consueta muliercularum antidota tumulo inferebant.

Vomitus cruenti per hunc mensem copiosiores, quam alias, et consuetis facile recidivi. An ab acri ventriculum rodente? Inviscantia cum parca dosi aluminis froenum dederunt sanguini erumpenti, vomitumque sopierunt. Omnibus audacter dedi purgans salinum: purgabatur congruatus sanguis ater, viridisque bilis cum levamine.

Rheuma.

Medias vero inter febres biliosas inflammatorio rheumaticae non infrequentes fuerere. Fors accusanda venit aëris constitutio a medio mense humida et frigidior post tam diuturnum calorem et siccitatem.

Dolores his vehementes in aliqua corporis parte, saepissime exteriori: febris continua continens, primae viae purae, pulsus celer durus. Nulla hic mora, secunda venaesectione saepe repetita, decoctionibus emollientibus cum sambucinis et nitro statim ab initio succurrendum erat: vesicantia, partem dolenti applicata, medelam multum adjuvabant.

Aegri
nosocomii.

In nosocomium per hunc mensem quadraginta quinque admissi, totidemque

ne-

mine mortuo, inde sunt egressi: nimirum, quatuordecim viri acutis morbis laborant, et octo foeminae: Novem viri et quatuordecim foeminae chronicis et chirurgicis morbis affecti venerunt.

Admissi morbis laborabant sequentibus: Febri continua remittente biliosa cum convulsis affectionibus quatuor foeminae, vir unus; febre ardente biliosa inflammatoria viri septem: peripneumonia duae foeminae et vir unus: haemoptysi foemina, diarrhoea vir, febre rheumatica viri duo, ophthalmia rheumatica vir unus, erysipelas duo, febre puerperali foemina: febre tertiana viri duo, duae item foeminae; febre depascente vir et foemina; gravidarum sex feliciter enixae, epilepsia foemina una, scabies duae, scorbutus una; scrophulis vir unus: tinea unus, lue venerea unus et tres foeminae: fluore albo benigno una: hernia benigna vir unus.

Febres remittentes stipatae phoenomenis supra descriptis, eadem quoque methodo curabantur. Emeticum ex aquae fontanae fonticulis sex et quatuor granis tartari emetici schleatim exhibitum ad tres quatuorve vomitus.

mitus pro ratione ejectae bilis excitandos dein decoctum hordei cum aceto, praeterea, si hypochondrium, si lingua et gustu nidulantem in primis viis materiam proderent, drachmae duae vel tres arcani duplicati per diem omnem medelam ad finem usque faciebant. Ad vires restaurandas infusum quoddam amarum v. g. radicis valerianae datum et nervos composuit, et virium recrementum adjuvit.

Queis aderat phlogosis, qua tertiana intermittente laborantes liberi non erant, hanaesectionibus egebant. Binos tertiana exquisita laborantes ardor vehementis et cephalalgia, pectoris oppressio, et tussis sicca multum afflixere. His stante paroxysmo cum delirio, pulsu existente duro et compresso venam secui: crusta operuit sanguinem: Sequens paroxysmus multo fuit mitior, et salinis continuatis frequentior alvus, unde brevi convaluerunt.

Causus.

Circa medium mensem quidam ex iis, qui in fervidissimo aestatis calore iter ex Walachia huc fecerant, nunc per septimanam in squalidis carceris tenebris detenti, acutissima laborare febris, vero cau-

vel febris ardente Hippocratis incepta, quae propter symptomatum vehementiam, et celeritatem decursus peculiarem tur descriptionem.

Undecima nempe Julii tres horripilare, capite conqueri, noctu exaestuare, perire.

12. Julii, 2. morbi die duo transportandus ad nosocomium. Primus erat vir robustus quadraginta quinque annorum niger: color: alter debilior annorum viginti tri-
albidus: uterque de dedolatione magis de cephalalgia, et pectoris oppensione queritur: pulsus est mollis, flaccidus, primus, lingua tota quanta alba, flavescens, os amarum, labia pallida.

Dantur iis drachmae duae arcani duplici, et decoctum hordei pro potu liberali. Primus purgabatur per diem et nocte decies quinquies, alter duodecies; utriusque noctu largum deponit sedimentum lateritium.

13. — 3. Nullum levamen, oppressio maxima, gustus oris amarus, vomitum con-

continua, lingua albo fusco mucō dense ducta, facies flavescent, oculi luridi, respiratio anxiosa, frequens; vires magis magisque fractae, pulsus celerissimus, mollis, bilis. Secundus praeterea vomit atque aeruginosus.

Utrique dabam emeticum: vomitus de copiosi aeruginosi, fusca materies ejecta, alvus etiam frequens absque levamine. Urina primi fusca, secundi lateritia.

14. — 4. Vomituritio continua, et vomitus: oculi tristes, cephalaea, oppressio et dolor pectoris, respiratio anxiosa, frequens, pulsus mollis, flaccidus. Inflammationem metuens, venam seco utrique: Sanguiinem crusta tegit spissa tenacissima; Levamen. Primo ob insurgentem pectoris dolorem et cephalaeam venaesectionem recuso: crusta rursus, et levamen.

15. — 5. Primus caput habebat liberum, color oculorum ut heri, albuginea autem cingulo interno proxima flavescebat, lingua purior, nisi quod hinc inde flavus ei mucosus adhaereret; pectus erat liberum, respiratio facilis, minus frequens: hypochondria

tumida, ad attactum dolentia, vomitus
continuus ab omnibus, quae sumit,
iginosus, amarus, alvus per diem
er, urina fusca, pulsus celer, mollis,
lis. Dabam ipsi omni hora vasculum
octi salep et pro potu decoctum hordei.

Secundus noctu habebat insomnia ter-
a, caput dolebat adhuc et pectus, op-
sio simul et vomituriō. Hinc secun-
instituo venaesectionem. Sanguis tar-
ffluit, crusta tamen tenaci tegitur; do-
mitigatur. Meridie vomituriō con-
a; evomuntur viridia, fusca bilis por-
a, manus pedesque frigere incipiunt,
us mollis deficiens, oculi tristes, cali-
osi, semimortui; facies collapsa.

Praeter decoctum Salep, quod mane
i hora vasculatim coepit sumere, dabam
infusum florum chamomillae calidum
syropo menthae, ventrique cataplas-
a emollientia applicabam. Inde brevi
t calor, nox tranquillior, nec vomitu
errupta,

16 — 6. Primus a priori nocte continuo sudat: caput ipsius liberum est, et tus; oculi vividi, ad angulos internus flavi; nullus vomitus: lingua pumida, ad marginēs solum paucobducta, gustus oris non amarus: hychondria vero adhuc elata, ad attadolentia, urina fusca, alvus bis coctasus mollis, elatus, lentus: Indesinente mit decoctum Salep: continuantur catamata emollientia abdomini applicata. tranquilla cum copiosissimo sudore, minus fusca.

Secundus quoque sudavit continuo, vum ter habuit coctam: facies adhucris, lurida, lingua albescens humida, tus et respiratio bona, abdomen collapsindolens ad attactum, pulsus mollis, cidus, celer; artus tepidi, et humidi, na statim turbida, sedimentum album de in fundum dejecit. Continuat catamata, et decoctum Salep.

17.—7. Uterque bene se habet: cies colorata, oculi puri, lingua pura, mida, parum mucosa, respiratio bopectus liberum, hypochondria mollia,

olentia: alvus semel, pulsus naturalis len-
s vigorosus, urina flavicans naturalis.
continuantur cataplasmata, decoctum sa-
p'et decoctum hordei.

18 — 8. Omnia bona: seponitur ulte-
rior medicamentorum usus; appetitu rede-
nte cibi molliores comeduntur.

Secundus morbo liber manet et vigesima
iuxta Julii sanus e nosocomio dimittitur.
Primus vero

22. Julii, 12. prioris morbi die mane ru-
et valde et calet, pulsus tardo, lento, ela-
to: Fames interim magna; vesperi vero fe-
bricitat cum vehementi cephalalgia: nox
inquietata.

23 — 13. Febris continua, cephalaea
maxima, pulsus celer durus: venaesectio:
sanguis crustaceus: cephalaea inde minor,
sed os amarum, abdomen dolet inflatum.
Emetropicum datum alvum non solvit. Nox
inquietata.

24 — 14 Eadem. Dantur nunc unciae
duae salis amari; inde alvus decies, et
uri-

urina statim sedimentum album deponit cum
febris imminutione: nox tranquilla cum
sudore.

25. 15. Febris nulla amplius.

Sanitas dein indies confirmata nullo turbata incomodo. Vigesima Augusti sanus nosocomio dimissus est.

Tertius, qui eadem, qua duo priores die laborare inceperat, secunda die decessit, mi mansit, iisdem malis detentus. Tertio die post in nosocomium delatus est. Adulescens robustus viginti duorum annorum conquerebatur de cephalaea, vertigine, insomniis et dedolatione maxima. Pectus erat anxium, respiratio celerrima, os amarum, vomitus frequens porraceus; pulsus, celer, mollis, debilis. Datur ipsi eadem die arcanum duplicatum et decoctum hodie dei. Noctu haemorrhagia narium.

4. morbi die: Symptomata hesternae haemorrhagia narium unciarum decem. Ventri naesectio fit: sanguis crustaceus. Aqua emetica: emeses sex bilis porraceae: melioratio: vesperi oppressio paulo levior: re-

iratio minus celeris, pulsus mollis, cre-
er, hypochondria dura: somnus tranquil-
s cum sudore.

5. Sudor copiosus, urina sedimen-
m album deponit, lingua pura; omnia bo-
t; non sumit nisi decoctum hordei.

6. Sudor continuat, cephalalgia nul-
, respiratio libera, hypochondria mol-
t; appetitus; lingua humida, tota albes-
ens, pulsus celer, mollis, alvus nulla.—
coctum hordei.

7 Nox bona: facies sana, lingua
avo mucro inquinata, pectus liberum, ab-
omen in regione pubis dolens, et hypo-
ondria tumidula, pulsus celer, mollis, e-
tus, urina fusca: dantur drachmae duae
cani cum decocto hordei. Alvus a me-
die quater cocta cum euphoria.

8 Hypochondriorum elatio: lingua
mucro flavo tecta, omnia alia bona: repe-
ntur medicamenta hesternae: alvus ter per
em.

9 Febris nulla, hypochondria mol-
scunt, mucus linguae minor: eadem me-
dicamenta, alvus ter.

10. Omnia bona: sanitas perfecta
fames magna.

23. Julii, 13 morbi primidie febris
meridie vehemens, cephalaea, oculi flavi
cantes, vomituritio, haemorrhagia narium

24. — 14 Eadem. Sumit aquam emeti-
cam: vomitus sex bilis aeruginosae.

25. — 15. Febris minor, os amarum
lingua flavo muco foeda, urina fusca. Su-
mit drachmas quatuor arcani cum decocto
hordei: alvus quater.

26. — 16. Febris adhuc, et lingua fla-
va; alvus ter: continuat hesternae remedia.

27. — 17. Mane febris nulla, vesper
febris cum sudore; urina sedimentum late-
ritium deponit; alvus ter: priora remedia

28. — 18. Febris fere nulla amplius
lingua purior: omnia sana. Continuat arcani
duplicati drachmas quatuor cum decocto
hordei.

29 — 19. Febris indies minor, lingua
 prior: eadem medicamenta: alvus indies
 r quaterve. Trigesima prima Julii a feb-
 liber ore purissimo abstinuit a medicamen-
 , carnesque comedit. Sanatio constans.
 xta Augusti sanus nosocomio valedixit.

Decima tertia Julii advenerunt in noso-
 mium duo alii eodem morbo laborantes.
 ior juvenis viginti trium annorum, robust-
 , duodecima Julii incepit febricitare:
 phalalgia vehemens, dedolatio maxima,
 ies oculique flavicantes, vomiturnitio con-
 ua, os amarum, lingua flavo mucro den-
 oblecta, pectus anxium sine tussi, res-
 atio celeris, pulsus celer, flaccidus,
 llis. Vesperi datur ipsi arcanum du-
 catum.

14. Julii, 3 morbi die: Eadem sympto-
 ta: aqua emetica excitantur vomitus
 o porracei cum levamine. Oppressionem
 toris persistente venaesectio bis eadem
 administrata, cum levamine oppressio-
 . Sanguis valde crustaceus.

15. — 4. Sudor magnus copiosus; vo-
 us semel spontaneus: urina cum sedi-

mento lateritio: omnia mitiora: sumit copiose decoctum hordei.

16. — 5. Nox optima: oculi vividi facies florida, abdomen collapsum, lingua albida, os purum, nullus amaror, appetitus redit; alvum ter habuit coctam.

17 — 6. Sudor adhuc noctu; febris nulla amplius, pulsus naturalis; omnia sana.

Sanitas perfecta mansit et constans vixit tribus cito recuperatis, ita ut vigesima septima Julii sanus ex nosocomio dimitteretur.

Quatuor dierum spatio morbus hic terminabatur.

Alter adolescens annorum viginti unus et diutius, et vehementius laboravit. Decima tertia Julii vesperi venit in nosocomium: magna virium prostratio, facies oculi flavi, caput vertiginosum, os amarum, lingua flavo albicante muco conspurcata, continuum vomendi conamen, respiratio frequens, anxia, hypochondria elata et affectum dolentia. Data ei aqua laxativa. Noctu decies quinquies alvus.

3. morbi die. Hæsterna symptomata, illud levamen, urina fusca, biliosa, pulsus celer, mollis, flaccidus. Porrigitur ei aqua emetica: Vomitus inde sex bilis ruginosae cum glutine et striis sanguineis: rursus decies. A meridie nullum adhuc levamen ab hac evacuatione duplici, caput vertiginosum, dolens, pectus anxium, pulsus celerrimus, flaccidus. Vena secatur. sanguis valde spissus, crusta larga tectus. Levamen. Noctu haemorrhagia narium unum sex.

4. Caput liberius, os purum, lingua albescent, pectus anxium, hypochondria ta dolentia. Venaesectio adhuc unciam octo. Cruor dissolutus crusta vitæ tectus. Levamen: -alvus bis post venesectionem, hypochondria molliora et minus dolentia. Vesperi sudor largus cum calore multo. Continuo sumit decoctum cordei.

5. Cephalalgia quidem nulla, pectus liberum, hypochondria quoque molliora; sed fauces et oculi flavicantes, lingua sicca spissa, pharynx cum sicco muco albido, sitis, somnolentia, pulsus celer, mollis, frequens:
uri-

urina fusca biliosa : alvus bis mane. Integra die sudor, vesperi horripilatio, frigus, deinde calor cum largissimo sudore postridie durans. Continuavit decoctum hordei.

6. Caput obsessum, lingua et dentes mucosiusque sordentes, os amaricansudor continuat antemeridianus, pulsus celer, mollis, elatus, pectus et respiratio libera, hypochondria elata, urina fusca biliosa, alvus ter. Sumit decoctum hordecum drachmis tribus arcani duplicati. Ameridie cephalaea et delirium, calor maximus pulsus celerrimus, elatus, durus. Venasecatur: sanguis educitur ad uncias decem crustaceus. Augetur salium dosis ad unciam dimidiam cum uncia mannae: hinc alvus sexies. Nox tranquilla cum sudore.

7. Sudor copiosus: urina sedimentum deponit album: hypochondrium molle est, et lingua minus sordida, pulsus celer mollis. Repetitur decoctum hordecum drachmis tribus arcani duplicati. Alvus ter

8. Nullum febris vestigium: pulsus naturalis, omnia sana sunt: appetit. Perstat in sanitate ad vigesimam quintam Julii quae

iae est decima quarta morbi, qua febris currit absque causa valde vehemens: cephalaea, anxietas, dolor pectoris. Venae tunc cunctae sunt repletae. Crusta decumana tegit sanguinem prope prorsus carentem: aliquantum inde leuissimum. Vigesima sexta repetitur venae tunc cunctae: eadem crusta; seri tantillum exit in sanguine, levamen. Ab aqua laxatissima sexies alvus biliosa oritur: noctu sunt. Vigesima septima Julii febris mitior, sudor continuus: Vigesima octava licet omni febre, sensim reconvalescit, sanitate permanente. Decima Augusti sanus in hosocomio discedit.

Docet haec historia, quam denso sub involucri latere possit inflammatio, ita ut sanguis dissolutus aliquot diebus post densissimam phlogoseos tenacitatem acquiritur et phlogosis praesente licet omnino viscoso putridoque apparatu primaria sit morbi causa, quae praecipuam medicamentorum vim exposcat. Vident denique practici, quod non paucis in morbis utut vehementibus adhibeamus pharmacia, modo exhibeantur selecta, loco et tempori accomodata.

Advenerunt decima quarta Julii iterum tres alii eadem febre laborantes, iisdem affecti symptomatibus, eademque sanati medela. Duobus ter vena fuit secunda, tertio semel, cum natura huic benignior per haemorrhagiam narium medici operam praevenerisset. Omnibus emetico eduxit copiam nondulantis aeruginosae bilis, quae et sanguinem, et pectus, abdominisque viscera inflammaverat. Felix eventus coronavit medelam,

Febrim hanc fuisse causum evidens est et quidem causus cum inflammatione pectoris, et viscerum abdominalium. Maxime gaudio simillimam a Burserio factam huius febris descriptionem video,

Titubans nec sine magna anxietate primo aegro venae sectionem administravit. Pulsus enim omnino collapsus, facies flavescens, et lurida, vomitus continuus aeruginosus, alvus quoque porracea dyarrhoeica biliosi certe putridique status potius quam inflammatorii signa erant. Cum vero considerare humores juvenilis corporis in sicco calidoque aëre in inflammatoriam potius abire diathesim, quam putridam

dissolutionem, simulque novissem, quam viros et fallaces viscera abdominis inflammata soleant effectus producere, nec ignoravi, quod respirationis celeritatem inflammationis potius quam dissolutionis putridae signum esse; tandem ausus sum venaesectionem instituere, pulsum et sanguinem profluentem continuo explorans, ut effectum inde securum in instanti dijudicarem. Summopere avisus sum de iudicio recte formato, si, cum pulque mihi de securo omnibus deinceps procedendi methodo feliciter detecta gratulatus;

Foemina annorum tringinta unius, fibrae debilis, a juventute epilepticis insultibus obnoxia, quorum ortum a terrore repetebat, nunc ab anno eos sensim frequentiores patiebatur, ita ut nunc fere quotidie terribili hoc morbo cruciaretur nullo malorum, quae eum comitari solent, exempta. Decima octava in nosocomium suscepta est. Menstrua a quatuor jam mensibus non fluxerant: auctam ab eo tempore epilepsiam affirmabat. Facies erat pallida, cor palpitans, pulsus tremulus saepe intermittens, a minimo motu terror, qui eam in convulsionem et epilepticum insultum prosternebat, ore spu-

Epilepsiae historia.

spumantem, digitis validissime contractis oculis contortis, omnique sensu privatam.

Dabam ipsi pulverem radicis valerianae silvestris ad drachmas duas, et camphorae grana sex partitis vicibus per diem: adhibebam praeterea pediluvia calida, et ad femora interna vesicantia ad menstrua revocanda.

Elapso octiduo epileptici insultus et rarius et minus vehementer irruebant et minus erant diurni. Post duas septimanas exanthema pustulosum pruriens hinc inde apparebat, insultibus nunc multum minutis. Acrimoniam exanthematicam fors morbi causam incute propullulaturam sperans, addidi priori medicamento drachmas duas florum sulphuris per diem sumendas.

Eruptio pustularum rubrarum leviter suppurantium hinc inde et herpeticarum in dies sequebatur copiosior. Post tres septimanas non amplius quotidie, sed omnibiduo vel triduo revertebatur epilepsia minor. Quarta septimana vix elapsa nullus

am-

plius rediit paroxysmus, menstruis licet anentibus.

Exanthema duravit per sex septimanas; nec inde et ulcuscula suppurarunt: conuavi pulverem ex floribus sulphuris, radicem valerianae, et camphoram per duos menses. Nullum amplius insultus cujusdam indicium. Retinui aegram in nosocomio quartam octobris usque, visurus, an eo hoc tempore aliquis rediret insultus, sed plane nullus apparuit.

Interim et exanthema sensim sanabatur. Aeneis calidis cum hepate sulphuris praeparatis, et prioribus remediis continuatis, versus medium Septembris ab omni medicamento abstinuit, menstruis copiosis reuentibus. Libera hucusque mansit, et dum ulto post haec scribo, sanissima est, ne eo quidem amplius paroxysmo turbata.

Mortui hoc mense in civitate 1488.

Barom.			Therm.		Venti.		
Dies.	alti.	med.	gradus medius.		mane.	meridie.	vesperi
1	27	dig. 10 lin.	+	o 19 $\frac{1}{4}$	o	N. p.	o
2	—	10 $\frac{1}{4}$	+	o 15 $\frac{1}{2}$	o	W. p.	N. p.
3	—	10 $\frac{1}{4}$	+	o 16 $\frac{1}{4}$	o	o	o
4	—	10	+	o 16	o	W. p.	W. p.
5	—	11 $\frac{3}{4}$	+	o 16 $\frac{1}{4}$	N. p.	N. p.	o
6	—	11 $\frac{1}{2}$	+	o 18 $\frac{2}{3}$	o	N. p.	o
7	—	10 $\frac{1}{4}$	+	o 20	o	W. p.	o
8	—	10 $\frac{3}{4}$	+	o 18	W. m.	W. f.	W. m.
9	—	10 $\frac{3}{4}$	+	o 20 $\frac{2}{3}$	o	W. m.	o
10	—	10	+	o 19 $\frac{2}{3}$	o	N. f.	o
11	—	10 $\frac{3}{4}$	+	o 18	N. p.	o	o
12	—	11	+	o 17 $\frac{1}{2}$	N. p.	N. p.	N. p.
13	—	10 $\frac{3}{4}$	+	o 17 $\frac{1}{4}$	N. p.	o	o
14	—	10 $\frac{3}{4}$	+	o 15 $\frac{2}{3}$	o	o	N. p.
15	28	o	+	o 15 $\frac{2}{3}$	o	N. p.	N. p.
16	27	11 $\frac{2}{4}$	+	o 17	o	o	o
17	—	10 $\frac{1}{2}$	+	o 17 $\frac{3}{4}$	o	S. p.	o
18	—	9 $\frac{3}{4}$	+	o 16 $\frac{1}{3}$	o	o	W. p.
19	—	10 $\frac{3}{4}$	+	o 15 $\frac{1}{2}$	W. p.	W. f.	o
20	—	10 $\frac{3}{4}$	+	o 16 $\frac{2}{3}$	W. p.	o	W. p.
21	—	11	+	o 17 $\frac{1}{4}$	W. m.	W. p.	N. p.
22	—	9 $\frac{3}{4}$	+	o 16 $\frac{1}{4}$	o	o	o
23	—	11 $\frac{1}{2}$	+	o 14 $\frac{1}{4}$	o	N. m.	N. p.
24	—	10 $\frac{1}{2}$	+	o 16 $\frac{1}{3}$	N. p.	N. p.	o
25	—	10 $\frac{1}{4}$	+	o 18	o	o	o
26	—	10 $\frac{1}{4}$	+	o 20 $\frac{1}{4}$	o	o	o
27	—	9 $\frac{1}{2}$	+	o 20 $\frac{1}{2}$	o	S. p.	o
28	—	9 $\frac{1}{3}$	+	o 16 $\frac{1}{4}$	o	o	W. f.
29	—	10 $\frac{1}{2}$	+	o 13 $\frac{3}{4}$	W. f.	W. p.	o
30	28	o	+	o 14 $\frac{1}{4}$	o	o	o
31	—	o $\frac{1}{2}$	+	o 15	W. p.	W. m.	W. m.

Die 31 altitudo max. = 28 dig. 1 lin.

Die 27 altitudo minima = 27 dig. 8 $\frac{1}{2}$ lin.

Differ. = o — 4 $\frac{1}{2}$ lin.

Die 26 calor max. = + o 24 grad.

Die 23 calor minimus = + o 12 $\frac{1}{2}$ grad.

Differ. = + o 11 $\frac{1}{2}$ grad.

Tem-

Tempestas hoc mense varia fuit: primi undecim dies calidi et sereni: ab undecima ad decimam quintam mox pluvia mox serenitas: duodecima mane tonitru: ad decimam octavam coelum serenum: decima bona pluvia: vigesima, vigesima prima et secunda coelum serenum, vigesima secunda vesperi pluvia copiosa: a vigesima tertia ad vigesimam septimam serenum: vigesima octava vesperi pluvia: ad finem deinsque coelum serenum.

In nosocomium per hunc mensem trinta octo admissi sunt, novemdecim viri totidemque foeminae. Ex his viri novem et undecim foeminae acutis morbis laboraverunt, reliqui chronicis et chirurgicis morbis affecti erant. Mortui ex his duo: Hinc decimus nonus quisque mortuus est.

Summa particularium morborum sequens erat: Dyarrhaea, ac dysenteria laboraverunt tres viri, tresque foeminae; febre biliosa inflammatoria unus; biliosa pura viri tres, et quatuor foeminae; pleuritide ut plurimum rheumatica vir unus et quatuor foeminae; carditide summe inflammatoria unus; erysipelate duo viri; hysterica pass-

si-

sione foemina; epilepsia vir unus, hydrope duo; scorbuto unus et una foemina; scabie unus, et duae foeminae; scrofulis binae foeminae et vir unus: hie venerea duae foeminae: tinea vir unus, contusionibus denique unus.

Dyarrhaea. Morbi pauciores hunc mensem iique fere omnes biliosi generis distinguunt. Eminuerunt ex iis dyarrhaeae et dysenteriae. Erant caedem vel simplices cum frequentiori torminosa alvo, vel vehementioribus desaevientibus symptomatibus, febre fortiori, lassitudine majori, alvo sanguinea et tenesmoidea.

Simplicium dyarraearum comes febris erat mitior: os aegris pastaceum; amarum, lingua albo flavicante muco sordida; dolabant e praecordiis, intestina convellebantur torminibus; pulsus celer erat, velox, saepe et compressus.

Omnes hi aegri citissime sanabantur pulvere rhei ad drachmam semis vesperi et mane sumpto, exhibita deinde aliquot horis post ultimam rhei sumptionem mucilagine gummi arabici, cujus cochlearia duo omni hora aegris sumenda erant. Duae

isti-

huiusmodi exiguae rhei doses usque ad
asperum per alvum educebant biliosam ma-
trem, et tribus quatuorve horis post dy-
senteriam omnem compescuerant, attonitis
sepe aegris a dyarrhaea tam subito fugata
si male metuentibus.

Qui graviori conflictabantur dysenteria,
pusum habebant velocem et contractum,
minibus multis iisque scindentibus, et
perpetuo excruciabantur tenesmo: sanguis
cum muco foetido mixtus dein et purus
saepius frequenti ejiciebatur, lingua, ut in
febris, muco flavo albo tenaciori coin-
cuncta, os pastaceum et amarum, aliqui
etiam aeruginosam evomebant.

Bilem corruptam, acrem, fors et liquo-
ra intestinalem acrem hujus morbi causam
sepe arbitratus, a purgantibus diluentibus
etiam incepti: dedi omnibus aegris rheum
per drachmam semis vel scrupulos duos binis
horisve vicibus omni quadrihorio. Praete-
r clysmata mere mucilaginis, ad invis-
ceratos inflammatos et exulceratos intestini
parietes, utpote veram tenesmi cau-
sam, omni bihorio injecta sunt.

Hac methodo biliosae cruditates copiosiori quidem, sed minus frequenti alvum eductae sunt, et tenesmus post tertium quantumve clyσμα, saepe etiam paulo post primum quievit. Dolor nunc cardiae, ventrisque leniri coepit et oris redire puritas. Dein ad inflammatas intestinorum partem demulcendas, et acre restitans involvendum mucumque abrasum restituendum, dabatur decoctum emolliens ex radice Salep Altheae, aut mucilaginem gummi arabici. Secunda modo hujus curationis die morbus vix non integre depulsus erat: tertia vix ne vestigium quidem illius remanserat.

Febris
biliosa.

Praeter dyarrrhaeas et dysenterias febrem sic dicta biliosa frequentissimus hujus morbis morbus fuit. Erat ea vel biliosa purior vel bilioso-pituitosa, bilioso-inflammatoria, bilioso-rheumatica.

Cum inflammatio-
ne.

Bilioso inflammatoria desaevebat vehementius, et remediis tardius locum faciebat. Aegri ex capite plerumque dolebant acrius, oppressio, dolorque pectoris, oculi rubentes, calor intensus cum pulsu celeri veloxi duro. His sanguinem oportebat extrahere iterum, saepe iterumque, dein datur

omitorium, quo bilis aeruginosa per emet-
um et alvum educeretur. Dolor capitis ve-
ementior vesicans ad partes vicinas requi-
ebat; nervorum affectiones levi camphorae
vel moschi vel castorei dosi bis vel ter per
diem exhibitae brevi cedebant: Ante un-
decimam diem vix crisis erat perfecta.

Seniores bilioso pituitosa laborantes, ^{Cum}
omitoriis adjuti cito copiosam bilem pi- ^{pituita.}
uita mixtam ejiciebant. Qui meticulosi
accidentibus potius et eccoproticis curam
stantabant, ab emetico abhorrentes, aegros
in diuturna mala praecipitabant: Varii
nim morbi a bile intimius nidulante tenaci
acriori reddita, febris lenta continua,
inflammationes subdolae in visceribus no-
lioribus, vel depositiones in caput pec-
sive oriebantur, unde appoplexiae, or-
opneae, hydropes pectoris, aliaque ma-
tandem immedicabilia aegros saepe subi-
morte abripiebant.

Omnibus his malis initio levi negotio
currebatur uno vel altero emetico, quod
nacem pituitam una cum bile acri educens,
issime morbum terminabat. Observati-
ae vero multiplici expertus sum, senes et

facilius vomere et ab emesi levamen citius sentire iunioribus, quorum orgasmus maiorque sensibilitas aegrius convulsivam hanc expulsionem ferunt, et venae bibulae irritabiliores materiam morbificam semel assumptam humorum massae facilius commu-
nicant.

Cum
cephala-
ssa.

Capitis dolor vehementior praecipuum adhuc et urgentissimum symptoma fuit in morbis biliosis. Dolor hic verticem et occiput occupabat oppressivus, instar gravi ponderis capiti impositi, idque continuo prementis: remittente vero febre minus gravabat, etsi nunquam penitus desineret. Post meridiem paulatim auctus, circa vespere vehementissimus, noctu cum sudore remittebat. Venaesectio nihil attulit levaminis, sanguis tenuissima crusta tectus erat pulsus medio in paroxysmo, et vehementissimis capitis doloribus tardus, lentus vix quadraginta ictuum in minuto. Vesicantia quidem nuchae applicata leniebant dolorem: plurimum vero levaminis dabant vomitoria et continuata dein lenia eccoprotica atque solventia cichoreata, quibus continuatis cum dolore febris sensim penitus subigebatur.

Ver-

Versus medium mensem rheuma plures
 elixit. Tempestate enim frigidiori et plu-
 viosa, transpirationem inhibente, sudantia
 corpora subitaneo saepius frigidoque vento
 corruere.

Pleuritides omnes rheumatici generis <sup>Pleuri-
tis rheu-
matica.</sup>
 sunt: dolor lateris punctorius, extensor,
 tactu auctus in ejusdem lateris artus
 irradiebat. Venaesectione sanguis educe-
 tur crusta densa flavaque obductus. Bi-
 nis saepe, raro tribus venaesectionibus opus
 erat: Decocta saponacea, salina cum roob
 sambuci alvum cum euphória purgabant,
 aperiebantque poros cutis salubri madore.
 Radiciae binae radicis altheae in libris tribus
 aquae coctae ad remanentiam librarum du-
 rum, in quibus sesquiuncia pulpae tama-
 rindorum et roob Sambuci atque uncia semis
 olei mirabilis Glauberi solutae fuerant, op-
 timum praebebant medicamentum, cujus un-
 ciae binae omni bihorio sumendae erant.
 Symplicius inde ter, quaterve solvebatur, tran-
 sformatio levans erat copiosior, et morbus cita,
 bilique crisi ante quintam plerumque diem
 egre sanatus.

In foemina quadam dolor pertinacius lateri infixus haesit; Vesicans loco dolenti applicui: Elevata vix erat vesica, cum omnis dolor remitteret.

Carditis

Carditis vehementissima quendam afflixit lethaliter. Vir erat laboribus exhaustus quinquaginta trium annorum: hic secundum Augusti febricitare coepit cum tussi molestissima sicca, dolore lateris sinistri anterioris prope ultimas costas veras; oppressione pectoris et dedolatione maxima. Tulit aegrum malum indies auctum triduo absque ulla meliora. Quinta Augusti in nosocomium militatur.

Conqueritur de dolore pectoris oppressivo, quasi pondus medio sterni adjacere de vehementi lateris sinistri dolore punctatorio: tussis simul aderat frequens sicca respiratio anxiosa et suspensa ob dolorem pulsus celer, mollis; os amarum, vomitum continuo continua, lingua flavo muco obducta hypochondria libera.

Inflammationem vehementem una cum bile acri tragoediam hanc ludere suspicatus illico largam feci venaesectionem, et cataplas-

ismatibus calidis emollientibus pectori
applicatis, exhibui largum potum tepidum
cononaceum salinum. Crusta coriacea te-
nebat sanguinem.

6. Aug. 5. morbi die. Purgaverat noctu
: lingua erat purior, os minus amarum,
mituritio nulla amplius; sed dolor, tus-
s, anxietas perseverabant. Repetitur ve-
resectio; crusta iterum; levamen inde per
quot horas: Nox tranquillior.

7.— 6. Eadem adest in respirando an-
tas et oppressio; facies rubescit, aeger
stis anxiusque medelam petit, omni mo-
nto situm mutat, in sinistro vero latere
e majori anxietate nequit decumbere,
lsus celer, mollis, et flaccidus est: symp-
nata biliosa omnino disparuerant.

Certus de inflammatione nobilissimi vis-
is, cordis, et de funestissimo aegri statu
inem apparatus antiphlogisticum simul et
olventia adhibeo remedia. Denuo hinc
nam seco: do decoctum tamarindina-
n cum nitro et oxymelle, vapores aquae
ididae aceto addito inspirantur, cataplas-
ma-

mata continuo. Nullum levamen: Tussis noctu vehemens, sicca.

8.—7. Eadem. Venaesectio quartice iteratur: crusta denuo: levamen. Circa vesperum exasperantur omnia. Venaesectio unciarum quatuor sanguine dissolutus, nulla crusta tectus educitur. Levamen tamen aliquod per aliquot horas.

9.—8. Sudor levis, anxietas eadem, dolor lateris minor, tussis sicca; urina continuo flammea. Pectori vesicans applico.

10.—9. Anxietas minor, sudor levis per duas horas, tussis eadem; pulsus pausae elatior.

11.—10. Noctu nullus somnus, oppressio maxima, tussis continua, ardor bilis, siccus, pulsus denuo mollis, flaccidus, celerrimus.

12.—11. ad 16. usque nulla mutatio alvus quotidie bis vel ter, tussis et oppressio continua, sudor rarus, lingua flammacea, muco sordida, urina flammea biliosa.

17 — 16. Noctu stertor, virium collapsus. Vesicantiâ hinc ad suras applicantur. Camphora ad grana viginti per diem exoletur.

19 — 18. Sudor exiguus oleagineus: stertor per duas tresve horas permanens.

21. — 20. Stertor denuo magnus et vomituro: venter inflatus, tumidus. Exoletur solutio mannata cum sale: alvus iniquater biliosa: ventris nulla detumescencia.

22. — 21. Vomitus spontaneus aeruginosus.

23. — 22. Aquae emeticae parvam quantitatem sumit: vomit ter aeruginosam bilem: alvus quater biliosa: nullum vomitum: meteorismus idem.

24 — 23 Eadem. Urina fusca sedimentum lateritium deponit, manet tamen opacum et fusca.

25 — 24. Stertor noctu maximus, conatus suffocationis metus. Augetur camphora.

phorae dosis, exhibentur et kermes mineralis, et infusum stipitum dulcamarae, e quaecunque ex resolventium, incidentium et leniter stimulantium classe supererant.

1. Sept: 31. Sputa pauca, mucosa: tussis anxietas, meteorismus, summa debilitas.

2 — 32 Maculae latae lividae brachiis femoribus pedibusque insident. Involvuntur artus mucilagine camphorata.

3. — 33. Urina continuo fusca opaca cum sedimento lateritio, alvus ter: reliqua eadem.

4. — 34. Respiratio cita stertorosa pulsus rarus.

5. — 35. Frequens animi deliquium anxietas continua, mens libera, debilitas per triginta sex dies omni momento major

6. — 36. Mors tranquilla.

Aperto cadavere cavum pectoris intergrum mensura redundans. Pulmones vix de parvi vix superiorem thoracis medietatem

tem

implentes, flaccidi, lividi, variis in locis pleurae ligamenti a lymphâ coagulabitis accreverant. Lymphâ haec coagulatis pulmones variis in locis circumamans una cum sero extravasato cavum pericardii implebat. Pericardium amplissimum crassum ac rubellum diaphragmati intinse nexum erat: in eius cavo librae duae sesquialtera rubelli continebantur. Cor decumanum, aëreotanto majus solito, sanguine vacuum, intense rubrum, cujus superficiem intus magnae excrescentiae tegebant tenacissimi eidem adhaerentes, a lymphâ coagulati ortae. Viscera abdominalia cerebrumque sana.

En denuo inflammationem cordis et pericardii minus opinione vulgi raram. Mirum idem videbitur quibusdam inflammationem nobilissimi visceris tam diu durare potuisse. Ast resolutionis tempore neglecto ingraena compescebatur generosiori antilogisticorum adhibitione. Hinc morbus in chronicum transivit malum, hydropem nempe pectoris: Cordis enim motus tenacibus haerentibus impeditus, pulmones etiam iis concretionibus pressi, pleuraeque aggratinati respirationis negotium indies mi-

nus debite obibant. Fluidius denique serum
exprimebatur in cavum, id quod pariter a
orthopnaeam lethalem augendam contribuere c

Probe recordor, me simul cum b. Stoll
illustrem quendam Comitem, quem peripneumonia
monia laborare judicabamus, curandum habuimus
buisse minus quoque prospero eventu
quingagesima enim morbi die mortuus es.
Vomicam suspicantes, cadaver secuimus
et ecce pulmonibus, visceribusque omnibus
sanis pericardium ultra duas puris libras
continebat apice cordis eroso et exulcerato.
 tandem et hic aeger oppressionem in me
dio sterno senserat, eadem et huic
latus sinistrum decumbendi impossibilitas;
pulsus quoque mollis, et flaccidus erat
ab initio. Historiam hujus morbi diligent
tissime conscriptam a medicis assistantibus
qui omni hora diu noctuque per totum mor
bi decursum mutationes factas adscripserunt
fors aliquando typis mandabo, cujus lectio
tametsi quibusdam ob continuas repetitione
ingrata videri possit, certo tamen lectu uti
lissimam arbitror, cum verissimam morbi
hucusque minus cogniti imaginem ante oculos
statuat.

Puella viginti annorum florens torosa, ^{Febria} ^{biliosa} ^{cum} ^{scarla-} ^{tino} ^{exan-} ^{themato} optima Augusti absque causa cognita frigore coepit, horripilare per aliquot horas, sin calere, cum pectoris oppressione, respirandi difficultate, cephalaea, et frequentibus animi deliquiis. Sudavit nocte absque uramine.

Octava iterum per vices frigescere, sacculus calere, cum auctis hesterni diei malis.

Nona mane ad me venit, dedolationem magnam omnium membrorum patitur, caput valde dolet, facies rubet simul, et lingua humida muco albido flavescente in mento obducta; siti cruciatur, pondus in pectore premens sentit cum respiratione anxia: pericardium dolorem patitur ardentem, vel in sinistro etiam attactu ardentior: hypochondria libera sunt; pulsus celer elatus curiusculus: menstrua ad regulam nunc perveniunt a biduo.

Do ipsi decoctum saponaceum cum saepone ad purgandas primas vias: alvus inde ter meridie movetur: nullum inde levamen. Sub vesperum anxietas et dolor pectoris pressorius vehementer, pulsus elatior, celerior. Vena sec-

ta dat uncias decem sanguinis, inde levamen. Sanguis rubellus, laxioris consistentiae.

10. Aug. 4. Noctu multum sudavit aegra, bis habuit alvum; interim anorexia, os amarum, lingua ad fundum denso mucro flavo griseo coinquinata; oppressio et anxietas eadem, pulsus celer, mollis, elatus, pedes continuo frigent.

Do ipsi aquam emeticam, vomuit, inde cruda mucosa, quater simul habuit alvum.

Calor post emesin et sudor; durante sudore striae rubrae et voluminosae in facie, pectore, et abdomine efflorescunt scarlatini exanthematis instar, post duas horas iterum evanescentes.

11 — 5. Nox inquieta; calor per totum corpus aequalis, cum corporis madore continuo: lingua adhuc impura, pulsus celer, elatus. Sumit decoctum hordei cum aceto et arcano duplicato.

Alvum per hanc diem quater habet copiosam, biliosam: per diem frigent iterum pedes: menstrua silent ordinato termino.

Post mediam noctem sudor enormis cum
mno pacato, et anxietate minuta.

12 — 6. Melius se habet aegra: ano-
xia quidem adhuc, et pectoris gravis an-
xietas, sed gradu multo leniori: pulsus ce-
lestinus, elatus, lingua laete rubra humida: pe-
tus calor temperatus. Continuat prius medi-
amentum; quinquies purgatur cum euphoria.

13 — 7. Febris nulla amplius: facies
laeta rubet.

Abstinet ab omni medicamento.

Decima sexta sana exivit.

Febris haec biliosa purgari coepit exan-
temate scarlatino, post sudore copiosissimo
prima morbi die oborto. Ast nondum pe-
tus educta morbi materie remanebat an-
xietas et febris: tandem sexta per alvum
copiosa bilis educebatur nunc cocta, fors
ex sanguine iterum huc delata. Jam feb-
ris fuit penitus terminata.

Casus sequens non parum ad historiam
febris puerperalis conferre poterit.

Foe-

Foemina annorum viginti sex, fibrae tene-
rioris, et quatuor prolium mater, vigesima
aprilis pepererat filium partu felici: Lo-
chia initio sat copiosa sunt, sed pallidiora,
sat bene valet puerpera, venter tamen tu-
met. Febris lactea mitissima est, mammi-
flaccidis et lacte renuenti fluere. Sexta di-
e lecto surgit, ventre tumido, fors et re-
frigeratur. Mox inde lochia remanent, acce-
dit pectoris oppressio, dolor colicus cum
maxima debilitate.

Sumit statim medicamenta purgantia et
diluentia, sed absque effectu: lochia con-
tinuo remanent, eadem est pectoris anxie-
tas, iidem colici ventris dolores. Febris
est continua; accedit tussis sicca dolens.
Varia nunc ipsi exhibentur remedia ex clas-
se resolventium, incidentium, et stimulan-
tium, sed omnia incassum. Purgatur quod-
dam venter, qui inde etiam detumescit, sed
dolores non minuuntur, tussis augetur.
Febris continua aegram valde lacessit, tan-
dem accedit et lienteria.

Post duorum mensium aerumnas men-
strua redeunt, fluuntque per sex dies parca
et diluta: levamen inde quidem aliquod
sed

omnino breve: omnia priora mala manebant eadem: febris continuat aegram decens. Accedit tandem et urinae stranguis, dysuria et mictus cruentus cum dolore laborum atrocissimo.

Prima Augusti rogatus hanc aegram vimacae consumptam et summe debilem: suserat celerrimus, debilis, contractus: inter mollis et vacuus, sed ad minimum actum valde dolens: dolores scindentes continui totius abdominis ad lumbos usque. respiratio erat suspensa, celeris, anxiosa, sed sentiebat aegra pectori incumbens: vis erat continua sicca, urina sanguinea, alvus continuo lienterica.

Erat hic summa et universalis inflammatio cum universali fibrarum valde irrilium spasmus. Uncias duas decocti raris Salep omni hora exhibeo tepide, cataplasma emolliens calidum ventri applico, et cataplasma emolliens singulis horis injici jubeo.

Nox melior prioribus: altera die aliquid levamen. Uncias quatuor sanguinis educi jubeo: Crusta densa et contrahit cruorem: levamen inde. Eadem die

repeto venaesectionem ad uncias sex: eadem crusta: levamen inde maximum sentit aegra. Urina enim nunc naturalis exit absque sanguine, tussis silet, ventrisque dolor multum imminuitur.

Sic meliorabatur indies continuato emollientium usu ad septimam Augusti usque cum sudor prodiret copiosus acidulus. Mentem venit aegrae, aliud induere induit, induit, et refrixit in momento: redeunt dolores colici vehementissimi, omnia priora mala, facies contracta, pocraticam aemulans. Extemplo emollietissima adhibeo tepida ore, alvo et extrinsecus. Venaesectionem instituo unciarum sex, sanguinis summe phlogistici.

8. Augusti. Melioratio. Dolores cessant, mollescit pulsus. Praeter emollientia nunc do mucilaginem gummi arabici cum laudano liquido. Noctu somnus tranquillus.

9. Oppressionem pectoris maxima sentit aegra, impedit, celeriter, laboriosa et inaequaliter respirat doloribus colicis libera, pulsus celer inordinatus inaequalis est et compressus: Continuat priora medicamen-

menta. Vesperi superficies pectoris val-
de prurit. Noctu sudor.

10. Continuante sudore acidulo mili-
aria rubra et alba maxima in copia prodi-
unt, urina sedimentum lateritium copio-
sum deposuit, alvus simul compacta, lactis
coagula continens: nullus dolor amplius,
pectus liberum.

11 Febris fere nulla amplius: urina
continuat sedimentum statim deponere, mi-
laria adhuc, alvus continuo frequens et a-
cidulum spirans cum coagulis albis, caseosis;
menstrua copiosa, eadem coagula al-
ba continens. Perdurarunt criticae hac
cretiones per sex dies. Vigesima Augus-
ta aegra lectum primo deseruit. Rediit bre-
vis appetitus et vigor corporis, valetudine
egre restaurata.

En exemplum febris puerperalis per se-
cim septimanas atrociter furentis, quae a
puerperali causa suscitata ac fota fuit, a re-
cto nempe lochiorum fluxu et impedita lac-
tis elaboratione et exitu.

Aderat haec ipsa materialis causa potantum temporis intervallum in corpore, se exitum non inveniebat viis omnibus a spamo inflammatorio clausis, quo soluto materiae morbificae liber nunc patuit exitu rediitque sanitas citissime. Miliaria hic rerum se monstrant velut peculiarem febr puerperalis crisin, acidusque sudor et lact coagula in alvo et menstruis palam ostendunt, non delirare penitus eos, qui peculiarem febris puerperalis causam in lochia et lacte statuunt.

Non me latet, febres, quae puerperis saepius infestant, participare ut plurimum de genio regnantis morbi epidemici, in quolibet mense novis id argumentis demonstrare possem. Ideo tamen adduci non debemus, ut febrim omnem puerperis propriam denegemus. Adest nimirum in puerperis proprius naturae motus ad uterum constringendum, ad sanguinem ex uteri substantia eximendum et educendum. Hae functione perturbentur, peculiare inde morbi nascitur, necesse est.

Mortui hoc mense in Civitate 1531.

SEP

Barom.				Therm.		Venti			
Dies. alti. med.				gradus medius.		mane.	meridie.	vesperi.	
1	27	dig. 10	lin.	+	0	14 $\frac{1}{2}$ gradus	W. m.	W. m.	W. p.
2	—	8	—	+	0	16	W. m.	W. m.	W. p.
3	—	5 $\frac{3}{4}$	—	+	0	14	W. p.	S. p.	o
4	—	7	—	+	0	12	o	o	o
5	—	9	—	+	0	13 $\frac{1}{4}$	o	o	W. m.
6	—	10 $\frac{1}{4}$	—	+	0	13	o	o	o
7	—	8 $\frac{1}{4}$	—	+	0	14	S. m.	o	o
8	—	6 $\frac{1}{4}$	—	+	0	14 $\frac{1}{2}$	W. p.	W. p.	W. f.
9	—	11 $\frac{1}{4}$	—	+	0	11 $\frac{2}{3}$	W. m.	W. m.	o
10	—	11 $\frac{1}{2}$	—	+	0	11 $\frac{3}{4}$	W. p.	W. p.	W. m.
11	—	9 $\frac{3}{4}$	—	+	0	11 $\frac{3}{4}$	W. m.	W. f.	W. m.
12	—	11 $\frac{1}{2}$	—	+	0	11 $\frac{1}{2}$	W. m.	W. m.	W. p.
13	—	11 $\frac{2}{3}$	—	+	0	13 $\frac{1}{2}$	N. p.	o	o
14	—	10 $\frac{1}{2}$	—	+	0	15	o	o	o
15	—	10 $\frac{1}{2}$	—	+	0	15 $\frac{1}{4}$	o	o	o
16	—	10 $\frac{3}{4}$	—	+	0	16 $\frac{3}{4}$	o	W. p.	W. p.
17	28	0 $\frac{3}{4}$	—	+	0	12 $\frac{3}{4}$	o	o	o
18	27	10 $\frac{1}{2}$	—	+	0	12	o	o	o
19	—	11 $\frac{1}{2}$	—	+	0	14	o	o	o
20	—	9 $\frac{1}{4}$	—	+	0	15 $\frac{2}{3}$	S. m.	S. f.	S. m.
21	—	10 $\frac{1}{4}$	—	+	0	15 $\frac{1}{3}$	S. m.	S. f.	W. f.
22	28	1 $\frac{1}{2}$	—	+	0	10 $\frac{2}{3}$	W. m.	W. m.	o
23	—	1 $\frac{2}{3}$	—	+	0	10 $\frac{2}{3}$	o	o	o
24	27	11 $\frac{2}{3}$	—	+	0	14 $\frac{1}{4}$	o	o	o
25	—	10 $\frac{2}{3}$	—	+	0	13	N. p.	N. p.	N. f.
26	—	11 $\frac{1}{3}$	—	+	0	7 $\frac{1}{2}$	N. f.	N. f.	N. f.
27	28	1 $\frac{1}{2}$	—	+	0	7 $\frac{1}{2}$	N. m.	N. m.	o
28	—	0 $\frac{2}{3}$	—	+	0	6 $\frac{1}{3}$	o	S. p.	o
29	27	11 $\frac{1}{4}$	—	+	0	9 $\frac{1}{4}$	S. p.	S. p.	S. p.
30	28	1	—	+	0	9 $\frac{1}{2}$	o	o	o

Die 22 23 27 altitudo maxima = 28 dig. 2 lin.

Die 8 altitudo minima = 27 dig. 5 lin.

Diffe. = 0 dig. 9 lin.

Die 21 calor maximus. = 0 + 20 grad.

Die 28 calor minimus = 0 + 4 grad.

Diffe. = 0 + 16 grad.

Coelum per totum mensem frigidum et ut plurimum quidem siccum sed mane nebula tectum, vigesima quarta, quinta, et sexta pluviosum, reliquis diebus nubilum fuit.

In nosocomium per hunc mensem admissi sunt triginta quinque: novemdecim viri et sedecim foeminae: Decem viri et novem foeminae acutis, novem viri et septem foeminae chronicis et chirurgicis morbis affecti fuerunt. Omnes sani exiverunt.

Adultorum morbi elapso mense pauci fuerant, minusque periculosi.

Bilio-
sorum
conti-
nuatio.

Initio mensis biliosae febres priorum mensium continuant minori tamen numero et mitiori natura. Levi enim salino medicamento expurgabatur bilis per alvum, raro opus erat emetico; et febris tertia, quarta, quinta vix ultra septimam diem finiebatur, alioquin dyarrrhaeica, urina hypostasim faciente et sudore liberaliori.

Febres
catarr-
hales
cum a-
crimo-
nia bili-
osa pi-
uitosa.

A sexta septembris febres acutae aliae induebant faciem. Catarrhales affectione immiscebantur cuique feбри, coryza, ophthalmia, tussis catarrhalis et angina pituitosa.

sa. Horripilationes frequentes quotidianae cum caloribus vagis alternabant: lingua erat albo muco sordida: sapor oris non amarus, quam pastaceus. Interim dolores saepe colici, dyarrrhaeae, et dysenteriae huius febris non infrequentes comites erant.

Perbelle transitum biliosarum febrium catarrhales rheumaticas hac in febre licet perspicere, ultimos nimirum bilis acris sus et naturae molimina, tam ad bilem rem, quam ad nova, quae a frigido et nebuloso aere oriebantur, mala subigenda, et pellenda.

Utrumque malum nec vehementia excitebat symptomata, nec pertinax erat. Suppore et alvo per aliquot dies liberaliori fessis omnis erat edomita. Lenia salina et lenientia medicamenta cum potu tepido liberalius dato optime conducebant: quia bilis acris et pituita illis cedebant, et inflammatio catarrhalis imminuebatur; hoc vero, scilicet potu tepido, quae in vasis impacta erebant, per poros cutis eliminabantur, molleiebantur tenacia, et ad resolutionem reddebantur. Raro venaesectione usus erat, nisi et dolor acerbior et pulsus du-

rior inflammationem majorem indicarent: id quod in paucissimis contigit. Dyarrrhaeae et dysenteriae solutione mannata vel decocto tamarindorum brevi levabantur.

Febres
rheu-
mati-
cae
cum
vel sine
catar-
rhalibus.

Versus medium Septembrem symptomatibus biliosis penitus evanescentibus rheumaticae affectiones successerunt initio catarrhalibus junctae, dein et solae dominabantur.

Pectoris dolores, tusses, raucedines, pleuritides, dolores capitis, ophtalmiae, otalgiae, odontalgiae, colicae denique et alvi obstipationes rebelles, atque lancinantes artuum dolores vel singulatim vel conjunctim affligerunt eos, qui laxiore donati compage frigido aëri se minus vestiti exposuerant.

Febristypum remittentis servavit, minor tamen cum remissione: pulsus fuit plerumque elatus, celer, et durus, ossa patrum, uti et lingua, pro varia rheumatica sede dolores varii.

Pectus tamen prae reliquis communius affectum fuit pleuritide rheumatica frequentiore. In his pulsus celer et durus, oppressio,

o, respiratio dolens a punctorio lateris
dolore, tussis sicca, dolor attactu auctus,
sepe extensus.

Venaesectione sanguis educebatur cori-
aceus cum levamine semel vel bis instituta,
valida cataplasmata multum leniebant dolo-
rem. Dolor rebellis vesicatorio, loco do-
lenti applicato, ut plurimum cedebat, ex-
hibito simul, et continuato copioso potu
molliente sambucino.

In colicis doloribus enemata emollien-
tia et cataplasmata, nonnunquam et venae-
sectiones necessariae erant. Difficiles erant
purgandi ductiones, saepe ne dupla quidem pur-
gantium dosis alvo promovendae sufficie-
bat. Pertinacior vero purgantium conti-
nuatio dolores augebat, veram creans en-
teritidem, nec tamen producebat expectatam
alvum. Balnea tepida, clysmata conti-
nuata cum potu calido, spasmus sedando,
et sudorem et alvum movebant, doloribus
mitato desinentibus. Decoctum malvae, in quo
manna duae solutae erant, perutile
mihi praestitit.

Inter-
mittens
nervo-
su.

Intermittentes tam tertianae, quam quotidianae, rarius tamen quartanae hoc mense observabantur.

In aegro quodam nervorum tremor, animi deliquia, cordis palpitatio paroxysmum quotidianum efficiebant, octodecim horas et amplius durantem: urina aquosa, alvus naturalis, lingua pastacea, mador sub finem paroxismi.

Postquam decocto radice salep tumultus nervorum aliquomodo mitigati fuerant, dedi arcanum duplicatum ad drachmas duas per diem cum drachma florum salis ammoniaci et eleosacchari menthae, atque ter quaterve per diem tres uncias infusi radice valerianae. Hac methodo alvus indies ter quaterve solvebatur, inordinatus nervorum motus quiescebat, et febris citissime depulsa est.

Haemorrhagiae quoque, haemoptyses, menorrhagiae, nariumque haemorrhagia hoc mense frequentiores.

Seniculae cuidam melancholia diu languenti e nare sinistra sanguis subito effluit

em-

mbolum, quo obduraverat narē chyrur-
s, ut ars beneficū naturae conatum non
hiberet, eximi jussi. Cum unciae sangui-
s fere duodecim effluxissent, spongiis
qua aluminosa madidis ulteriores haemor-
ragiae finem feci. Vetula per longum tem-
us solito jucundior mansit.

Non solum vero regnavit sed desaeviit <sup>Vari-
lac.</sup> orbus variolosus, jam per aliquot men-
s urbem depopulatus. Paucos infantes
secretae dimisere variolae, plurimi vero
tomalis et confluentibus pessimae indo-
poenas dederunt horribiles.

Die vix una decubuerant miselli, hor-
ore, calore, capitis, dorsique doloribus
vomitione conflictati, cum postridie
gmina pustularum erumperent, faciem
ectus et universum corpus pustulis profu-
rubris sine numero indesinenter succres-
centibus occupantia.

Eruptionis festinationi non responde-
at pustularum maturitas. Quinta sextaque
post eruptionem die nullum adhuc aderat
suppurationis indicium, sed plures pustu-
le in gangraenam abibant. Tumescbat
fa.

facies, ora adultiorum tenaci manabant saliva, juniores dyarrhaea torminosa affligebat. Pustulae e superficie cutis vix prominentes tangenti digito sensum quandam arenae imprimebant. Cavum narium et oris, lingua, velum palatinum, fauces et cavum omne laryngis, pharyngisque pustulis consita turgebant.

Inflammatione et tumore harum partium vocis, rauco, tussis, deglutitio difficilis, orthopnoea et multa similia mala nascebantur.

Qui in lectis degentes fovebantur sollicitius, majori indies pustularum numero cumulabantur loco nullo qui pluribus posse conseri superstitere. Tumor faciei, simul et inflammatoria, et gangraenosa sanguinis diarrthesis indies augebantur, color cutis rubro in rufum nigrescentem atrumque abibat: moriebantur miseri vera suffocatione, et gangraena universali septimo octavo, decimoque ab eruptione die.

Qui e contrario consueta frigidiori methodo tractabantur, lectis prohibiti aërique frigido expositi, sat bene quidem se habebant.

ere et alacres videbantur: facies iis minus
mescebat, orthopnaea, etsi prae rauce-
ne obmutescerent, vix laborabant; appe-
bant quoque, sed pustularum variolosarum
olumen manebat parvum: albescebat qui-
em earum cuticula, sed quae elevatae vi-
ebantur, vacuae erant, ita ut in nulla vel pu-
s vel humoris guttula reperiretur. Gangrae-
osarum interim major indies pustularum
umerus quae incisae sanguine dissoluto ma-
abant. Versus undecimam ab eruptione
iem stertor accedebat saepe subito cum tus-
convulsiva et sensim manifestioribus con-
ulsionibus. Mors dein duodecima, de-
ima tertia vel quarta ab eruptione die, uni-
erso corpore nigro, pure saepius paulo
nte vel post obitum ex oculis, naribus,
uribusque effluente.

Epidemia haec variolosa simillima est
ei, quam anno hujus saeculi trigesimo
quarto desaevisse illust. b. Swietenius ob-
servavit. Paeter consuetudinem mense
Novembri prioris anni 1789. variolae dis-
cretae regulares hac in civitate ac subur-
biis praeludebant: sequente Decembri au-
gebatur aegrotantium numerus. Mensibus
Januario, Febuario et Martio hujus anni

regulares et disjunctae manebant, aucto tamen indies aegrorum numero: Mense aprili non tantum aegrorum, sed et pustularum ut plurimum dissolutarum multitudine copiosior, regulariter adhuc percurrente morbo. Mensibus Majo et Junio confluentes irruebant, epidemia malignitate sua truculentior et copia moribundorum, mortuorumque major. In Junio atque Julio pustularum gangraenosarum majus indies incrementum: suppurationem procrastinatam putrida nunc excipiebat diathesis. Mensibus denique augusto et septembri acmen videntur attigisse et confluentia et putrida indoles.

Interim qui ab inoculatione variolas patiebantur mensibus Majo, Junio et Julio perfecte morbum superabant, pustulis paucissimis, iisque ad votum et stato tempore suppurantibus.

Unde haec variolarum malignitas et putredo ortum traxerit, statu coeli alias non insalubri, explicatu difficile est. Culpam enim nec in calorem, nec in humiditatem aeris nec in alios regnantes morbos conjicere possumus.

Insolita veris et aestatis siccitas calore
 in initio vehementissimus, tam frequens
 humorum malacia per reliquos etiam aestatis
 et prioris autumnii menses perdurans,
 est tantum veris calorem caniculari perio-
 do aer frigidior id unum sunt, quod aeri
 saluariae tribuere possimus.

Febres biliosae hoc tempore frequentes,
 sequentesque morbi ex raptu humorum ad
 cephalon manifesta sunt signa colluviei
 viarum a bile et succis intestina-
 rum acrimonia corruptis, atque propensio-
 nis humorum ad stasin in cerebro. Huic
 conditioni universaliter existenti si morbus
 contagiosus peculiaris adjungatur, certe
 non potest morbosa conditio in corpore nul-
 lenus otiosa in actum non duci, morbum
 vnum imbuere sua indole, et ex hac con-
 junctione insolita pessimaque gignere
 symptomata: forsitan et talia corpora ad
 recipiendum contagium variolosum magis
 erunt praedisposita.

Ast facta enarro, non solvo prople-
 ta. Quae adhibuerim remedia, quam
 curam, quamque proficuum invenerim
 methodum, jam breviter expediam.

Quam

Quamprimum morbus hic in domo quadam vicina pedem fixerat, ut praesentissimum adesset periculum, ne eos, quos antea non afflixerat, jamjam corriperet, facilis ad praeparationem erat persuasio. Praeparatorum vero ne unum quidem vidi virioliis obeuntem, etsi singuli confluentibus liberari non possent.

Corpora modo praeparabam sequentibus primas vias aliquoties depurabam eccopriticis purgantibus, alcalescentiam humorum putridasque primarum viarum sordes abacere conabar per abstinentiam a nimio carnalis usu: ad emolliendam corporis peripheriam, balneorum tepidorum usum suadebam interpolatis etiam pediluviiis tepidis, avertendum humorum raptum a capite, omnem denique usum spirituosorum praepropis dissuadebam, ne phlogosis nocivum conperet alimentum. Exhibebam praeter fructus horreos maturos pro lubitu, quoque et lacticinia, nihil vero commendavi diligentius, quam ut infantes aëri liberi per diem exponerentur.

Caeterum nil aliud propinavi: experientia doctus, mercurialia, antimonialia, alia.

liaque laudata antidota ante morbum ipsum
corpori sano ingesta nil boni, mali multum
producere. Venenum enim, in quod agant,
num non invenient, corpus ipsum sanum
aggrediuntur, et, quod sanius fieri nequit,
morbosum reddunt.

Sufficit, corpus ita praeparatum esse,
et sanum sit, fluidis solidisque pro ratione
etatis sanis, natura vegeta, nulla ad phlo-
sindispositione praesenti, cute denique,
uae maximum morbi furorem experitur,
mollita et ad suscipiendum et eliminandum
venenum adaptata. Qui plura agere ten-
ant, operam ludunt, et corpus reddendo
achecticum imminenti morbo blandiuntur
otius, quam resistunt.

Morbus accedens aegrum consuetis ag-
rediebatur symptomatibus, horripilatione
raga, calore, dedolatione, capitis, nu-
hae, dorsique dolore, vomituritione, vo-
nitu ciborum, glutinis, bilisque; nox in-
equens inquieta erat et anxia, facies flo-
escebat, calebant miseri, sudabant, distor-
quebantur oculi, subsiliebant manus, non
aro totum corpus convellebatur.

Observator paulo attentior haec morbi variolosi prodroma facile cognoscebat: hinc omnia disponere poterat et plurimis occurrere malis, alio modo vix avertendis. As ubi res angusta domi, nec medicus fuera vocatus auxilio, qui primos hosce morbi gressus dirigeret; nocte inter calores vehementes, deliria, et convulsivos insultu transacta, postridie modo pustulae apparerant in facie, collo, pectore, coloris dens rubicundi.

Quamprimum ex praedictis prodromi constabat, morbum variolosum adesse variolarumque instare eruptiones: extemplo totus apparatus refrigerans ad febrim mitigandam adhibendus erat. In primo nimirum ineunte variolarum periodo, quarum fermentationis periodum appellare mallet in febris imminutione totum consistit variolas mitigandi artificium. Fomes enim veneni variolosi se tum immiscet humioribus eosque in sui speciem commutat. Quo minor ergo motus, quo minori vehementi haec fermentatio peragitur, aut, quod idem est, quo minor haec febris est, eo mitius evadit, quod inde nascitur, novum fermentum.

Genuinus quidem hujus febris character inflammatorius est; ast aliam saepe, diversamque faciem induit pro varia humorum dispositione, pro varia constitutionis regnantis innatale: Haec febris anomalia diverso variorum ingenio imbuat necesse est. Inde fors variorum anomalia, inde diversus epidemiarum decursus repetendus erit.

Memor regnantis constitutionis, ad mitigandam hanc febrem eruptoriam triplicem summi indicationem. 1. orgasmum mitigandi; 2. acrimonias primarum viarum dirigendi et educendi; 3. humorum raptum a fonte avocandi.

Non praeparatis praeter usum aëris puri, et regimen frigidiusculum, ventrem leniter a colluvie biliosa et acri per vomitum emetico purgans: exhibebam solutionem mannatam, cui unum alterumve granum tartari emetici admiscueram, cochlearibus et partitis vicibus, ad vomitum bisterve vitandum, et alvum aliquoties educendam.

Praeparatis autem enema solvens injicere solebam, exhibita simul solutione mannae et lubricandam alvum.

Dabam praeterea copiosum potum theatum cum lacte, vel et lene emulsum nitrosum: tepida adjuungebam pediluvia, et calore nimio non remittente, applicabam plantis pedum synapismata.

Ubi rubedo major faciei, oculorum torvitas, pulsuum durities, carotidum vehementior pulsatio, somnolentia vel delirium aliaque aderant indicia accumulationis, stasesque sanguinis in cerebro, sine mora sanguinem educi curabam, adulterioribus venae sectione, parvulis hirudinum pone aures applicatione. Sanguine educto videbatur aegros ad se redire, refrigerari, febrisque vehementiam mitigari.

Quantum fieri poterat, aegrotos lecto prohibebam, sero etiam vesperi eundum erat cubitum. Somnus enim variolarum eruptionem, quam oportet imminuere, minus quantum promovet, augetque.

Ipsa adhuc eadem die febris hac methodo non parum mitescebat, infantibus redibat alacritas, amorque ludendi.

Qui vero prae nimia lassitudine lectum
reserere non poterant, iis non nisi pedes
abdomen tegebantur, reliquo corpore
nudo. Sedendum vero in lecto, non ja-
cendum fuit, ne horizontali situ raptus hu-
morum ad caput facilitaretur, unde vario-
rum in facie augmentum, et confluxus,
dolor capitis, et id genus funesta mala ori-
untur. Verissime enim asserit Sydenham:
Dies observatur morbum hunc magnum
estimari non pro variolarum frequentia,
sed pro reliquo corpore, sed pro earum nu-
mero tantum, quae faciem obsidere cer-
nuntur.

Continuabatur solutio mannata nitrosa
eruptionem usque. Tertia, raro quarta
die, saepe et citius pustulae apparebant in
capite, collo et pectore: Febris pro more
parum mitescebat: Continuabam leni-
ter eccoprotica et diluentia: aegri pedibus
nude tectis aeri semper aperto manebant ex-
positi, pediluvia calida renovabantur: adul-
ter et semicupia tepida adhibebam: enema-
ta solventia salina erant proficua.

Quarta post eruptionem die, febris sup-
puratoriae molimina ingruiebant horripilatio-
ne

ne et calore, ast multo minori solito: pustulae arenularum instar faciem praecipue, et corpus obsidentes non elevabantur.

Facies intumescere coepit, salivatio adultiores, dyarrrhaea molestare infantes: Pustulae durae manebant sine ullo suppurationis signo. Aegri conquerebantur de horripilatione continua: saepe artus prae frigore tremebant.

Praedicta methodo hucusque tractati, pustulas magis disjunctas habebant, magisque regulares: variolae elevabantur colore rubro nitescentes, sed et his multo tardior erat suppuratio.

In hoc stadio medendi methodo refrigeranti hucusque saluberrimae renuncians dum erat, et aditus aëri frigidiori praeccludendus, ne, febris continuo invalescente, pustularum omnino retardaretur suppuratio, e cujus suppressione vidi mala oriri funestissima, pure in cerebrum, pulmones, aliaque viscera delato.

Hac de causa aegri aut lecto detineri aut, id si nollent, bene vestiti esse debent:

ant: aër vero frigidior quam maxime abar-
endus erat. Sufficiebat nunc, alvum se-
nel per diem esse reseratam, quod enema-
e praestabatur: purgantia salina et omnia
refrigerantia nocebant. Exhibebam aegris
aepius per diem infusum aliquod gratum
epidum cum lacte, et pediluvia continua-
am calida. Hac methodo pustulae eleva-
antur, in suppurationem benignam brevi
beuntes.

Ubi vero post quintam, sextamve ab
ruptione diem pustula nulla suppurando
urgebat altius, nec apice albescenti distin-
guebatur, ubi tumida facies aspera grisea-
ue cutis superficie inhorrescebat, pustula
nulla emergente, frustra expectasses spon-
aneam naturae languentis operationem.
amphora sola, remedium unum instar om-
nibus stimulantibus, suppurationem promo-
ventibus semper et ubique palmam praeri-
uit. Dabam granâ ejus duo ad quatuor
per diem partitis vicibus: effectum postridie
is non respondente dosin augebam. Quam
primum vero vidi pustulas satis bene for-
matas, sed vacuas, externo fomento cam-
phorato ex mucilagine gummi arabici et
amphora parato partes has fomentabam,
et

et optato effectu aliquot horarum spatio, quae prius vacuae fuerant, pustulae nunc omnes pure desiderato turgescabant.

Integrum aegrotantis corpusculum quandoque linteis mucilagine hac camphorata imbutis involvi, nec unquam me de pustularum suppuratione sollicitum haec eam excitandi promovendique methodus fefellit.

Gangraenosas pustulas hac epidemia regnante frequentissimas statim aperui et expressi guttulam sanguinis, quae eas replebat, deinde locum affectum linteo mucilagine camphorata madido contexti eam postridie variola non sanguine sed pure manabat. Quae pus continebant pustulae iterum saepiusque aperiebantur; videbamus enim post aliquot denuo horas recenti easdem pure turgidas. Hac ratione metastases alias frequentissimae optime praecavebantur.

En totam adhibiti medicaminis summam, alvus durante suppuratione rara duriorque enemate indies injecto ducebatur, ultimi vero diebus adjuvabatur solutione mannata. Tempore exsiccationis purgationem alvum

con-

continuabam electuario lenitivo, vel alio
genus leni purgante.

Per longum tempus continuari debebant
nia purgantia. Unica haec erant ad mo-
stas depositiones impediendas, arcendas-
ne remedia.

Crusta faciei e suppuratione orta duri-
e sua puris exitum saepe impediabat, inde
artium subjacentium erosio, inde absces-
um cutaneorum formatio, et faciei de ve-
tustate periclitantis primordia. Necesse
ergo erat, crustam hanc cataplasmatibus
mollire et emollitam elevare saepius, ut
iri daretur exitus. Crusta decidua cutis
cataplasmatibus emollientibus supposita
continuo adhuc fovenda venit. Haec de-
formitatis avertendae methodus mihi videtur
robustissima.

Nascuntur enim hae deformitates ex eo,
quod faciei partes aliae crusta hac exuun-
tur, aliae vero eadem adhuc teguntur. Cu-
is libera epidermidem reacquirat, et natu-
rali rursus forma donatur; vicina vero, quae
crusta tenacius adhaerente adhuc tecta est,
pure inferius incluso eroditur.

Ac-

Accedit, quod interrupta cutis continuitate, vasa cutis, quae crusta libera est, vicina illi, quae libera non est, in interstitiis formam faciant inaequalem, et cum hanc ob causam aequaliter se distendere non possint, trabes, scrobulos, striasque efficiant, defoedationis futurae rudimenta. His omnibus obstat, dum cataplasmatibus calidis crusta faciei tota continuo fovetur, et emollitur, qua ratione brevi crusta decidit, et cutis renascitur aequalis nec crustae novae locus est. Sic plures servavi, quibus trabes et distorsiones naribus et palpebrarum modo minabantur.

Suppurationem quandoque nimis diuturnam, ita ut phthisis metueretur sero lactis omnium optime inhibui, cortice postea simul exhibito,

Post superatum malum saepe oriuntur abscesus metastatici eo quidem copiosiores, quo densius fuerat variolarum agmen. Virus variolosum hoc non facit, sed praesens puris affluentia, quae humores omnes in sui naturam convertit. Diathesin hanc purulentam felicius amovi, dum sacchari lactis drachmas duas cum drachma pulveris
cor

articiis peruviani bis per diem, serumque
ctis simul generose potandum exhiberem.

Numerus omnium hoc anno variolis
mortuorum in civitate est 1569. Hoc nu-
mero si infantes 356. anno aetatis primo
non superstites eximas, mortuorum in urbe
numerus est 121 in suburbiis 1092.

Epidemia haec, quae sub finem prioris
anni modo irruerat, et prioribus quatuor
mensibus nec imminui nec serpere videba-
r latius, mense Julio invaluit subito et
mense Septembri omni, quo potuit, furore
passata est, Octobri sensim desinens,
non in peculiari quadam vastissimae civita-
tis regione pedem fixit, nec locum sibi de-
git, in quem saeviret atrocius, sed om-
nes simul civitatis, qua late patet, regio-
nes suo exulceravit contagio.

Ista tamen suburbia, quae versus meri-
diem et occidentem sita sunt, plura plan-
terunt funera, respectu etiam ad popula-
tionem habitam, quam ea, quae ad Septem-
trionem et orientem jacent. Priora his al-
tera sunt: fors durante siccitate aër ibi
accior, et variolis fuit infestior.

Nu-

Numerus mortuorum quolibet mense sequens est.

Januario.	40
Ferbruario	37
Martio.	31
Aprili.	45
Majo.	58
Junio.	64
Julio.	119
Augusto.	216
Septembri	246
Octobri.	190
Novembri	100
Decembri	67

1213

356 Aditis par-
vulis infra
annum.

Summa integra 1569

Morbillis per totum annum non nisi decem mortui sunt.

Mortui hoc mense in civitate 1327.

Barom.			Therm.		V e n t i.			
ies.	alti.	med.	gradus medius		mane.	meridie.	vesperi.	
1	28dig.	0 lin.	+	0	9 $\frac{1}{2}$ gradus	o	o	o
2	27	10 $\frac{2}{3}$	+	0	9 $\frac{2}{3}$	o	o	o
3		11 $\frac{1}{4}$	+	0	9 $\frac{1}{2}$	o	o	o
4	28	0 $\frac{1}{3}$	+	0	9 $\frac{3}{4}$	o	o	o
5		1	+	0	10	o	o	o
6	27	11 $\frac{1}{2}$	+	0	10 $\frac{2}{3}$	o	S. p.	o
7		10	+	0	11	O. p.	S. m.	o
8		10	+	0	9 $\frac{2}{3}$	o	o	o
9		8 $\frac{1}{3}$	+	0	10 $\frac{1}{4}$	o	o	o
10		8 $\frac{1}{4}$	+	0	9 $\frac{3}{4}$	o	W. p.	W. p.
11		10 $\frac{1}{2}$	+	0	8	o	N. p.	N. p.
12		11	+	0	7	o	o	o
13		8	+	0	8 $\frac{1}{3}$	o	o	W. m.
14		10 $\frac{1}{2}$	+	0	8 $\frac{2}{3}$	W. m.	W. m.	o
15		11	+	0	12 $\frac{2}{3}$	W. m.	W. m.	W. p.
16	28	0 $\frac{1}{3}$	+	0	11 $\frac{1}{4}$	W. p.	W. m.	W. p.
17		2 $\frac{1}{2}$	+	0	7 $\frac{1}{4}$	W. m.	W. p.	o
18	27	11 $\frac{1}{4}$	+	0	7 $\frac{3}{4}$	o	o	o
19		10 $\frac{1}{2}$	+	0	10 $\frac{1}{2}$	W. p.	o	N. p.
20		11 $\frac{1}{2}$	+	0	7 $\frac{1}{2}$	N. p.	N. p.	N. p.
21	28	0 $\frac{1}{2}$	+	0	5 $\frac{1}{3}$	N. p.	N. p.	N. p.
22	27	11 $\frac{3}{4}$	+	0	3 $\frac{3}{4}$	o	o	o
23		11	+	0	4	o	o	o
24		10	+	0	5 $\frac{1}{2}$	o	S. p.	S. p.
25		9 $\frac{3}{4}$	+	0	4	o	o	o
26		9	+	0	7 $\frac{2}{3}$	o	o	o
27		9	+	0	6	o	o	o
28		8	+	0	4 $\frac{3}{4}$	N. p.	N. p.	N. p.
29		7 $\frac{3}{4}$	+	0	4	N. p.	o	o
30		7 $\frac{1}{2}$	+	0	3 $\frac{1}{4}$	N. p.	N. p.	N. p.
31		8	+	0	3 $\frac{1}{2}$	o	o	N. p.

Die 8, 12, 15, altitudo max. = 28 dig. 2 lin.

Die 20 altitudo minima = 27 dig. 6 $\frac{1}{2}$ lin.

Diff. = 0 dig. 7 $\frac{1}{2}$ lin.

Die 4 calor maximus = 0 + 10 grad.

Die 18 frigus maximum = 0 + 2 grad.

Summa = 0 + 12 grad.

Ini-

Initium mensis serenum erat, frigidumque: excepit hanc tempestatem calidior aër serenitate permanente. Nebula post medium mensem omni mane coelum obfuscabat, sole tamen per diem serenissimo splendente. Ultimis decem diebus indie pluvia cecidit sensim copiosior magisque nubila, humidum nunc aërem, frigidumque efficiens.

In nosocomium admissi sunt viri viginti duo et undecim foeminae; acutis viri sedecim, et sex foeminae decumbebant: mortui ex his unus phthisicus; ergo omnium trigessimus tertius mortuus est.

Singulorum morbi sequentes erant: synocha simplici, rheumatica levi inflammatoria febris juncta, laborabant sex viri et una foemina, rheumate erysipelatoso viri tres febre biliosa duo et una foemina: biliosa inflammatoria viri tres, et una foemina peripneumonia duo viri: enteritide una foemina: haemorrhagia uteri duae: phthisis denique duo viri: tertiana intermittens unus, arthritide unus: tinea adolescentulus, gonorrhoea vir unus.

Regnarunt hoc mense febres rheumaticae et inflammatoriae, variolis malignis fieri non desinentibus. Rheumaticae febres adultos sine numero in lecto detinuerunt vel purae vel bili acri, vel nervorum affectionibus junctae.

In rheumate simplici frigus breve per^{Rheu-} am alteramve horam durans excepit sta^{maticae} m calor humidus cum capitis gravitate, et^{simpli-} flore per artus, per latera pectoris, vel^{ces.} apulas lancinante.

Lingua his fuit initio pura, postridie bo muco obducta, cum oris pastaceo gustu; in quibusdam borborigmi oribantur et ermina ventris eadem die, cum alvodyrrhaeica tertia die. Febris deinde mitigabatur, et si ars vel levissima ad alvum sollicitandam concurrisset, integra solvebatur.

In quibusdam pressorius dolor occupabat pectus: in aliis caput praeprimis affectum erat, omnibus pulsus fuit mollis, unguis celer cum diutius durante diastole. Potus tepidus theatus ex infuso florum sambuci, aliusve herbae resolventis, vel emoli.

emollientis, cum cremore tartari affatim haustus, alvum laxam servabat, educebat pituitam, sudorem, in quem inclinabat jam ipse morbi genius, adjuvabat, sanitate brevi subsequente.

Morbus hic plerumque valde cito et facile finiebatur, ut potius ad ephemeram et catarrhalem benignam referri mereretur. Seniculi et debiles, vel qui jam diu ad rheumatismos proclives erant, paulo diutius et vehementius hac febre laborabant. Interim et hi diligentius potuum tepidorum et leniter purgantium usu facile morbum superabant.

Febres
rheu-
matico
inflam-
mato-
riae.

Saepe vero rheumati se adjugebat inflammatoria diathesis, parte quadam corporum conditione, et materiae morbificae acrimonia vehementius affecta. Cephalalgiae, anginae, peripneumoniae, et enteritides hoc mense non infrequentes fuerunt.

Venaesectio hic praeprimis indicabatur, eaque repetita, ad febris vehementiam sedandam: interim iudicio erat opus, ne arte ad evacuandam nimis propriae necessariae naturae vires adimerentur, nec acri rheu-
ma-

atico intimius in viscera nobiliora penetrandi potestas daretur. Sic viro rheumate inflammatorio simul et cephalalgicis doloribus vehementissimis affecto vena eadem die ter secta unciae quadraginta sanguinis eductae sunt cum crusta larga rheumatica. Dolor post quamlibet venae sectionem momento mitigatus incitaverat mecum, ut quartam venae sectionem eodem huc vesperi instituendam consuleret. Delirium instabat, subsiliebant tendines, visus erat huic rheumati proprius, undas mollis celler cum cunctante diastole. Offerebam ulteriorem venae sectionem in crastinum, suadebam quietem, lenem cacerem, potumque copiosum tepidum, et applicabam nuchae vesicans. Eadem nocte dolor copiosus erupit, quem somnus placidus subsequutus est: altero mane aeger nec dolorem sentiebat nec febrim, ulteriori, si praesentiebam, venae sectione supercanea.

Nervosae affectiones se quoque immiscebant rheumati. Partes doloribus rheumaticis affectae convellebantur, subsiliebant, et contractae manebant. Sic rios faciei, varios colli, brachiorum et

Febres
rheum-
matico
nervo-
sae.

et aliarum corporis partium musculos spasmodica hac affectione distortos observavi.

Dolebant aegri his ex partibus intolerabiliter, subdola vaguesque horripilatione per diem detenti, calebant noctu, sudabantque: postridie partes dolore affectae contractae erant. Sic faciem spasmodica istiusmodi musculorum contractione foede distortam in binis aegris miratus sum.

His iisdem aegris pustulae rubrae prurientes in tota corporis superficie, facie, collo, pectore, abdomine et artubus nascebantur. Aegris in lecto sudantibus minuebantur hae pustulae, imo abibant, eodem quo aëri se exponebant momento redeuntes.

Chronicum hoc malum erat, pluribus mensibus permanens; et dictae musculorum contracturae augebantur indies, nisi aegri debitae se curae subjicerent.

Calida herbarum resolventium infusa cum cremore tartari usitata in rheumate, minus efficacia erant hujus mali remedia, saltem minus cito ferebant opem.

Sequens methodus omnium praecellenter malum eradicavit: Aegro quotidie in llnëum tepidum per sesqui horam immiscebam, praemissa alvi purgatione, quater per diem moschi grana quatuor cum infuso radicis valerianae silvestris, uncia nitrum dimidia hujus radicis in libra aquae fividae per $\frac{1}{4}$ horae infusa.

Quorum ventriculo vel intestinis vel pulmonum bronchiis pituita adhaerebat peracior, iis kermetis granum dimidium doctuculibet moschi additum propinabam.

Primis modo diebus utilitatem hujus methodi perspiebam, nec diu integra moles hujus morbi sanatio desiderabatur: super enim copiosior et diuturnus inde oriebatur, quem ob infestissimum pruritum sic calidisque linteis diligenter abstergerabam.

Circa medium mensem vidimus plures Febres
dolos rheumaticas biliosis cruditatibus rheu-
matis: dolor vehemens aut caput aut pec- matico
occupabat: in multis simul aderant lau- biliosae
tantes artuum dolores, et facies insuper
va, oculi flavicantes, lingua flavo mu-

co sordida, et abdomen intumescens: quidam et vomituriiebant.

His aut emetica, aut emetico cathartica quantocius exhibui ex salinis remediis, quae et primas vias purgarent a colluvie biliosa, et sanguinis diathesin phlogisticam resolverent, sudorem simul proficuum elicientia. Vidi hujusmodi febrim ventre non expurgato in inflammatoriam abire chronicam, phthisi funesta terminatam.

Erysi-
pelata.

His adjungere possem erysipelata praecipue faciei, hoc mense frequentia. Acce rheumaticum et biliosum in hoc morbo sibi videntur divisisse dominium: utriusque videlicet symptomata simul aderant. In alterutro verum pemphygum observavum cum bullis in facie et brachiis, juglande non minoribus.

Salinis remediis continuo purgavi ventriculum et intestina, tepidum exhibui potum, retinui aegros in lecto, et sic septima die resolutio secuta est, licet unus omnium prima et secunda die vehementissim febricitaret cum delirio. Vesiculas aperui, et cute desquamata, ut et durante morbo aeg-

negros ab aëre frigidiori prohibui, cute
erysipelatosâ linteo sicco calidoque tecta.

Ex inflammationibus peripneumoniae
um lateris dolore frequentiores fuerunt,
ein et phrenitides et enteritides, et aliorum
bdominis viscerum inflammationes.

Venaesectiones repetitae, fomentatio-
es calidae emollientes, et totus apparatus
antiphlogisticus in his morbis indicabantur,
et brevi sanitatem restituebant. Decocta
amarindinata, serum lactis cremoraceum,
et similia, quae simul alvum purgabant,
raestantiora erant, quum illorum ope alvo
perta sordes morbificae citius expelle-
rentur.

Unica haec et sola methodus vehemen-
tissima in phrenitide mihi fecit satis, nec
opus habui ad vesicantia, stimulantia, ner-
vinaque confugere, quae tumultuario sti-
mulo turbassent naturae operam, et mortem
certius accersissent.

Sic phreniticus quidam solis venaese-
ctionibus et decocto hordei tamarindinato
optime convaluit, Medias inter convulsi-
ones, mediaque inter deliria pulsu tremulo

et ad debilitatem contracto, facie pallescente, urina pallida, animo volvens ac revolvens corporis juvenile robur morbi que brevitate, et profundum oculorum ruborem tandem ausus sum sanguinem detrahare quinques semper crustaceum, dato non nisi potu diluenti, et eccoprotico continuo. Octava die en sudor copiosus, alvus cocta pultacea, caput liberius. Nona die nulla febris amplius. Optime convaluit. Remanens in reconvalescente aurium susurrus venaesectione sexta, quae sanguinem dedit leviori adhuc crusta tectum, omnino sedatus est.

Febris
inflam-
mato-
rio bili-
osa.

Omnes hae febres inflammatoriae simul aliquid ex biliosis primarum viarum sordibus admixtum habebant. Furente licet unica phlogistica diathesi, aderat tamen flavedo in oculorum albuginea, et circa labia; et sordes albo-griseae vel flavae linguam coinquinabant.

Hinc solo emollientium usu protractus morbi terminus cito et feliciter attingebatur, dum lenia eccoprotica diluentibus fuerant adjuncta.

In quibusdam vero manifestior erat biliosae colluviei praesentia, ut respectus maior ad hanc, quam ad phlogosin habendus esset. Imo saepe ne minimum deprehensisses phlogisticae diathesios vestigium, quae superata febris biliosa, post plurimum lierum inedia, et salinorum, diluentiumque usum nunc in scenam redibat liberior, ametsi antea ne per somnium in mentem tibi venisset.

Vir robustus decima quarta octobris aegrotare coeperat, horripilatione quatuor horas durante, calebat noctu, e capite vehementer dolens.

15. Octob. 2 morbi die cephalalgia eadem: aderat nausea continua vomitus spontaneus magna virium debilitatio, facies, totumque corpus flavicans, pulsus celer durus. Admissus in nosocomium sumebat solvens, dein emeticum cum multo potu diuiente. Vomuit quinquies aeruginosa, purgavit decies.

16 — 3. Tussis oppressio pectoris: dolor lateris dextri, vomitum minus incommoda, sed os amarum adhuc, lingua flavo
mu-

muco obducta, urina intense rubra. Exhibetur decoctum hordei cum oxymelle: circa meridiem urgente tussi fit venaesectio; sanguis eductus rubellus est, et dissolutioni proximus: venaesectio aliquantum affert levaminis.

17 — 4. Flavedo oculorum magna, tussis, stertor, delirium, alvus bis, pulsus celer, mollis. Sumit decoctum hordei cum sale ammoniaco et oxymelle.

18 — 5. Eadem: stertor gravior, tussis magna: sputum biliosum ac tenax: noctu delirium: Continuat eadem medicamenta.

19 — 6. Stertor continuus: respiratio valde difficilis: pulsus mollis, celer, quandoque magnus, lingua sicca, fissa, os aphthae horridum, alvus bis, sputorum eadem conditio: continuat medicamenta.

20 — 7. Sputum copiosum flavum sanguinolentum, dentes sordidi.

22. — 9 Noctu sudor maximus; sputum flavum, compactum, tenax. Sumit
prae-

traeter decoctum hordei quater per diem
hermetis mineralis granum unum.

23 — 10 Sputum copiosum, alvuster
octa, sudor continuat.

24 — 11 Lingua purior, respiratio li-
rior, sputum copiosum flavum, flavedo
rior, pulsus elatior, minus celer.

25 — 12 Stertor adhuc, sputum mi-
s copiosum, plus virium, pulsus tardior
elatior.

26 — 13 Flavedo corporis nulla am-
ius, oculis adhuc parum flavis: lingua
rior humida; tussis pauca, respiratio fa-
lis, quandoque stertorosa: sputum faci-
; pulsus tardus, mollis, alvus bis cocta
altacea, urina hucusque intense rubra nunc
aturalis.

27 — 14 Vesperi absque causa visibili
bito tussitat, opprimitur pectus, caput-
ne gravatur, nox insomnis cum tussi sicca:
stridie eadem perdurant, rubet facies;
ulsus celer, elatus est. Datur ipsi infusum
annatum laxans: alvus inde sexies abs-
que

que levamine: nox altera inquieta cum tussi, respiratione difficillima, et cephalalgia.

29. — 16. Pulsus celer, elatus, durus, cum symptomatibus orgasmis perdurantibus. Sanguis e vena extrahitur ad uncias decem: brevi levamen oritur, crusta tenax sanguinem tegit: Sudor noctu subsequitur copiosus, omnia levans.

30. — 17. Febris aegrum deseruit subitoque successit reconvalescentia firma et constans. Quatuordecim diebus post sanus nosocomio valedixit.

Alius quidam decima octava octobris inceptat aegrotare: vigesima prima in nosocomium ducitur cum tussi, oppressione, dolore lateris, pulsu celeri, contracto, opisthotico, lingua alba.

22 Oct. quinta a prima morbi ingruente die. Perdurante hoc morbi statu, venae sectionem administro; et do purgans salinum. Sanguis eductus rubellus est, laxae consistentiae: oppressio eadem, lateris dolor idem: alvus per diem quater.

23.—6. Calor continuus, siccus, cephalalgia, pectoris oppressio maxima, tussis continua dolens, sputa pauca glutinosa: pulsus celer, parum compressus, lingua et eadem: alvus bis. Do ipsi decoctum ordei cum oxymelle: pectori applico emplasma emolliens.

24.—7. Tussis vehemens cum sputis paucis valde glutinosis: pulsus celer mollis: alvus bis: lingua minus alba, os minus pastosum. Continuat medicamentum hesternum.

25.—8. Nocte praeterita delirium: tussis, et oppressio eadem, pulsus celerrius, parum constrictus: alvus ter cocta. Tenaesectionem instituo. En! crusta nunc, et sanguis compactior atque imminutio oppressionis, et tussis. Noctu sudor levis et somnus pacatus: Dolor lateris fere nullus amplius.

26.—9. Omnia meliorata: sputa cocta, glutine mixta facili excernuntur tussi, respiratio libera est, pulsus mollis, fere naturalis, alvus ter noctu, et bis per diem cocta.

27.—10. Aeger est absque febris, et appetit, sumitque decoctum hordeï cum oxymelle per aliquot adhuc dies.

Prima novembris sanus e nosocomio dimissus est. Urina per totum morbi decursum clara mansit.

Variolae malignae grassari non desinunt. Petechiae earum pustulis non raro intersperguntur. Eadem, quam supra descripsi, methodus primas sibi vindicat. Regimen nimirum frigidius ante eruptionem et quam diu durat, suppuratione post incipiente, simul et perdurante ad finem usque regimen calidius, adjutis naturae viribus, et abacta in - et externo camphorae adminiculo gangraenosa humorum dissolutione.

Mortui hoc mense in civitate 1277.

Barom.			Therm.			Venti.		
es. alti. med.			gradus. medius.			mane.	meridie.	vesperi.
1	27	dig. 10 $\frac{1}{2}$ lin.	+	o	3 $\frac{1}{4}$ gradus	N. p.	o	N. p.
2	—	9 $\frac{3}{4}$ —	+	o	4 $\frac{2}{3}$ —	o	S. p.	o
3	—	9 $\frac{1}{2}$ —	+	o	6 $\frac{1}{3}$ —	o	W. p.	o
4	—	8 $\frac{2}{3}$ —	+	o	8 —	o	S. p.	S. p.
5	—	8 $\frac{1}{4}$ —	+	o	7 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
6	—	10 —	+	o	5 $\frac{1}{4}$ —	W. p.	W. p.	W. p.
7	—	11 $\frac{1}{2}$ —	+	o	4 —	o	N. p.	N. p.
8	28	1 $\frac{1}{4}$ —	+	o	2 $\frac{2}{3}$ —	o	O. p.	O. p.
9	—	1 $\frac{1}{4}$ —	+	o	5 $\frac{1}{4}$ —	S. p.	S. m.	S. p.
10	—	1 $\frac{1}{2}$ —	+	o	5 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
11	—	1 $\frac{1}{2}$ —	+	o	5 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
12	—	2 —	+	o	3 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
13	—	1 $\frac{1}{2}$ —	+	o	2 $\frac{1}{3}$ —	o	N. p.	o
14	27	1 $\frac{1}{4}$ —	+	o	1 $\frac{3}{4}$ —	o	o	W. p.
15	28	1 $\frac{1}{2}$ —	+	o	1 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
16	—	0 $\frac{2}{3}$ —	+	o	0 $\frac{1}{3}$ —	o	o	S. p.
17	27	11 $\frac{1}{4}$ —	+	o	0 $\frac{1}{4}$ —	o	S. p.	o
18	—	10 $\frac{1}{2}$ —	+	o	1 $\frac{1}{4}$ —	o	o	o
19	—	9 —	+	o	0 —	o	o	o
20	—	7 —	+	o	2 —	o	o	o
21	—	7 $\frac{3}{4}$ —	+	o	1 $\frac{3}{4}$ —	o	S. p.	S. p.
22	—	8 —	+	o	3 —	o	o	o
23	—	8 $\frac{2}{3}$ —	+	o	3 $\frac{2}{3}$ —	o	o	o
24	—	9 $\frac{1}{4}$ —	+	o	4 —	o	o	o
25	—	10 $\frac{1}{4}$ —	+	o	5 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
26	—	8 $\frac{1}{4}$ —	+	o	4 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o
27	—	8 $\frac{1}{4}$ —	+	o	4 $\frac{1}{2}$ —	W. p.	W. m.	W. m.
28	—	11 $\frac{1}{2}$ —	+	o	2 —	N. p.	N. p.	N. p.
29	—	10 $\frac{1}{5}$ —	+	o	1 —	N. p.	o	o
30	—	9 —	+	o	0 $\frac{1}{2}$ —	o	o	o

Die 29 altitudo max. = 28 dig. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Die 18 altitudo minima = 27 dig. 2 $\frac{1}{4}$ lin.

Differ. = 1 dig. 0 $\frac{1}{4}$ lin.

Die 17 calor max. = + o 9 grad.

Die 30 frigus maximum = — o 2 grad.

Summa. = + o 11 grad.

Coelum initio Mensis frigidum nubilumque fuit: frigore dein mitigato nebulosum mansit. Sol raro et non nisi binis vel tribus diebus emicuit: pluvia quinta et sexta, nix vero vigesima octava et nona ceciderunt.

In

In nosocomium admittebantur hoc mense quadraginta quatuor aegri, viri nimirum viginti et unus, foeminae viginti tres. Ex his marasmus duos sustulit, febris nervosa et phthisis pulmonalis totidem foeminas. Hinc mortuus undecimus quisque. Reliqui sani exiverunt.

Ex his laborarunt febre rheumatica et arthritica viri duo et una foemina; pleuritide duo viri, foemina una; peripneumonia duo viri, et tres foeminae; febre nervosa duo viri, foeminae tres: haemophthysia vir unus, erysipelate duo, et tres foeminae; angina foemina; febris quartana viri duo; phthisi duo viri, foemina una; hydrope duo viri, foemina una; scorbuto vir unus, foeminae duae; scabie vir unus, foeminae quatuor; scrophulis duo viri, totidemque foeminae gravidae quae feliciter partum ediderunt.

Morbi inflammatorii et rheumatici hoc mense fuerunt frequentissimi: quosdam etiam febris lenta nervosa corripuit. Hydropici et phthisici vitam languidam tandem morte terminabant. Variolae quidem adhuc sed mitigato furore per urbem dominabantur,

, comitesque habebant morbillos infantibus insidiantes : facile enim per refrigerium retrogresae, praesentissimo tenellos imponebant periculo.

E morbis inflammatoriis peripneumoniae, quibuscum lateris dolores saepe connecti erant, omnium fuerunt frequentissime, nec caruere periculo.

Initium hujus morbi mite erat, sentiebant aegri leves horripilationes, et calorem vagam cum tussi catarrhali, noctu sat tranquille dormientes; altera die lassi continuo ihuc horripilabant, aer quidam leviter frigidus pervadebat membra; incalescebat caput, genae magis solito rubebant. Considerabantur de gravedine, et anxia respiratione, tussitantes absque dolore. Hinc morbum febrim catarrhalem judicantes vix medicum accersebant, sumpto infuso quodam tepido ad transpirationem promovendam. Interim post noctem inquietam tertia die pejus se habebant; tussis erat molestior, tussiendoque dolebante pectore, respiratio erat cita, anhelosa, plerumque cum unctorio lateris dextri dolore. Prae debilitate lectum deserere non poterant. Pulsus erat celer, durus, compressus, lingua hu-

mida, levi mucō griseo tecta, os leviter
pastaceum, genae rubentēs, splendentes
oculi, mens presens, imo saepe alacrior
solito.

Tertia, quartaque die incipiebant ex
creare sputa tenacia, glutinosa, sanguine
striatim intermixto, indiesque magis fusca
atque, rebus agri prospere succedentibus, co-
piosiora et magis cocta.

Aegri quidem ad sudandum proclives
sed ante septimam diem nullatenus inde le-
vabantur, imo quo magis initio sudabant
eo pejus et diutius decumbebant.

Urinae erant fuscae in quibusdam cru-
dae, flavo-limpidae, nec ante septimam diem
mutabantur. Nubecula die septima ve-
octava fundum petens fausti erat ominis,
scilicet: aliquot post diebus sequebatur
resolutio.

Decima vel duodecima die febrilis aestus
coepit imminui cum sputis copiosis coctis
et pulsu, hucusque celeri, et compresso,
nunc elevato, majori. Sudor jam uni-
versaliter et copiose prorumpens, cum
uri-

ina sedimentum furfuraceo-lateritium fa-
ente, et alvo pultacea crisin indicabat.
egri non raro postridie morbo erant om-
no defuncti, quasi nulla unquam fuisset
pulmonibus labes.

Alii vero serius eripiebantur: aestus quidem
nsim remittebat, sed tussis et respirationis
fficultas, et expuitio materiae albo flavae,
utinosae, tenacis cum vespertino acces-
, pulsuque celeri, ac compresso permane-
ent. Hi e morbo acuto et gravi quidem ela-
si periculum tamen non effugerant; incide-
ant enim in malum chronicum; et phthi-
s pulmonalis jam jam foras pulsabat, ni-
accuratissimo regimine et assiduo reme-
iorum usu remanens pulmonum morbo-
diathesis corrigeretur.

Ast quidam illorum ne minimum da-
ant felicitis resolutionis signum. Continuus
manebat febris aestus, malum velut cu-
eus pulmoni infixum haerebat, et quae eji-
iebantur sputa gangraenosam illorum con-
itionem prodebant; foetida enim erant,
ascolivida, vel sanguinolenta, et carnis
utridae frustulis non dissimilia.

Extinguebantur decima septima vel vigesima die, mentis ad ultimum vitae habitum perfecte compotes.

In cadaveribus occurrebant pulmones in lympa coagulabili natitantes, qua et cavum pectoris redundabat: pulmones ipsi erant flaccidi, nigri, bronhiorum ramis spumant sanguinolentam, fuscam, foetidissimam continentibus; reliqua viscera erant sana.

Qui statim ab initio debitae se curae commiserant, brevi plerumque et levi negotio sanabantur. Pulsus primis diebus durus et compressus, atque respirationis celeritas antiphlogisticam pulmonum diathesin demonstrabant.

Quare sine mora sanguinem oportebat educere, crusta tenaci semper obductum. Venaesectio statim adferebat levamen. Deinde conducebat decoctum quoddam tepidum antiphlogisticum ex radicibus Altheae Salep, floribus Verbasci, vel herba ejusmodi emolliente paratum cum acido vegetabili, atque nitro.

Dolor et oppressio ut plurimum post aliquot horas redibant, febris perdurante: nec sanguis iterato educendus erat pro ratione doloris et respirationis impetatae, neque hic conveniebat vires aegri, sed potius morbi vehementiam pro norma petendae venaesectionis adsumere, multo minus respicere ad diem morbi. Juvenum aequae ac seniculis de vita periclitantis octies saepe imo decies venam secare coactus sum, sex, septem, et pluribus libris sanguinis spatio decem vel duodecim dierum extractis. Decoctum tepidum antiphlogisticum omni hora vasculatim sumendum dedi, unum nitri drachma una et aceti unciiis tribus per diem. Cataplasmata tepida pectori applicata multum dabant levaminis. Cataplasmata vero ex herbis sic dictis emollientibus parata, odorem spirabant aegris molestum: hinc non alia, quam quae ex mica panis vel farina erant, usu veniebant.

Purgantia vero eccoproctica remedia, prioribus mensibus adeo necessaria, jam statim ab initio exhibita nocebant, nisi biliosae et gastricae sordes manifestis se ostenderent indicibus: imo et tunc solis tamarina-

dinatis vel mannatis acquiescendum erat, et reliqua tempori et coctioni committenda.

Salina majori et continuata dosi exhibita irritando phlogosin plurimum augebant. Vapor tepidus aceti aqua multa diluti hālitu per os attractus hic saluberrimus fuit, neque novi aliud remedium, quo pulmonum phlogosis resolvatur efficacius prae-ter venae sectionem. Hic autem vapor non est continuo inhalandus, interromperetur enim praestantissimi vitae pabuli aeris vitalis assumptio: sufficit omni hora decem circiter haustibus vaporem hunc acetosum in pulmones derivari. Respiratio redditur inde liberior, sputa copiosiora et leviori copia excreantur, crispantur pulmonum vasa, lymphae impeditur exsudatio, et resolutio benigna phlogoseos adjuvatur.

Sanguine sputis striatim intermixto, praeter venae sectiones usum emollientium continuavi. Serum lactis cum succo citri vel aceto praeparatum et clarificatum non ingratum dabat potum, aegris strenue bibendum.

Morbo ingravescente, sputo tenacio prodeunte, kermes mineralis ad sputa e-

cienda multum juvabat. Cautus tamen ejus usus foret oportebat, ne nimia dosi ventriculus afficeretur, et tormina ventris, vel diarrhaea excitarentur cum majori pulmonum phlogosi et plenaria sputorum cohibitione. Hinc granum sufficiebat cum lapidibus cancrorum exhibitum omni bihorio, vel serius.

Sudores ab initio copiosi absque levamine aegri si per plures dies durabant, perniciosi erant, indicabant enim, quod pori exhalantes pulmonum non aliter ac pori cutanei jam nimis essent aperti, et lympham hanc coagulabilem nullo fors pacto resolvablem exsudarent.

Regimen jam paulo esset moderatius, potusque minus tepidi exhiberentur, necesse fuit. Emulsa ex seminibus papaveris, cucumeris, amygdalarum optime hic conducebant, nitro iis addito.

Urina illorum qui multa sudabant plerumque erat intense rubra; contra, qui minus sudabant, urinam in hoc morbo ad septimam, decimamque diem flavo limpidam excreabant.

His ultimis urgente nimia et inani tussi paregoricum vesperi datum noctem indulgebat tranquillam et sputa promovebat.

Febris si mitigabatur absque magna respirationis et tussis moderatione, signum erat, orgasmum quidem, impetumque humorum ad pulmones esse imminutos, obstaculum tamen ibidem adhuc, et inflammationem vel solam vel cum exulceratione localem remansisse. Manebat tunc eadem, quae supra, indicatio: serum lactis copiose potatum, et continuatum, et usus emollientium diligentissimus unicae erant mortis phthisicorum effugiendae remedia.

Febre inducias concedente, vasculum unum alterumve decocti corticis peruviani apyrexiae tempore sumptum naturae vires adjuvabat.

Quam primum vero sputorum immunitio cum febris vel anxietate aucta percipiebatur, illico abstinendum erat ab ulteriori corticis usu, solo sero lactis continuato.

Morbo ad decimam quartam diem absque ulla febris defervescencia protracto,
de-

leponenda erant arma ad phlogosin com-
bescendam hucusque adhibita. Viribus
nimiam jam prospiciendum erat, et lenta feb-
ris phthisica gangraenae, exhaustos et cito
certo rapturae, praeferenda. Perfectam
nimiam citamque resolutionem jam frustra ex-
pectares, dum pulmonum crasis tam diu-
urna inflammatione varie labefacta sit,
cum bronchia et cavum pectoris lymphas
coagulabili scateant, exulcerationibus hinc
inde modo subortis. Hic qui febrilem fu-
rorem domare tentat, oleum perdit, et ope-
ram, eoque citius accersit mortem, quae
acaciori nunc et lenta naturae opera, si non
repellitur penitus, saltem retardatur, mo-
do nutrientibus, demulcentibus, leniterque
excitantibus remediis vires naturae sanatri-
ces conserventur, et erigantur.

Decoctum radices polygalae amarae vel
peruviani initio suspensa manu ex-
hibitum, et sensim, quando febrilis ardor
magis deferbuit, majori copia cum lacte
sumptum et vires sensim erigebat, et so-
lida roborabat, fluidorumque morbosam
diathesin corrigebat.

Puella viginti quatuor annorum alias semper sana, decima Novembris coepit vehementissima corripì pleuritide, quarta die in peripneumoniam abeunte.

Octo venaesectionibus succesivis, sanguis emittebatur valde spissus cum crusta tenaci fimbriata. Decocta emollientissima ex radice salep et althea exhibentur continuo, cataplasmata pectori applicantur: nullum anxietatis, nullum tussis, nec febris levamen sequitur.

22. Novembris. Anxietas, viriumque debilitas summa adest, sputa glutinosa fusca os replent, quae ob tenacitatem excreari non possunt: genae circumscripto rubore splendent, reliqua facie pallida: pulsus celer, subsiliens, micans, et inaequalis est; omnia gangraenam praesentem denuntiant.

Quas componere non valeo funesta pulmonum turbas, novis nolo augere malis. Gratum aegrotae do potum ex sero lactis acetato, et auram exhibeo camphorae, gratum nimirum quater per diem.

23. Nulla mutatio.

24. Excreatio multo facilior.

26. Sputa copiosa glutinis foetidis-
imi, aestus aliquanto remissior.

28. Pulsus elevatur, aequalior est,
puta continuant.

1. Decembris. Dolens e femore tumor
urgit phlegmonodes, respiratio facilior
est, sputa copiosa continuant, spes est in
erolactis, et camphora.

3. D. Furunculus elevatur in femore
phlegmonodes: nunc et brachio idem mi-
natur tumor: febris mane remittit, respi-
ratio liberior est, sputa continuant.

6. Quatuor nunc furunculi prodeunt,
prior, qui suppurat, heri apertus pus co-
piosum dedit. Aegra maxime quidem ma-
cilentia est, et tussi vehementi vexatur, ast
respiratio libera est, sputa sunt copiosa,
et appetit. Sumit lacticinia et decoctum
malti cum camphora.

16. Furunculi 20 et ultra corpori insident, pus copiosum pro parte saniosum fundentes. Aestus febrilis vesperi adhuc redit, appetitus est vehementior, respiratio libera, in utrumque latus commode aegra decumbit, quod prius non poterat; sputa minuuntur, et bene cocta sunt. Continuat priora medicamenta cum lacticiniis.

1^{ma} Januari 1791. Major pars ulcerum cicatrisata est, reliqua adhuc aperta pus copiosum fundunt bonae consistentiae.

10. Torositas redit: ulcera fere omnia cicatrisata sunt, nulla tussis amplius.

Ultima Januarii. Optime valens, et torosa, lateque colorata. Sanitate constanti perfruitur aegra, ne vestigio prioris morbi remanente.

Certum est, adfuisse modo hac in aegra gangraenosum pulmonum statum, aut certe eum non longe abfuisse. Ulterior cura antiphlogistica evacuans hic aeque funesta fuisset, ac impetuosus antisepticorum et stimulantium remediorum usus: Vesicantia vellicassent naturam frustra, imo resorsp-

tio-

one alcalini salis putredinem auxissent: cortex, aliaque antiseptica tumultuario stimulo gangraenosam inflammationem promouissent, vitaeque flammulam alioquin laboriose micantem extinxissent penitus.

Quid enim vel quae methodus innotescit, quae subsecutam hanc purulentae materiae coctionem, ejusque per furunculos: ulcera prodigiosa evacuationem potuisset efficere? Nihil profecto est, quod hoc potuisset! Potuit autem natura nullatenus turbata, et non nisi lenibus pro aegrae debilissimae statu exhibitis nutrientibus defocillata tantum opus perficere.

Multi pariter hoc mense febris rheumatica et arthritica decubuere. Febris haec ^{Febris arthritica} priori jam mense caput extulerat, hoc vero mense tanto acutiores erant dolores, quanto fixior erat illorum sedes; articulis namque inherescebant, cum priori mense vagi per musculos errassent, locum continuo mutantes.

Horripilationem sat gravem duarum triumve horarum excipiebat aestus, vagusque membrorum dolor, sed eadem ipsa die,
sae-

saepe eadem hora sedem figebat in articulis carpi, digitorum, genuum, tarsi, aliarumve partium. Pulsus erat celer, durus, elatus; urina intense rubra, sudore adveniente, lateritia.

Juniores, temperamenti sanguinei, et qui nunquam morbis arthriticis affecti fuerant, levi negotio in principio sanabantur, dummodo lecto detenti calide foverentur, potuque tepido ex infuso florum sambuci, vel alius herbae resolventis diligenter affatim sumpto, transpirationem ac sudorem promoverent.

Immediate cum sudore liberalius erumpente dolores minuebantur, et pulsus in molliorem mutabatur, et tardiozem. Dolorem celeriter levabat roob sambuci, et acetum potui tepido junctum, deinde frictiones siccae calidae. Mador cutis aegrorum hoc methodo tractatorum, tam cito sequebatur cum dolorum levamine, ut ulterior medela fere semper supervacanea foret. Post duos tresve dies aegri morbo liberati erant.

Adulterioribus vero, et qui fibrae strictioris erant, aut cacochymicis, debilioribus

is, praecipue vero qui aliquoties modo mor-
bis arthriticos perpassi erant, item quorum
parentes hoc morbo saepius erant afflicti, qui
juventute rachitici fuerant, denique fœ-
minis quinquagenariis, quae alias menstruis
circis, et partu vel nullo, vel raro gavisae fue-
rant, his omnibus primo statim insultu mor-
bus erat gravior, dolores acutiores et fixiores,
artus dolentes tumescebant, inflammaban-
tur, et morbus diutissime miseros excru-
ciabat.

Omnia saepe membra adeo tensa erant,
ut aegri se ne movere quidem possent: Pul-
sus eratensus, durus, et sine ulla remis-
sione celerrimus, alvus constipata, noctu
dolores intendebantur, facies in dolorum
acerbitate rubebat, pallebat in remissione.

Duratio morbi varia, pro varia ae-
riorum ad arthritidem conditione. Sudor
quidem secunda vel tertia die accedens
cum urina lateritia dolorum levamen ad-
ferrebat, sed tumores articularum remane-
bant inflammati, motu vel minimo atroci-
ter dolentes: febris manebat, dolore sub
vesperum recrudescente. Ante vigesimum
diem raro febris haec deferbuit, optime licet
tractata.

Debilibus et seniculis ipsa tormenta dolorum solatio erant, quidam enim doloribus articulorum subito liberabantur, sed horrendo omine: sequenti enim momento partes interiores et nobiliores iisdem cruciabantur. Jam caphalaea, phrenitis, omniaque cerebri affecti mala, vel anxietates, tussis, orthopnaea, aut abdominalium viscerum affectorum dolentissima oriebantur symptomata, brevi funesta, ni lares consuetos resalutaret morbi furor. Nec enim locus est, quem non occupaverit, nec mala, quae non effecerit, retrogressa arthritica acrimonia.

Febre etiam remittente, tumores articulorum saepe adhuc remanserunt per longum tempus; dolor etiam saepe recrudit.

In quibusdam tuebant artus universaliter phlegmonotice, imo, debita cura neglecta, in suppurationem abibant.

Non paucis vero nullus oriebatur tumor, doloribus interiores et nervosas partes potius occupantibus. Sic coxendicum et lumborum dolores non raro hoc mense observavimus absque earum partium tumore.

Paer.

Praecipua hujus morbi sanatio in cura consistebat antiphlogistica. Remediis omnis palmam praeripuerunt venaesectiones, quibus sanguis crusta largissima, et flava semper tectus educebantur. Non erat haec crusta contracta fimbriata, et concava, ut in inflammationibus puris esse solet, sed plana, aequalis, flavescens, et digitum latum crassa. Qualibet venaesectio doloresaniebat, brevi recrudescentes cum pulsu febro, pleno, et celeri. Quapropter ad venaesectiones iterandas properandum erat, ratione tamen semper habita ad aegri constitutionem. Mittendo sanguine, si unquam alias, in hoc praecipue morbo prudentia opus est. Roastis, sanguine plenae iterata venaesectiones sunt necessariae, quo inflammatorii articulorum tumores citius resolverentur, nodis phisique obstaretur chronicis, nimiusque febris orgasmus compesceretur; Contra delictioribus, senibus, cachecticis vel morbum jam saepius perpessis ob crustam, vel vixamen momentaneum iterum iterumque sanguis sine funestissimo malorum comitatu vix unquam educebatur.

Ex neglecta debita sanguinis educatione cura antiphlogistica adolescentis alias

robustissimi brachium ultrumque horrendum in modum intumescere vidi, et suppurationem abire, tunica cellulosa totius in pus conversa, et musculis omnibus gangraenosis. Post multas aerumnas miser mortuus est.

Alius contra seniculus, exsiccatus arthritide universalis laborans ad quamlibet venaesectionem lenimen dolorum sentiebat, recrudescentium denuo post aliquot horas. Post septimam venaesectionem quinta morbi die peractam, se omni dolore ait esse liberum: tribus post horis convulsus per momentum, et subito moritur depositione materiae arthriticae ad cerebrum facta, cui vires vitae in pares erant extractendae.

Venaesectione ea, quae fit in ipsa parte affecta, nihil praestantius inveni, praecipue si apertura venae infra partem ipsam fieri posset. Sic a brachio superiori huiusmodi dolentibus consuetas in cubito venas, brachio vero anteriori affecto, carpo aperiendas curavi.

Tumentibus et inflammatis articulis, venae topica venae sectione omnium utilissime subveniebant sanguisugae, quarum conlures ad citam et expectatam inflammationis resolutionem applicare oportuit. Sic ex, octo, imo decem unitumenti articulo admovi sanguisugas, et ultra sesqui libram sanguinis eduxi optimo et praestantissimo effectum. Accedit, quod aegri minus inaequali, ac a consueta sanguinis per venae sectionem educatione, debilitarentur.

Praeter sanguinis emissiones antiphlogistica, purgantia, et decocta tepida diluentia, acescentia copiose exhibebantur. Manna, tamarindi, salesque medii purgantes in decoctis solventibus soluti huic scopo optime respondebant.

Primo morbi fervore parum pacato, infusum foliorum sennae, et radicis rhei cum salibus mediis, et multo robor sambuci potentius alvum purgabat, scilicet copiose, et materiem pultaceam, viridem, fermentantem, intestinum rectum acrimonia erodentem educebat cum maximo aegrorum levamine. Purgantia vero primis statim diebus exhibita irritamento inani al-

alvum sollicitabant, et inflammationem ac dolores augebant.

Nec diu nimis oportebat purgantibus insistere, parte enim affecta inceptam resolutionem ostendente, primaria et naturalis materiei arthriticae eductio sudor erat, qui intemperantiori purgantium usu interrumpebatur.

Serum lactis cum cremore tartari paratum et floribus sambuci calidum superfluum scopo solventi ac diluenti optime conducebat: alvus inde et sudor magno cum levamine sollicitabantur, praecipue robor sambuci vel rubi idaei addito.

Terrae Antimoniales gravi mole stomacho erant molestae: potius tartarus emeticus ad granum unum libris duabus decocti solventis inditus alterante et diaphoretica virtute conducebat.

Inter externa remedia epispatica et vesicantia principem locum obtinuerunt; haec enim inclinante parum inflammationis fervore locis dolentibus adplicata, quam ci-

ssime dolores sopiebant, gelatinosam materiem vesiculas implentem simul elicientia.

Male vero applicabantur vesicantia artibus tumidis et exterius inflammatis: haec enim inde magis intumescebant, et majori afficiebantur inflammatione et dolore. Cum enim vesicantium utilitas in extendenda topica inflammatione, et seri educatione consistat, palam est, eadem in parte non inflammata applicanda esse, ut irritatione hac nova partis sanae et externae irritatio morbosa partium magis internarum vel nobiliorum avocetur.

Sic in capitis, pectoris, lumborum, articularumque corporis partium dolore rheumatico parti vicinae non inflammatae vesicantia immo cum fructu fuerunt adplicata. Vesicantia, ut optime Cotunius observavit, statim saepe plagam dolore liberabant, dolore ad inferiores partes retrogresso: immo et huic loco novum erat applicandum vesicans; dolore jam iterum magis ad interiora regresso, iterum vesicans imo quater non raro vice profundiori semper parti applicandum erat, usque dum quasi per unguitum apices dolor evasisset.

R

In.

In senibus, debilibus, et in iis, ubi erratici dolores arthritici saepius mutabant, vel jam mutare videbantur, vesicantia et epispastica locis ipsis minus nobilibus applicata dolores his locis magis affigebant, et, quo minus ad interiores partes retrocederent, impediabant.

Quibus licebat balneis uti calidis, caeteris citius morbo liberabantur: sed erant tempore nunc hibernali balneis conjuncta ejusmodi incommoda, ut paucissimi his uti possent.

Depositiones materiei arthriticae optime avertebatur vesicantibus ad loca prius affecta, et sanguisugis ad loca, quibus morbi depositio impendebat, applicatis. Ulcera depositionum pus ichorosum dabant, et vix aut ne vix cicatrisabantur. Unguentum digestivum cum extracto cicutae omnium optime conducebat.

Febre et inflammatione sedatis dolores saepius diu adhuc permanserunt per mensum et ultra, in varias partes involantes, tumoribus etiam, nodis, tophisque subortis.

Hac occasione varia tentavi antarthritica: extractum aquosum gummi guajaci adrachmam unam per diem exhibitum saepe praestans fuit hujus mali remedium. Solutio spirituosa calores fere semper excitavit, febrem, uti ejus miscela cum gummi arabico et aqua hysopi mobiliores aegros caecit, auxitque dolores.

Extractum aconiti ad grana quatuor, et octo imo et majori dosi sensim aucta per diem exhibitum de multis bene et praestare meruit. Sudore suaviter elicit, tumoribus residuis, simul et doloribus efficaciter obstabatur.

A calomele egregios quoque effectus perertus sum: lancinantium enim dolorum quodquas brevissimo tempore dissipat, et cachymiam arthriticam penitus extinguit.

Vir erat viginti novem annorum arthritidis doloribus non raro affectus.

13. Novembris in febrim arthriticam incidit, cum inflammatis et tumentibus tarsi et carpi ejusdem lateris articulis.

Peracta venaesectione, sanguinem coriaceum emittente, post decocto purgante cum roob sambuci sumpto, potuque copioso calido sudavit, purgatus est cum sanatione carpi. Sed pes continuo tumebat et dolebat.

14. Venaesectionem in eodem pede affecto infra locum ipsum tumentem instituo. Inde dolor et tumor imminuuntur subito.

15. Pedem absque dolore leviter movere potest aeger: hinc febre adhuc fervente repetitur in eodem loco venaesectione, et continuatur decoctum sambucinum cum arcano duplicato et roob sambuci.

16. Detumuit pes, sed dolet adhuc dolet quoque carpus sinister, febris minor est, sudor continuus.

18. Metatarsus adhuc tumet; dolor in exteriori poplitis parte fixum sibi locum elegit, descendens per suram retro malleolum externum ad digitum pedis quartum, quiescere et movere nequit aeger, motu reliquorum digitorum libero. Continuat medicamentum sambucinum cum sale.

20. Sudor continuus, et alvus terque
que per diem; febris minuta: sub poplite
locum doloris vesicans applico.

22. Dolor a poplite recessit, in sura
nunc furens pone malleolum externum. Ve-
sicans et huic loco applicatur.

24. Dolor hinc effugit, in tarso nunc
kus; applicatur tarso vesicans.

26. Fugatus et inde dolor, irruit in di-
gitos pedis tertium et quartum; applicatur
ad radicem horum digitorum dolentium
vesicans.

28. Victo penitus fugatoque dolore, ve-
santia priora sanantur: sed sinistra manus
olet, tumetque pes sinister, motu simul
impedito. Sumit aeger continuo decoctum
ambucinum cum roob sambuci, et arca-
o duplicato.

30. Pes aegri continuo sudantis detumuit:
terim dolor quandoque saevus per pedem
brachium sinistrum vagatur.

2. Decembris. Febris nulla amplius, sed dolor lancinans noctu praecipue furit, per diem mitior: caelo quoque ventis agitato major est. Tarsus et carpus, quandoque et os ischium lateris sinistri dolore afficiuntur.

Sepositis hucusque usitatis remediis salinis et sambucinis, do grana duo calomelias cum conserva rosarum in pillulas formata secundum methodum Fothergillii omni vesperi sumenda.

9. Levamen a pillulis se sentire asseri aeger; dolores minores sunt.

His pillulis, spatio trium septimanarum continuatis, integre sanatus est aeger: tumor reliquus evanuit, et ne minima quidem remansit in partibus affectis debilitas. Vivit etiam hucusque sanus, nec, quibus hucusque valde fuerat obnoxius, a rheumaticis et arthriticis affectionibus ab hoc tempore incommodi quidquam passus est.

De feбри nervosa maligna, hoc mense in scenam prodeunte, futuro dicam hoc libentius, quo frequentior ejus et lethalis observata fuit praesentia.

Mortui hoc mense in civitate 1154.

Barom.			Therm.			Venti			
Dies.	alti.	med.	gradus medius.			mane.	meridie.	vesperi.	
1	27	dig. 9 $\frac{2}{3}$	lin.	+	0	2 $\frac{2}{3}$ gradus	S. p.	0	S. p.
2	—	—	9 $\frac{1}{2}$	+	0	5	0	0	0
3	—	—	11 $\frac{1}{2}$	+	0	5 $\frac{2}{3}$	0	0	0
4	—	—	7 $\frac{2}{3}$	+	0	6	0	W. p.	W. p.
5	—	—	7 $\frac{1}{4}$	+	0	4	W. p.	W. p.	0
6	—	—	10	+	0	1 $\frac{1}{2}$	0	N. p.	N. p.
7	28	—	0 $\frac{2}{3}$	+	0	0 $\frac{1}{2}$	N. p.	N. p.	N. p.
8	27	—	9 $\frac{1}{3}$	+	0	0 $\frac{1}{2}$	0	N. p.	N. m.
9	—	—	9 $\frac{3}{4}$	+	0	0 $\frac{1}{4}$	N. p.	N. p.	N. p.
10	—	—	11 $\frac{2}{3}$	+	0	0 $\frac{1}{2}$	N. p.	N. p.	N. p.
11	—	—	11 $\frac{1}{2}$	+	0	3 $\frac{1}{3}$	W. p.	W. p.	W. p.
12	—	—	11	+	0	4 $\frac{1}{2}$	W. p.	W. p.	W. p.
13	—	—	11 $\frac{2}{3}$	+	0	3 $\frac{2}{3}$	0	W. p.	0
14	—	—	8	+	0	4 $\frac{1}{3}$	0	W. f.	0
15	—	—	9 $\frac{1}{2}$	+	0	4	0	0	0
16	—	—	8 $\frac{1}{2}$	+	0	4 $\frac{1}{2}$	0	0	0
17	—	—	4	+	0	4 $\frac{1}{4}$	0	0	0
18	—	—	3 $\frac{1}{4}$	+	0	5	0	N. p.	N. p.
19	—	—	6 $\frac{1}{4}$	+	0	3 $\frac{1}{3}$	W. p.	W. p.	0
20	—	—	8 $\frac{2}{3}$	+	0	2 $\frac{1}{2}$	0	0	0
21	28	—	1 $\frac{1}{3}$	+	0	1	0	0	0
22	—	—	1 $\frac{1}{3}$	+	0	0	0	0	W. p.
23	—	—	0 $\frac{1}{4}$	+	0	2	0	0	0
24	27	—	11 $\frac{2}{3}$	+	0	2 $\frac{1}{4}$	0	N. p.	N. p.
25	28	—	0	+	0	2	N. p.	0	0
26	27	—	11 $\frac{1}{2}$	+	0	1 $\frac{1}{2}$	0	N. p.	W. p.
27	—	—	10 $\frac{1}{2}$	+	0	1 $\frac{1}{3}$	0	0	0
28	—	—	10 $\frac{1}{3}$	+	0	0 $\frac{1}{2}$	0	0	0
29	28	—	1 $\frac{3}{4}$	+	0	0 $\frac{1}{4}$	0	0	0
30	—	—	1 $\frac{2}{3}$	+	0	0 $\frac{1}{4}$	N. p.	0	N. p.
31	—	—	1 $\frac{1}{4}$	+	0	0 $\frac{3}{4}$	0	0	0

Die 29 altitudo maxima = 28 dig. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Die 8 altitudo minima = 27 dig. 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Diffe. = 1 dig. 0 $\frac{1}{4}$ lin.

Die 17 calor maximus. = 0 + 9 grad.

Die 31 calor minimus = 0 — 2 grad.

Diffe. = 0 + 11 grad.

Men-

Mensis hic Caelo continuo fere sereno et insueto frigoris moderamine se distinxit.

Paucioribus quidem, ast gravibus et insolitis miseri mortales eo durante morbis conflictati sunt, febri nimirum lenta nervosa adulti, et febri exanthematica infantes; dein et haemorrhagiae varii generis, rheumatismi, atque variae affectiones catarrhales ad superiora mala accesserunt.

Febris
lenta
nervosa

Descriptionem febris lentae nervosae non aggredior plenariam, cum grafica ejus ab Huxhamo delineata descriptio cuique medico nota sit. Addam solummodo quaedam peculiariora, quae in hac potissimum febri observavi.

Initio haec febris typum quotidianae intermittentis servavit, vario tempore apud varios accedentis cum frigore, calore, sudore et urina lateritia tres, quatuor, etiam sex horas durantis. Aegri simul Apyrexiae tempore de dedolatione artuum, de ructibus, de ore amaricante conquerebantur. Praecipuum vero omnium symptomatum omnibus aegris commune fuit dolor occipitis pressorius, gravisque, os occipitis integrum,

grum, saepe et partes ossium bregmatis posteriores occupans: Pulsus erat celerior naturaliet strictus, fere durus, lingua in fundo leviter flava, et abdomen parum elatum.

Interim aegri exhibant apyrexiae tempore, laboribus consuetis fungentes: tribus, quatuor, sexve diebus post symptomata indies ingravescebant, et febris in continuam continentem abibat, nullo amplius horrore, nullo sudore, imo ne ulla quidem remissione accedentibus. Quaedam puella per octo dies quotidiana hujusmodi intermittente febris affecta fuerat. Tale initium in omnibus, qui hac febre laborarunt, observavi, in iis etiam, quibus contagio fuerat infusa.

Aegri continuo de occipitis dolore pressorio conquerebantur, quidam etiam de dolore capitis tempora perterebrante: quidam de statu morbi per anxii, quidam contra incuriosi, omnes verò memoriae labilis erant, et stupidae mentis, amaricantem et nauseosum oris saporem accusantes et vomituri: Vomitorio sumpto non nisi mucum inanem, vel aquam evomebant.

Plu-

Pulsus erat continuo celer, strictus, post aliquot dies subsiliens, irregularis, celerimus: in omnibus aegrotis 100, 120, et plures ictus faciebat quolibet minuto, nunquam neque diurno neque nocturno tempore celeritate remittens.

Inquietabant plerosque tremores artuum, subsultus musculorum, tendinumque, et somni vigiles: alii somno sopiti erant continuo, expergefatti vero oculos aperiebant, ad interrogata respondentes, sed momento post in pristinum relabebantur soporem. Initio continuus aurium tinnitus delirii venientis erat prodromus, nec longe aberat surditas perfecta: Alii anxii et oppressi, tussi omnino sicca molestabantur.

In omnibus vero aderat coryza levis, aegri emungebant parum sanguinis compacti cum muco sanguinolento. Lingua erat griseo muco impura, urina sanorum erat, flava, clara; sitis nulla, appetitus nullus; ita ut interrogati, quid ipsis deesset, quidve cuperent, vix noverint respondere: Singulatim interrogati, an caput doleret? exploratione prius per elevationem et motum

capitis facta, dicebant, illud esse ponderosum, occiput, et tempora premi. Interim oculi sanguine suffusi, leviterque inflammati, lucem non ferebant.

Post decimam sextam vel etiam vigesimam diem hinc inde in pectore, et circa collum milliaria alba apparebant paucissima, vix unquam plura prodibant, postridie rursus disparentia: sopor sensim gravior, profundior, tremores vehementiores continui, pulsus obscurus, irregularis, continuo debilior, celerior; alvus involuntaria foetidissima, carphologia, sudores copiosi, inutiles, delirium mite lentam morbi ad mortem properationem comitabantur.

Accedebant sub finem sudores frigidi, viscidi, stupor continuus, decubitus inflammati, in gangraenam cito abeuntes; functiones naturales omnes paralyticae; lacrimae involuntariae, puris apparentia in cantho oculi majori: tandem mors continuas inter convulsiones, sopore continuato, accedebat vigessima quarta, trigessima, quadragesima, imo sexagesima die.

Morbum hunc feliciter superabantii, qui versus decimam, decimam quartam, decimam septimam, vel vigesimam diem diarrhaea affliciebantur; in his febris sensim minuta remissiones faciebat, inque veram intermittentem, tertianam vel quotidianam abibat, cerebri affecti symptomatibus indies magis magisque evanescentibus.

Funestissimus hic morbus variae aetatis, variique temperamenti ac sexus homines aggressus est, sexuitamen sequiori funestior. Contagiosus erat, vidique familiam integram, ex qua filiola prima ejus cadebat victima, cum hoc morbo luctantem.

Post mortem plurimorum nares pure manabant.

In cadavere viri cujusdam hac febre die vigesima quinta mortui, inveni vasa meningum cerebri praecipue sinum falciformem, et sinus tentorii sanguine nigricante scaturientes, membranam, quae sellam turcicam tegit, colore lividam, ichorosam aquam quantitate unciarum duarum infra lobos anteriores cerebri, sanguinem universi corporis dissolutum, pulmones sanguine plenos,
per-

perponderosos, intestina hinc inde livida, alia viscera omnia sana.

Adultos, viros, foeminas, robustos, et debiles, hoc quidem morbo affectos vidi, at plerumque erant debiliores, curis, laboribus, vigiliis, inedia exhausti. In phlegmaticos sexumque sequiorem morbus hic minus erat placabilis.

Hac quoque ratione contagium, quod impune non contemnebatur, afflabat potissimum illos, qui diu noctuque propius aegrum; lento ejus fato longiori tempore ingemiscentes, lintheamina excrementis putridis per decem et plures dies involuntarie dejectis conspurcata cum mundioribus commutabant, plenoque putridos halitus inhauriebant respirio.

Causae hujus funesti morbi in intima corporis nervorumque compage latitantes, vix aut ne vix erui poterat. An a solidorum laxitate, tenuitate sanguinis, aut lymphae lentore ortum trahat, ut Huxham autumat, incertum est. Sanguis vero in initio fere semper compactus, et crusta tectus apparuit.

ruit. Cerebrum, nervorumque principium hoc in morbo effecta esse, dicunt omnia.

Interim an tota ibi resideat causa, an et primae viae, et bilis suam ad hanc traegediam conferant symbolam, problema est. Fors vomitus isti frequentes sola affecti cerebri symptomata sunt, et dyarrrhaea tempore critico ut plurimum accedens coctionis universalis criticaeductio est, cum et urina simul sedimentum largum deponat. Certum vero est, naturam longo hic indiguisse tempore et assiduo labore, usque dum varios inter motus convulsivos materiam morbi per sudorem et alvum critice ejiceret.

Frequens et in omnibus fere aegris observatus e naribus emunctis exiens mucus sanguinolentus non obscurum sanguinis in capite stagnantis, et inflammationis ibidem latentis signum est: item salivatio sub finem morbi superveniens, optatum morbi, resolutionem feliciter jam tandem molientis, indicium.

Interim prognosis semper anxia fuit, et quaecunque excogitata et electa fuerit mendendi methodus, ars hoc in morbo dubia
sem-

semper victoriae triumphum canere non
audet. Cui methodo palmam adjudicem
adam breviter.

Initio primas vias emetico et purgante
seniori evacuavi. Educebatur inde per os
mucus aquosus, parum amaricans, in qui-
usdam ciborum ingluvies. Vomituritio
ost vomitum non semper imminuebatur,
et oris amarities, saepe per integrum mor-
bi decursum continua. Interim initio mor-
bi sufficiebat, levi remedio primas purgas-
se vias a sordibus mobilibus. Ubi enim ob
febris intermittens typum gastricae sordes
in causa credebantur, et repetita exhibe-
bantur emetica et purgantia, emesi, ac
lyarrhaea inani nil praeter aquam et mucum
inertem prodibat, accelerata febris, debi-
litate aucta, et nervorum tumultu graviori.

Enemata incidentia optimo cum effectu
solum segnem evacuabant: prodibant in-
de septima modo die foeces foetidissimae
liquidae: interim et in hoc casu purgantia
saepius sumpta nocebant, cum vires magis ex-
aurirent. Plenaria foecum eductio relin-
quenda fuit naturae, sua sponte coctam
morbi materiem lente educenti

Saepius in cursu morbi spontaneus materiei glutinosae, biliosae aeruginosaeque vomitus accedebat; hunc leni emetico juvabam prospero eventu. Hinc et sola vomituritio, aut amarities oris fortior, dolor, et pressiones ad cardiam, aliaque ventriculi colluvie repleti signa indicabant in medio morbi cursu emeticum, quod cum magno levamine perversam morbi materiem educebat.

Evacuatis primis viis solventia et diluentia medicamenta propinavi. Spiritus mindereri optime omnium conducebat, penetrante sua et solvente virtute: verum pro ratione majoris, minorisve aceti acredinis varia quantitate dandus erat, unciae duae per diem plerumque sufficiebant in mixtura ex aqua quadam destillata grata non stimulante cum syrupo et nitri drachma dimidia.

Fortiora antiseptica certo nocebant: nec camphora, aliaque stimulantia initio proficiebant; febris enim effervescebat vehementius, et convulsiones accelerabantur. Potus diluens grate acescens et nutriens ad curationem praecipue contulit. Serum lac-

s decoctum hordei, et malti ad hunc scopum prae reliquis accessere propius. Sanguinis eductio statim ab initio morbi administrata, capitis dolorem et oppressionem multum levavit: sanguis etiam eductus plerumque fuit crustaceus. Ast cavendum fuit repetita venae sectione, secunda enim sanguinem quidem levi adhuc crusta tectum, tertia vero omnino dissolutum exhibuit cum maxima et irreparabili virium jactura. Hiendinum pone aures applicatio et scarificationes sanguineae ad nucham feliciter produxerunt effectum, nec vires adeo ademerunt. Praecipue vero scarificationes ad nucham duplici scopo proderant, sanguinis mirum phlogistici topica eductione, et irritatione ad verticem vicinum facta, unde vulsio salutifera, et eductio e loco nobiliori perficiebatur.

Vesicantia pone aures et ad nucham nunquam omittenda, sed statim ab initio morbi applicanda erant, et ulcera eorum per totum morbi decursum aperta servare oportebat, ut hic in parte minus nobili continua fieret irritatio ad eliciendam morbi materiam, et ad internam irritationem exterius locandam.

Febri in continuam mutata, et sopore nunc vel alio accedente capitis affecti symptomate, lenia irritantia nervina exhibenda erant. Moschus hic inter alia excellerebat cum croco ad grana quatuor vel sex omni sexta vel octava hora datus, imo et saepius pro majori minorive mali conditione. Infusum florum arnicæ, et radice con-trajervæ bonos quoque præstabat effectus.

Ab omnibus vero spirituosius, omnibus fortioribus antisepticiis et adstringentibus febris exardescerebat vehementius, et capiti calores, doloresque augebantur, anxietates, inquietudines, oppressiones, auriur-tinnitus, et surditas, et alia, quae e rap-tu humorum ad præcordia, et encephalo-oriebantur symptomata, in pejus ruebant. Camphora ad unum vel duo grana exhibit solvente quidem virtute nervina pollebat, ast a moscho præstantiorem certioremq; videor observasse effectum.

Vapor aquae tepidae naribus attractus promovebat emunctionem muci sanguinolenti, Erectus corporis situs, atque aer renovati frequens et liberior inspiratio ac grotos multum refocilabant.

Dimidium vero sanationis absolvitis, qui aegris animi tranquillitatem alacritatemque conciliare novit, eosque hoc in statu conservare.

Potus quidem copiosus dari oportuit et diluendum, ad sustinendam diaphoresin, et ad detrimentum maligni laticis nutritivibus succis resarciendum; sed non minus una vice exhibendus erat, nec tantum copia, quanta in aliis acutis requiri solent. Sic et calidus potus nocebat, sudorem ventris oppletionem augendo. Vidi enim nimis sedula potuum calidorum exhibitione funestissimos effectus. Potus moderate frigidus et palato aegri et naturae blandiebatur,

Saepe tussis aderat magna molestaque: saepe ad eam accedebat pectoris oppressio, omniaque superveniebant peripneumoniae signa medio quandoque in morbi decursu, cum pulsus elevatione, durtie, et respiratione cita ac suspiriosa. Raucedo quandoque tanta erat, ut vix vocem emittere possent, eaque ad finem usque perdurabat, cum vox copiosa denique sputorum excretionem rediret. Inflammationem pulmonum

hic adesse negari non potest, sed ejusmodi erat conditionis, ut sanguinis eductio et reliqua antiphlogistica methodus funestissimum hic sortitura fuisset eventum. Vapor aquae tepidae, tantillo aceto affuso, ore haustus multum hic praestabat levaminis. Vesicans inter scapulas spasmus pectoris cum acri irritante exterius trahebat. Continuata denique solventia et diluentia remedia sensim et pulmones liberabant ab acredine, et benignam ibi resolutionem coctionemque efficiebant.

Tussis haec et peripneumonia sinu medio in morbi cursu supervenirent cum capitis dolore minuto, faustissimi erant ominis, jam enim per sputa faciliior erat evacuatio. Sed malignus hujus morbi generis is erat, ut si per aliquot horas desaeviisset, statim iterum priori furore saeviret, nulla ratione cohibendus. Ubi vero una cum novo malo capitis affectio in eodem manebat, aucto morbi dominio, pessima erat res augurii. Augenda jam erat cardiacorum dosis.

Pustulae oris et apthae frequenter in hoc morbo superveniebant. In

unctio cum mucilagine seminum cydonio-
um, cui et aliquot vitrioli guttulae ad gra-
m aciditatem fuerant instillatae, omnium
optime pustulas has sanabat; quae ubi ap-
aruerant, frequentissime morbus saliva-
one terminabatur, nisi prius mors vitae
lum abrumpisset.

Quam primum febris remissionem fa-
ciebat, id quod decima quarta, decima sep-
tima, vigesima die accidebat, et urina,
ucusque semper pallido - flavicans, turba-
batur, spes quaedam affulgebat: sudor
nim copiosus et levans incipiente remissio-
ne oriebatur, quotidie copiosior, et satis
magna coctae materiei copia, in quibusdam
tera scibala dura, per alvum educebantur;
ubi tamen et ab initio et per totum morbi
tractum alvus quotidie bis vel ter aperta
fuerat, claro indicio, inanes esse labores
nostros renuente natura.

Urina jam etiam sedimentum depone-
bat lateritium, indies copiosius et citius
apparens. Caput multo nunc fiebat libe-
rius, dolor occipitis minuebatur, febris
per sex et plures saepius horas apyrexiam
faciebat.

Hoc in statu properandum erat ad corticem peruvianum, qui, hucusque noxius, nunc saepe erat mali remedium, quo morbus et cito finiebatur, et vires brevi restituebantur. Salinis vero et evacuantibus nuberet oportebat, ut morbi materies undique liberum retineret exitum, et alvus aperta servaretur. Uncia semis extracti corticis peruviani cum drachmis duabus salis mirabilis Glauberi, vel alius salis medii in aqua comixta, per diem sumpta evacuationes adjuvabat, et febriles recursus post unam alteramue diem penitus avertibat. Ad recuperandum vires hoc morbo valde fractas, ipse cortex peruvianus in decocto, vel lignum Quassiae in infuso, cito sanitatem confirmabant, cum diaeta carnosae et moderato vini generosioris usu.

Ut plurimum vero morbus non tam cito finiebatur: febris manebat continua continens, nec ulla apparebat vel minima remissio; sed symptomata cerebri affecti et languentis vigoris vitalis indies augebantur. Hic priora medicamenta sine ulla intermissione continuanda erant, moschus, crocus, spiritus mindereri, serum lactis cum vino paratum, flores arnicae in infuso vel extracto, aucta quandoque eorum dosi, dum

vires magis languere videbantur, quo in casu etiam extractum corticis peruviani conveniebat. Interim vesicantium ulcera semper aperta servare, et nova oportebat curare.

Nil vero erat tumultuaria remediorum exhibitione et mutatione perniciosius: naturae enim multa reliquenda erant, et tempori: sufficebat, si ars leniter refocillaret vires, et symptomati cuique nimis urgenti occurrerēt.

Universim in hoc morbo evacuationes insigniores non parum afferebant incommodi: vires enim alioquin languescentes inde penitus exhauriebantur. Sed si praepostera et impetuosiori cohibitione turbasses naturae molimina, non nocuisses minus.

Diarrhoea moderata per totum morbi decursum semper conducebat. Cum vero invalesceret, simulque accederet tenesmus, multo cum levamine dedi clysmata e lacte vel mucilagine gummi arabici, interne vero per unum alterumve diem infusum rhei ad uncias tres cum
eleo-

eloesachari menthae drachma. Hisce mediis semper redibat quies.

Sudor nimius frequentior hujus morbi comes erat. Eum frigidis compescere non minus erat lethale, quam noxia ejusdem continuatio, quae vires languentes penitus dejiciebat.

Urina turbabatur quidem, sed absque depositione sedimenti, saepe et pellicula variegata, et pinguis in superficie natabat.

Vini rubri aqua diluti usus - magna hic praestitit, et aegros mirum in modum recreavit, cutis siccum inter et mandidum media manebat, et colliquativus iste et pinguis sudor minuebatur. Dabam quoque hoc in casu et quidem optimo cum effectu mixturam ex uncia semis extracti radice valerianae silvestris, drachmâ spiritus vitrioli, et aquae destillatae gratae unciis octo cum uncia syrupi cujusdam paratam cochleatim omni hora vel bihorio, et serum lactis vinosum. Potus denique omnis grate acidus conveniebat.

Nervorum tumultus majores moscho, castoreo, croco compescebantur.

Miliaria nunquam in hoc morbo critica, nec unquam copiosa observavi. Circa vigesimam quandoque diem in collo hinc inde vix splendebant vesiculæ, cum iterum disparerent; etsi regimen sat calidum servaretur, et aeger cardiaca continuaret. Fors nimia seri spissitudo, fors nimis languida vis vitalis, fors et defectus acrimoniae miliaris in causa fuit.

Non novi morbum qui prognosi hoc nostro sit fallacior. Aegri ipsi etsibi, et adstantibus sat bene, imo melius se habere videntur, sompor ipse concedit inducias, mentis compotes sunt, excretiones et functiones vitales omnes sat bene succedunt, sed heu miseros! subito medias inter adstantium gratulationes agoniam incidunt, brevique extinguuntur.

Vesicantium ulcera per totum morbi decursum aperta erant servanda, imo sopore continuante nova prioribus addenda. Mirum, ulcera haec raro gangraenescere, nec unquam, natura etiam ad obitum iam pro-

pe-

perante, exsiccari. In ipso mortui corpore ulcera perbene suppurantia, et magnam cantharidum ope elevatam vidi vesicam.

Saepe post trigesimum diem aegri singultibus et vomendi conanime vexabantur, aut etiam vomebant post quaevis assumpta. Id si ob assumptionem variorum remediorum per tantum tempus acciderat, abstinendum erat per diem unum alterumve ulteriori medicina, eique juscula bona fuerant substituenda: cochlear unum alterumve probi vini cum pane tosto multum conducebat.

Si vero et his non obstantibus continuabant vomituritiones cum ore amaro, et lingua mucos denso obducta; lene emeticum audacter exhibui. Evomebant mucum tenacem, fuscum, magno cum levamine et pacatione hujus novi symptomatis.

Exscretio copiosa muci et salivatio fausti erant ominis: quo plus muci et salivae exscreabatur, eo magis aegri ad se redibant, eoque magis tremores et spasmi minuebantur, atque febris citius finiebatur. Crisin veram nunquam licebat hoc in mor-

bo sperare; erat cur gratularemur nobis de procrastinatione, aut si vitam aegri, tenuissimo pendentem filo, quam possemus diutissime servaremus. Quamprimum vero febris remissionem faciebat, et pulsus, qui hucusque 120 ictibus minutum aequabat, sensim sensimque minus gradiebatur celeriter, approximantem calamitatis finem tuto poteramus sperare. Ut plurimum urina hucusque semper pallida et cruda, jam evadebat coloratior, nonnunquam etiam sedimentum deponebatur lateritium.

Vidi aegrum in quo post sexagesimum diem celeritas pulsus cum febre diminuebatur, circa quinquagesimum salivatio acciderat.

In hoc tam diu exoptato statu omnia alia medicamenta seponenda sunt, et solus cortex peruvianus exhibendus venit. Is jam febrim magis magisque mitigat, vires restaurat, et, si qua restitit in corpore morbi materies, eam per colatoria ejicit. Uncia una in libris duabus aquae per horam cocta, et quater per diem vasculatim exhibita sufficit. Debet vero diu continuari

una cum diaeta eupepta carnosa, et vini generosioris moderato usu.

Ecce simplex sed vera hujus febris descriptio, ecce simul illius sanandae methodus pluribus exemplis confirmata. Si unquam, certe hac in febre lente at ajunt et provide festina.

Febris
exan-
thema-
tica in-
fantum.

Hic morbus alium secum advexit inter infantes epidemicum, nempe febrim quandam continuam, cui superveniebat coryza, pustularum in facie et collo eruptione mitescens. Lubenter coryzam hanc variolodem appellarem: similis enim erat scarlatinae variolodi, quam Sauvages observavit anno 1713. Eodem enim tempore post variolosam epidemiam morbus hic observatus est: eadem et pustulae variolis similes in facie et collo prodire; et morbus uterque non differebat nisi in hoc, quod ibi scarlatinae eruptio, hic coryza febrim hanc comitaretur.

Infantes a primo ad sextum aetatis annum prae aliis huius morbo erant obnoxii, tam ii, qui defuncti variolis, quam qui
non

non erant. Morbus sequenti modo procedebat.

Infantes praecedente levi horripilatione calebant, vomituriabant, in somno convellabantur. Postridie venter tumescebat, soporosi jacebant, genis rubentibus, oculis semiclausis, artubus in somno saepe convulsis, lingua flavo muco obducta, urina flammea, pulsu celeriter et frequenter micante.

Tertia die convulsiones erant majores, labium superius leviter tumidum, nares obstructae, et pustulae hinc inde in lingua, et labiis propullulantes.

Quarta die labium superius magis tumidum, nares magis obstructae, et os universum tumidum erat. Pustulae variolis non absimiles circa labia, hinc inde in facie, et infra maxillam apparebant. Pulsus jam mollior, celeritate auctus erat, convulsiones nullae, nec vomitum. Sudor, alvus spontanea, venter collapsus, urina cum sedimento lateritio. Simul cum sudore nares deobstruebantur, et magna inde muci puriformis quantitas exibat.

Du-

Durabant hoc per duos, tres, quatuorve dies, cum pustulae brevi suppurantes indies novae prodirent, tenui sero manantes, sed duobus tribusve diebus post evanescentes. E naribus magna mucī purulenti, serosi, saepe et sanguinolenti cōpia exercebatur tam acris, ut, quacunque diffunderet, vestigiā sui retineret. Salivae major erat excretio, urina simul jumentosa cum sedimento lateritio. Febris jam quiescebat, et appetitus cum sanitate redibat.

Sic morbus mitior procedebat. Plures vero diutius, et periculosius decubuerunt, imo non paucos morbus hic sustulit. Pituitosi, debilesque infantes primum coctionis stadium pluribus diebus absque ulla eruptione perpessi vehementius, diutiusque convellebantur. Jam si morbum non cognosceres, et vel difficilis dentitionis crederes esse affectiones, vel eum febrim inflammatorio-biliosam, vel saburalem haberēs, et ut talem curare studuisses, quarta vel sexta diē levis quidem conspiciebatur eruptio, labia, naresque parum intumescebant, sed brevi haec evanescebant, praecipue si ignoratis, contemptisque his signis inconveniens regimen persequutus fuisses; convulsiones

indies augebantur, et inflammatio vera in sinibus frontalibus et in meningibus cerebri sensim serpebat latius, nascebatur suppuratio, et octava, nona, decima die mors nequebatur certa, effroenisque. Paulo ante, et post mortem aures naresque pure et sanguine manabant.

Ast ubi his in infantibus verus morbi status non fuerat ignoratus, facillima erat curatio, nec unum vidi morientem, ubi statim ab initio conveniens regimen et medicatio fuerant adhibita: scilicet si naturae, et materiam acrem enaribus, oris cavo, et cute his vicina ejiceret, auxiliareris. Quapropter infantes ab aere frigido quam cautiissime erant arcendi, leniaque diaphoretica cum potu calido infusorum diluentium et leniter stimulantium ex floribus sambuci chamomillae vulgaris etc. quantocius adhibenda. Camphora ad granum semis vel integrum bis terve per diem exhibita, nec non vapor aquae calidae naribus admissus ceteris hic antecellebant.

His si natura ad expellendum acre non solum sat efficaciter excitaretur, vesicantia prope aures et ad nucham erant applicanda, qui-

quibus diligenter continuatis magna sensim e naribus seri purulenti copia effluebat, pustularum maxima sequebatur eruptio, quae faciem, collum, pectus, brachiaque occupabant, omnibus symptomatibus febrique procul fugientibus. Serum e naribus et vesicantium ulceribus effluens partes saepe vicinas inflammabat, corrodebatque. Saepe et auribus istiusmodi sero acri simul manantibus vidi sanitatem recuperari.

In nosocomium admissi fuerant per hunc mensem triginta octo aegri, decem et octo viri, viginti foeminae. Undecim foeminae totidemque viri acutis, reliqui chronicis et chyrgicis morbis laborarunt. Ex omnibus triginta quinque sani exiverunt, tres mortui sunt. Mortuus ergo per hunc mensem aegrotantium duodecimus.

Singulatim laborabant febre rheumatica duo viri et foemina, febri lenta nervosa viri tres, foeminae totidem, febri inflammatorio-biliosa viri duo, pleuritide vir et duae foeminae, colica viri duo et quatuor foeminae, dyarrrhaea vir, convulsionibus foemina, hydrope duo viri, oedemate vir, scrophulis vir, scabie vir et quatuor foemi.

minae, scorbuto duae foeminae, fluore albo foemina, bubone foemina, vulnere viri duo, gravida una felicem partum enixa.

Quodsi nunc omnem aegrotorum numerum, qui singulis per annum mensibus curae nosocomiali commissi fuerant, computemus, apparet, susceptorum numerum esse 503, sanatorum 478, mortuorum 25. Calculo igitur facto videmus, ex omnibus per integrum anni decursum in nosocomium susceptis aegris vigesimum quemque mortuum, reliquos omnes sanitati fuisse restitutos. Videmus simul hanc proportionem singulis mensibus nullatenus responde: Januarius ut enim funestissimus, sic Julius et September fuere caeteris clementiores.

In civitate hoc mense obierunt 1128. Per integrum vero annum, summa omnium mensium computata, mortui sunt in civitate 16157.

